



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# PLANTONS LOCAL

DU LITTORAL  
MÉDITERRANÉEN  
AU MASSIF ALPIN

Réalisation



Cofinancements





# PLANTONS LOCAL

GUIDE PRATIQUE POUR LES OPÉRATIONS DE VÉGÉTALISATION  
DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN AU MASSIF ALPIN







# Sommaire

<b>INTRODUCTION</b>	6
<b>PARTIE 1 : POURQUOI ET COMMENT VÉGÉTALISER LOCAL?</b>	11
<b>I. Les avantages à utiliser les plantes locales sur notre territoire</b>	12
<b>II. Planter local, c'est-à-dire ?</b>	14
1. Un vocabulaire commun pour bien se comprendre	14
2. Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)	16
a. Quels sont les impacts des espèces végétales exotiques envahissantes ?	16
b. Stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes	18
3. La marque Végétal local pour favoriser la biodiversité	19
<b>III. Monter un projet de végétalisation étape par étape</b>	22
1. Avant la végétalisation : réaliser le diagnostic de l'existant	22
a. Connaître le sol et faire un état des lieux du patrimoine naturel	23
b. Analyser l'histoire du site, les pratiques de gestion et les usages actuels	24
c. Recenser les atouts et les contraintes éventuelles du site pour le projet de végétalisation	24
2. Définir les objectifs du projet et faire des choix de conception	24
3. Une alternative à la plantation : conserver l'existant et laisser pousser la végétation locale spontanée	25
4. Anticiper et dialoguer avec les producteurs pour établir le bon calendrier	26
5. Maintenant, végétalisons ! Quelques recommandations préalables à tout projet	27
a. Le choix des espèces	27
b. L'établissement du cahier des charges techniques : quelques éléments pour vous guider	29
c. Le respect du sol et de la ressource en eau	31
d. La préparation de la plantation	32
6. Et après ? Promouvoir une gestion écologique et différenciée	34
a. Gérer la ressource en eau	34
b. Favoriser des pratiques alternatives à la tonte sur les surfaces enherbées	35
c. Tailler moins souvent	37
d. Privilégier l'enherbement et favoriser les auxiliaires	37
e. Suivre et évaluer	38



## **PARTIE 2 : LES PALETTES VÉGÉTALES** --- 41

<b>I. Milieux boisés : Plantons des arbres et des arbustes</b>		47
<b>II. Milieux ouverts : Fleurissons nos prairies</b>		73
<b>III. Milieux humides : Plantons les pieds dans l'eau</b>		111
<b>IV. Milieux urbanisés : Végétalisons nos villes et villages</b>		125

## **PARTIE 3 : ANNEXES** --- 133

<b>I. Plantons local : la méthodologie</b>	134
<b>II. Liste des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)</b>	137
<b>III. Bibliographie et ressources</b>	144
<b>IV. Glossaire</b>	146

## **PARTIE 4 : INDEX** --- 149

<b>I. Index des noms scientifiques</b>	150
<b>II. Index des noms communs</b>	153

## **REMERCIEMENTS** --- 159



## INTRODUCTION

Les porteurs de projets sont désormais de plus en plus désireux de relever les défis se présentant à eux lors de la réalisation d'aménagements : défis en matière d'amélioration du cadre de vie pour satisfaire les usagers qui aspirent à davantage de nature, mais également défis de préservation et reconquête de la biodiversité.

Les sujets tels que la lutte contre l'artificialisation des sols, le non-recours à certains produits phytopharmaceutiques, la préservation des ressources en eau, la régulation des îlots de chaleur ou encore l'amélioration de la qualité de l'air sont ainsi à prendre en compte et, s'ils peuvent paraître identiques d'un territoire à l'autre, ils impliquent généralement une attention portée aux spécificités locales, notamment en ce qui concerne le choix des végétaux.

### PLANTER ? OUI, MAIS QUOI ? QUAND ? OÙ ? ET COMMENT ?

Cette publication a pour projet de **donner envie aux différents aménageurs** – qu'ils soient publics ou privés, urbains ou ruraux – de créer des ambiances naturelles et rustiques dans leurs aménagements. L'objectif est la création d'espaces végétalisés plus sauvages et plus champêtres, adaptés aux conditions de sols et de climats méditerranéen ou alpin, qui mettront en avant des plantes originaires de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour que le public puisse les découvrir ou les redécouvrir.

Dans ce guide, l'appellation « **Planter local** » signifie **planter des espèces indigènes<sup>1</sup> qui sont donc naturellement présentes sur le territoire**. Soit, en d'autres termes, les espèces que certains d'entre nous désignent comme « plantes du pays » ou « plantes d'ici ». Attention, l'expression « planter local » peut toutefois conduire à des confusions que les définitions des premiers chapitres du guide aideront à dissiper. Ce n'est pas l'équivalent d'« acheter local » par exemple.

Le guide ne prétend pas pour autant à l'exhaustivité, compte tenu de la richesse en espèces végétales indigènes de notre région. Il propose des espèces ubiquistes<sup>2</sup>, c'est-à-dire suffisamment généralistes pour s'adapter à de nombreux projets d'aménagements indépendamment de la typologie des espaces et de leur lieu d'implantation.

Il ne prétend pas non plus privilégier systématiquement les plantes indigènes au détriment d'autres espèces comme les espèces horticoles. L'approche proposée n'est pas exclusive : elle se combine et s'articule aisément avec d'autres approches plus ornementales ou paysagères.

Cette approche complète aussi des ressources<sup>3</sup> déjà existantes et s'inspire d'autres guides similaires réalisés ou en cours de réalisation dans d'autres régions. **« Planter local », ce n'est pas juste piocher dans des listes préétablies. C'est aussi prendre conscience de la multiplicité des paramètres qui influencent un « milieu » donné et de la manière dont ces paramètres entrent en interaction.**

Enfin, le rôle de ce guide n'est pas de se substituer aux experts de terrain, écologues, professionnels du paysage, pépiniéristes, horticulteurs, qui, mieux encore que n'importe quel guide, vous accompagneront dans la définition et la mise en œuvre d'un projet de végétalisation.

Outil et boîte à idées, le guide « Plantons local » a été élaboré par une équipe pluridisciplinaire<sup>4</sup> composée de partenaires institutionnels et techniques, de scientifiques, de paysagistes, de responsables d'espaces verts, de pépiniéristes, de producteurs de semences, etc., dans un esprit à la fois pratique et pédagogique. Il promeut et s'appuie sur une « logique globale » tendant à améliorer la fonctionnalité écologique des espaces, regroupant ainsi aspects floristiques et bénéfiques pour la biodiversité.

**Il est organisé en deux sections distinctes pour une plus grande facilité de consultation, nous souhaitons que votre lecture soit productive !**

► **La première section**, « Pourquoi et comment végétaliser local ? », vous apportera des clés de compréhension sur cette approche et, pour chaque étape du projet, des notions essentielles et des éléments de recommandations.

► **La seconde section**, « Les Palettes végétales », vous permettra de découvrir la richesse des espèces indigènes de notre région et apportera ainsi de la diversité dans les espèces choisies pour vos aménagements.

---

<sup>1</sup> Une espèce est définie comme indigène à une région donnée si sa présence dans cette région est le résultat de processus naturels sans intervention humaine.

<sup>2</sup> Une espèce est qualifiée d'ubiquiste lorsqu'elle se maintient dans plusieurs biotopes tout en occupant des niches écologiques variées, éventuellement avec une distribution géographique étendue.

<sup>3</sup> Ressources (cf. *Bibliographie et ressources*).

<sup>4</sup> Liste détaillée (cf. *Remerciements*).







Le projet européen LIFE Habitats Calanques, piloté par l'ARBE Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'associe à la démarche régionale portée par l'agence pour vous proposer ce guide dans lequel vous retrouverez la flore du littoral provençal ainsi que les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ayant le plus d'impact sur ce territoire. Il convient de préciser que la spécificité n'a pas été recherchée dans ce guide et que les espèces répertoriées dans la zone méditerranéenne peuvent s'adapter au littoral provençal.

**Le projet européen LIFE Habitats Calanques a pour objectif de préserver les habitats naturels du littoral des Calanques dont certaines espèces végétales endémiques sont menacées face aux pressions anthropiques et naturelles qui pèsent sur elles.** Un des objectifs du projet est de mieux faire connaître cette flore locale du littoral provençal et de traiter la problématique de la dissémination des EVEE, en particulier lorsque ces dernières sont introduites dans les espaces publics ou privés à proximité du site du Parc national des Calanques.

\*\*\*

*Le projet LIFE Habitats Calanques fédère 7 partenaires : l'Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE), le Parc national des Calanques, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, Aix-Marseille Université et le Naturoscope. Le projet est cofinancé par la Commission Européenne, le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la Région Sud.*







# POURQUOI ET COMMENT VÉGÉTALISER LOCAL ?





## I. LES AVANTAGES À UTILISER LES PLANTES LOCALES SUR NOTRE TERRITOIRE

Fruit d'équilibres fragiles entre les différentes ressources naturelles locales, la diversité du vivant est intimement liée au type de sol, au climat et à l'eau. Planter des espèces indigènes, c'est à la fois préserver les continuités écologiques et l'équilibre des écosystèmes et préserver la biodiversité d'un territoire. Mais pas seulement.

Examinons certains des bénéfices que les plantes locales peuvent apporter.

### Une identité territoriale renforcée

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est un hotspot<sup>5</sup> abritant une flore et une faune extrêmement variées, mais néanmoins fortement menacées et fragilisées, notamment par les activités humaines. Utiliser les espèces végétales indigènes est justement le moyen d'affirmer l'identité des paysages régionaux tout en renforçant le patrimoine culturel et naturel d'une collectivité. Les habitants et visiteurs auront alors l'opportunité de découvrir et d'apprécier les senteurs et l'esthétique des espaces végétalisés, d'aider à en faire perdurer les spécificités, et de se divertir.

### Favoriser le vivant et les interactions entre les pollinisateurs et les plantes

Les plantes indigènes font partie intégrante des écosystèmes naturels originels : elles servent de zones de refuge, de reproduction, de vie et de ressources pour la faune sauvage (oiseaux, insectes et mammifères) ; elles produisent du pollen, du nectar et des graines ; elles abritent du soleil, etc. Les espèces indigènes ont des cycles de vie interdépendants, en harmonie avec leurs milieux. Les planter favorise l'équilibre des milieux et contribue directement à la restauration et à la préservation de la biodiversité de notre territoire.

Les insectes pollinisateurs, par exemple, interagissent avec la flore indigène pour leurs fonctions essentielles : reproduction, nutrition, habitat. La période de floraison des plantes nectarifères s'accorde avec les besoins des pollinisateurs sauvages, renforçant leurs chances d'interfécondation et donc de dissémination<sup>6</sup>.

**Planter des espèces indigènes et diversifiées permet de maintenir ainsi les interactions entre les espèces et contribue à leur épanouissement.**

### Un entretien réduit et une résistance naturelle aux maladies et ravageurs

Plantées ou semées dans de bonnes conditions, **les plantes indigènes ubiquistes nécessitent peu d'entretien**. Leur adaptation aux caractéristiques locales de l'environnement offre une résistance face aux maladies, aux parasites ou à la sécheresse. Les professionnels (pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, etc.) sauront vous renseigner sur les exigences particulières et la résistance des plantes que vous aurez choisies.

### Une adaptation aux variations climatiques

Certaines plantes indigènes possèdent une diversité génétique intraspécifique<sup>7</sup> élevée, corollaire d'une forte capacité d'adaptation aux caractéristiques écologiques de leur aire naturelle de répartition. **Une palette végétale composée majoritairement d'une flore indigène et diversifiée sera adaptée aux conditions écologiques et bioclimatiques de notre région, et globalement résiliente face aux variations climatiques.**

---

<sup>5</sup> La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est un haut lieu de biodiversité. C'est la première des régions métropolitaines en nombre d'espèces. On y retrouve les 2/3 des espèces végétales recensées en France métropolitaine, 1/3 des espèces d'insectes, 94 % des chauves-souris et 85 % des oiseaux nicheurs (Regard sur la Nature 2021 ARBE Provence-Alpes-Côte d'Azur).

<sup>6</sup> Toutefois le changement climatique peut entraîner des décalages phénologiques (saisonniers) entre les espèces végétales et animales.

<sup>7</sup> Qui existe à l'intérieur d'une même espèce.

## Une connectivité plus grande

Quelle que soit l'échelle du territoire, la plantation d'espèces végétales indigènes participe au renforcement de différentes trames écologiques notamment la trame verte<sup>8</sup> et turquoise<sup>9</sup> en favorisant la connectivité entre réservoirs de biodiversité<sup>10</sup>. Coupée ou trop éloignée de ses voisines, une population de plantes indigènes accueille moins de pollinisateurs et moins d'autres espèces affiliées (auxiliaires) et les plantes ont davantage de difficultés à se reproduire, entraînant un déclin de la population végétale. De surcroît, cette perte de connectivité affecte l'activité de la faune sauvage associée, qui ne trouve plus la ressource nourricière suffisante. **Constituer ou reconstituer de nouveaux corridors écologiques**<sup>11</sup> (par la plantation de haies, alignements d'arbres, bandes enherbées, noues végétalisées, etc.) **permet de lutter contre la fragmentation des habitats et contribue directement à la préservation de la biodiversité**. C'est le moyen de retisser un réseau du vivant où les espèces animales et végétales, tout comme l'Homme, pourront circuler, s'alimenter, se reproduire, se reposer et, d'une façon générale, accomplir leur cycle de vie. Cela est d'autant plus important sur les zones d'interface entre les espaces naturels (type Natura 2000) ayant vocation à préserver des habitats d'intérêt communautaire particuliers et les espaces urbains ou péri-urbains.

À titre d'exemple, le projet LIFE Habitats Calanques encourage les riverains du Parc national des Calanques à planter des espèces indigènes afin de préserver les plantes endémiques constitutives de la phrygane<sup>12</sup>, un des habitats d'intérêt communautaire du cœur de Parc.



Tous ces éléments favorisent l'épanouissement et les interactions de la flore indigène et de la faune dans des réseaux d'écosystèmes restaurés et connectés, à l'échelle d'un quartier, d'une commune, mais aussi au niveau des régions et du territoire national tout entier.

**Si vous souhaitez favoriser la biodiversité, planter et semer des espèces indigènes est une vraie plus-value à saisir pour notre territoire !**

<sup>8</sup> La Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l'ambition d'enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Cet outil d'aménagement du territoire vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, qui permette aux espèces animales et végétales, de circuler, de s'alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc. En d'autres termes, d'assurer leur survie et de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre leurs services à l'Homme. La Trame verte et bleue est ainsi constituée de réservoirs de biodiversité et de corridors qui les relient entre eux. Depuis le Grenelle de l'Environnement, d'autres concepts s'ajoutent à la notion de TVB, notamment la trame noire, turquoise etc.

<sup>9</sup> La trame turquoise correspond aux espaces où la trame verte et la trame bleue interagissent très fortement par exemple la végétation qui borde les milieux aquatiques. Elle constitue un corridor écologique propice à la circulation des espèces.

<sup>10</sup> Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou une partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante.

<sup>11</sup> Un corridor écologique désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou une population.

<sup>12</sup> La phrygane est une formation composée de petits buissons épineux qui ont adopté différentes techniques afin de se protéger des rayons du soleil. C'est l'habitat phare du projet LIFE Habitats Calanques où l'astragale de Marseille (*Astragalus tragacantha*), le plantain subulé (*Plantago subulata*) et la thymèle tartonraire (*Thymelea tartonrea*) sont les trois espèces structurantes. Elles sont pourtant en déclin car elles subissent, en plus des conditions environnementales extrêmes, de fortes pressions anthropiques.

## II. PLANTER LOCAL, C'EST-À-DIRE ?

### 1. Un vocabulaire commun pour bien se comprendre

Il est fréquent d'être décontenancé par les ambiguïtés du vocabulaire consacré aux végétaux. D'un professionnel à l'autre, les termes « local », « sauvage », « indigène », « endémique » ou « rustique » prennent en effet un sens radicalement différent. L'origine locale peut être comprise comme l'origine de prélèvement des graines dans le milieu naturel, comme le site de production, ou encore comme le lieu d'implantation d'une pépinière mais qui peut proposer aussi des végétaux venus d'ailleurs.

**D'où l'importance de s'accorder sur un langage commun précisant les définitions et limitant les confusions.**

🌿 **Plante indigène (native, autochtone) :** une espèce végétale est définie comme étant indigène sur un territoire lorsqu'elle y est présente du fait de processus naturels de dispersion. On dit que ce territoire est son aire naturelle de répartition. Une espèce végétale indigène de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est donc une espèce qui n'a été ni transplantée ni importée par l'Homme. Les plantes endémiques font partie des plantes indigènes.

🌿 **Plante endémique :** il s'agit d'une espèce végétale propre à une région biogéographique donnée et ne se développant qu'en ce lieu précis du fait, par exemple, d'exigences écologiques particulières.

🌿 **Plante exotique :** espèce implantée par l'Homme, volontairement ou accidentellement, à l'extérieur de son aire de distribution d'origine. C'est le contraire d'une plante indigène.

🌿 **Plante archéophyte :** c'est une espèce végétale non originaire d'une région géographique, mais qui a été introduite dans des temps anciens, avant le XV<sup>e</sup> siècle. En raison de l'ancienneté de leur introduction (avant l'an 1500 par convention), certaines plantes archéophytes sont admises par les botanistes comme intégrées à la flore indigène.

🌿 **Plante ou Espèce Végétale Exotique Envahissante (EVEE) :** espèce végétale non indigène sur un territoire donné, dont l'introduction par l'Homme, volontaire ou fortuite, menace les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives. C'est une espèce qui s'est naturalisée<sup>13</sup> et est capable de se propager rapidement au-delà de son lieu d'introduction. Les EVEE peuvent également être qualifiées d'« invasives », mais il s'agit d'un anglicisme. Toutes les plantes exotiques ne se naturalisent pas systématiquement pour autant, pas plus qu'elles ne deviennent automatiquement envahissantes.

---

<sup>13</sup> Naturalisée : espèce végétale introduite rencontrant des conditions écologiques favorables à son implantation durable dans le temps.



🌿 **Plante sauvage** : une espèce végétale sauvage qui pousse naturellement au sein des écosystèmes sans avoir subi de sélection préalable ou de croisement de la part de l'Homme. Une plante sauvage est, sur un territoire donné, forcément indigène et spontanée<sup>14</sup>.

🌿 **Plante horticole** : c'est une sélection végétale (espèce, hybride, cultivar etc.) développée par l'Homme pour ses valeurs ornementales, nourricières, thérapeutiques, etc. Elle ne pousse donc pas spontanément dans le territoire d'introduction considéré<sup>15</sup>. Toutefois, une plante horticole peut avoir comme ancêtre une plante indigène dont on n'aurait conservé que certaines caractéristiques (couleur, nombre de pétales, odeur, etc. ) par sélection. *Rosa gallica*, par exemple, est un des ancêtres sauvages des rosiers cultivés contemporains. Associée à la demande des consommateurs, la production de plantes horticoles est désormais la plus abondante, ce qui favorise leur utilisation sur notre territoire. Certaines ont fait la réputation et constituent désormais l'identité de nombreux paysages urbains et péri-urbains de la Côte d'Azur par exemple.



*Rosa gallica*, un des ancêtres sauvages des rosiers cultivés contemporains (espèce protégée).

L'appellation « plante locale » dans ce guide regroupe aussi bien :

- ▶ les espèces indigènes (dont les endémiques),
- ▶ les archéophytes (admises par les botanistes comme intégrées à la flore indigène du fait de l'ancienneté de leur introduction).

<sup>14</sup> Une espèce spontanée est une plante se développant et se reproduisant sans intervention humaine.

<sup>15</sup> Certaines plantes horticoles peuvent parfois s'échapper des jardins.

## 2. Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE)

Les espèces exotiques envahissantes - animales et végétales - sont considérées comme l'une des cinq causes majeures de l'érosion de la biodiversité. À ce titre, la prévention de leur propagation et leur gestion constituent un enjeu indéniable dans la préservation des territoires.

**Planter des espèces végétales exotiques envahissantes constitue un risque pour la diversité faunistique et floristique locales de notre territoire. En plantant des espèces végétales indigènes, vous participez à la préservation de la biodiversité.**

En 2020, on recensait d'ailleurs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

- ▶ **143 EVEE** : 38 en statut d'impact « majeur » (c'est-à-dire à forts impacts et largement répandues), 62 en statut « émergent » (à forts impacts mais pas encore très répandues), et 43 en statut « modéré »,
- ▶ 153 espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes.

### a. Quels sont les impacts des espèces végétales exotiques envahissantes ?

Une EVEE installée peut causer de nombreux impacts négatifs sur différents aspects.


- ▶ **La biodiversité** : compétition pour les ressources (eau, nutriments, lumière etc.) avec les plantes indigènes, hybridation avec d'autres espèces végétales locales induisant une perte de l'identité génétique, changement des propriétés du sol, transformation des milieux et de leur fonctionnalité etc.
- ▶ **Les usages et l'accessibilité** : fermeture des milieux et restriction de l'usage du milieu et de la visibilité routière. Ajouté à leur toxicité, certaines seront de vraies barrières empêchant tout déplacement et allant jusqu'à limiter l'usage récréatif d'un site, par exemple.
- ▶ **L'économie** : perte de rendements agricoles (pâturages, cultures, vergers etc.), perturbations descaptages d'eau potable, coûts de gestion importants etc.
- ▶ **La banalisation des paysages et de la flore régionale par leur homogénéisation** (formations végétales mono-spécifiques<sup>16</sup>) et la perte de leur identité.

Exemple des 4 EVEE les plus impactantes sur le littoral des Calanques



CBNMed – UGO Julien

*Agave americana*, agave d'Amérique



RICHAUD Philippe

*Opuntia stricta*, oponce stricte



RICHAUD Philippe

*Carpobrotus* spp, griffes-de-sorcière




RICHAUD Philippe

*Medicago arborea*, luzerne arborescente

<sup>16</sup> Qui ne comprend qu'une seule espèce.



Exemple de 6 EVEC en statut d'impact "majeur" (à forts impacts et largement répandues)



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

*Ailanthus altissima*, ailante glanduleux



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

*Cortaderia selloana*, herbe de la pampa



CBNMed - MORVANT Yves

*Buddleja davidii*, arbre à papillon



CBNMed - BLANC Guy

*Acacia dealbata*, mimosa d'hiver



CBNMed - MORVANT Yves

*Lonicera japonica*, chevrefeuille du japon



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

*Robinia pseudoacacia*, robinier faux-acacia



### b. Stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes

La gestion des EVEC est complexe : c'est un engagement sur le long terme, parfois sur plusieurs dizaines d'années. Les gestionnaires devant faire face à la propagation d'EVEC sur leur territoire doivent bien préparer leurs interventions :

- ▶ en définissant leurs objectifs de gestion,
- ▶ en prenant en compte les caractéristiques du site et de l'espèce concernée.

Depuis 2014, une stratégie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur relative aux espèces végétales exotiques envahissantes, mandatée par l'État et la Région, a d'ailleurs été mise en place, accompagnée d'un plan d'actions (disponible sur la plateforme INVMEC-Flore/rubrique Ressources : [www.invmed.fr](http://www.invmed.fr)).

Cette stratégie, animée par les Conservatoires botaniques nationaux s'appuie sur une liste<sup>17</sup> qui compte des espèces classées selon leur répartition sur le territoire, leur taux de recouvrement et leur niveau de risque et d'impacts.

#### *Pour en savoir plus :*



Cette plateforme concentre toutes les informations et outils nécessaires à la prévention, à la gestion et au suivi de ces EVEC. Vous y trouverez :

- la liste des EVEC en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Occitanie, ainsi que leurs fiches descriptives ;
- la réglementation internationale, européenne, nationale, régionale et locale concernant la gestion des plantes exotiques envahissantes ;
- une section dédiée à la mise en réseau des acteurs à travers une cartographie des actions, des retours d'expérience, un annuaire, etc. ;
- des informations sur les possibilités de traitements de déchets verts issus des opérations de gestion d'EVEC ;
- un tableau d'aide à la décision pour la gestion des EVEC suivant le type de milieu et les publics cibles.



La multiplication et la plantation massive de « plantes locales », sans précautions sur leur provenance, peut conduire à la pollution génétique des populations locales, voire à des comportements de dominance comparables aux EVEC.

<sup>17</sup> Liste des espèces exotiques envahissantes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : annexe n° 2.


### 3. La marque Végétal local pour favoriser la biodiversité



La marque Végétal local est une démarche collective développée en France par l'ensemble des partenaires professionnels agissant sur le vivant (utilisateurs, producteurs, prescripteurs, services de l'État, etc.) et dont l'objet est de garantir qu'un végétal est effectivement local et sauvage.

Il s'agit d'une marque collective créée en 2015, à l'initiative des réseaux des Conservatoires botaniques nationaux, de l'association Plante & Cité et de l'association Afac-Agroforesteries. Elle a été déposée à l'INPI<sup>18</sup> par l'Office Français de la Biodiversité, ainsi que son règlement et son référentiel technique. La marque Végétal local se positionne sur le marché des plantes qualifiées de sauvages, c'est-à-dire n'ayant subi ni sélection ni croisement d'origine humaine. Elle concerne à la fois les herbacées, les arbres et les arbustes. Pour postuler à la marque Végétal local et en être bénéficiaire, le matériel végétal initial (semences, boutures, etc.) doit être récolté dans des milieux naturels sur des végétaux vierges de toute intervention. La marque exclut donc logiquement les variétés agricoles, horticoles et forestières sélectionnées.

Au-delà de l'aspect sauvage des végétaux récoltés, l'attribution de la marque Végétal local implique que les végétaux aient été récoltés dans le milieu naturel en France, et plus spécifiquement dans l'une des grandes régions biogéographiques composant le territoire national : 11 régions ont ainsi été définies, ce qui permet de garantir ce caractère local au sens de la marque. Ces zones ont été délimitées indépendamment du découpage des régions administratives : elles résultent d'une part de la compilation de cartes hydrographiques, géologiques, climatiques, d'altitude et de végétation, et d'autre part d'une concertation avec des experts en botanique et des professionnels. Elles constituent les grands ensembles écologiques de la France.



Les grandes régions biogéographiques définies dans le cadre de la marque Végétal local

<sup>18</sup> Institut National de la Propriété Intellectuelle.



**Ainsi, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est découpée en deux secteurs biogéographiques : la zone alpine et la zone méditerranéenne.** Un végétal acheté pour une plantation ou un semis sous la marque Végétal local sur le territoire régional est issu d'une récolte et d'une multiplication d'un spécimen qui poussait donc naturellement dans l'une de ces zones biogéographiques (voire les deux en fonction de sa répartition naturelle). Le producteur devra donc associer à la mention Végétal local la région biogéographique d'origine et d'utilisation de l'espèce : soit Alpes, soit Méditerranée.

La marque garantit que la collecte des végétaux a eu lieu dans le milieu naturel, sur des plantes indigènes et sans affecter le développement des populations végétales prélevées. Elle encadre également leur production, grâce à son référentiel technique, en exigeant notamment la multiplication des semences et plants herbacés récoltés dans la région d'origine de la collecte.

Sur le site Végétal local<sup>19</sup>, vous trouverez différentes informations et documents disponibles concernant la marque, les conditions de son utilisation (guide, vidéos, articles, etc.), ainsi que les coordonnées des producteurs. La cartographie<sup>20</sup> en ligne vous permettra de vérifier à quelle région biogéographique se rattache votre commune (inscrire le nom de la commune en utilisant la « loupe »).

### Autres labels et démarches

Bien que ce guide mette en avant les plantes indigènes, les plantes horticoles, parfois d'origine exotique, conservent une place importante dans les projets d'aménagements, notamment urbains. En effet, dans certains projets, la combinaison de palettes végétales locales et horticoles s'avère extrêmement intéressante.

Cette approche combinée est mise en avant dans une charte sur le jardin en région méditerranéenne<sup>21</sup>. Cette charte, signée en 2021, formalise le concept de nature « sublimée ». Le concept s'inspire de la nature afin de créer des aménagements où la palette végétale est savamment composée d'espèces indigènes et horticoles pour se rapprocher d'un écosystème s'autogérant le plus possible en fonction du site, de sa surface, de son exposition, de son sol et de son usage attendu.

Pour compléter, des labels et certifications soutenus par l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage (Val'Hor) certifient la qualité, l'origine ou encore la durabilité de plantes horticoles, permettant d'avancer vers des plantations issues de productions plus responsables.



► **Fleurs de France**<sup>22</sup> est un label garantissant l'origine française de la production de végétaux (bulbes, fleurs, plantes, arbustes et arbres). Seuls les végétaux issus de la production d'entreprises françaises engagées dans une démarche de certification éco-responsable ou de qualité reconnue (certification environnementale Plante Bleue, MPS, Label Rouge, agriculture biologique et Charte qualité fleurs coupées) peuvent être labellisées Fleurs de France.



► **La certification horticole française Plante Bleue**<sup>23</sup> garantit que les végétaux ont été produits par des entreprises françaises engagées dans des démarches de production respectueuse de l'environnement selon un cahier des charges précis visant à limiter les impacts environnementaux de leur activité (gestion de l'eau, des déchets, protection des cultures ou encore de la biodiversité et de l'environnement).

Sur le site internet « Plante Bleue », vous trouverez par région la liste des 266 entreprises certifiées en 2021 dont 67 certifiées Haute Valeur Environnementale<sup>24</sup> (HVE). Une recherche est possible par type de production et par niveau de certification avec géolocalisation des entreprises.

<sup>19</sup> [www.vegetal-local.fr](http://www.vegetal-local.fr)

<sup>20</sup> [http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vegetal-local-regions-dorigines-et-unites-naturell\\_656487#7/46.548/3.658](http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vegetal-local-regions-dorigines-et-unites-naturell_656487#7/46.548/3.658)

<sup>21</sup> La charte sur le jardin en région méditerranéenne initiée par la délégation régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur d'Hortis, le groupe de travail « espaces verts, nature et paysage » de l'Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF), la délégation méditerranéenne de l'union nationale des entreprises du paysage (UNEP), la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse de la fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépiniéristes (FNPHP) et la fédération française du paysage (FFP) Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, a pour objectifs de formaliser la démarche et le concept de nature sublimée, de promouvoir les échanges entre professionnels, de diffuser les pratiques, et d'adapter les formations aux enjeux locaux.

<sup>22</sup> [www.labelfleursdefrance.fr/accueil](http://www.labelfleursdefrance.fr/accueil)

<sup>23</sup> [www.plantebleue.fr](http://www.plantebleue.fr)

<sup>24</sup> Trois niveaux de certification existent, le niveau 3 permettant d'accéder au niveau HVE « Haute Valeur Environnementale » qui prend en compte l'état de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire de l'entreprise, la gestion de la fertilisation au sein de l'entreprise et la gestion de l'irrigation dans les cultures.

Par ailleurs, le **code de conduite VAL'HOR relatif aux EVEC** encourage à restreindre l'utilisation des plantes exotiques envahissantes soit totalement (liste de consensus) soit dans certaines conditions (listes soumises à recommandations) : [www.codeplantesenvahissantes.fr](http://www.codeplantesenvahissantes.fr). Ce document est mis à jour régulièrement, en fonction du contexte scientifique et réglementaire.

En complément de ce code, attention à bien prendre en compte les enjeux locaux notamment la présence d'espaces naturels au sein et à proximité desquels une liste particulière d'EVEC peut être proscrite.



C'est par exemple le cas dans la zone Natura 2000 du Parc national des Calanques et dans les zones riveraines sur lesquelles le projet LIFE Habitats Calanques s'est attelé à arracher les EVEC à forts impacts dont *Carpobrotus* spp (griffe de sorcière), *Opuntia* spp (figuier de barbarie) et *Agave americana* (agave d'Amérique).

### III. MONTER UN PROJET DE VÉGÉTALISATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Ce chapitre vous donnera les éléments clés pour élaborer votre projet de végétalisation, de sa conception à sa mise en œuvre. Il synthétise les bonnes pratiques et les notions essentielles.

Pour en savoir plus, retrouvez toutes les bonnes pratiques recensées de façon très détaillée dans les règles professionnelles<sup>25</sup> élaborées par les professionnels du secteur, sous forme de fichiers en téléchargement sur le site de l'Union Nationale des Entreprises du Paysage aussi bien pour les travaux de plantation (sigle PC dans les fichiers) que pour les travaux d'entretien (PE).

En complément, consultez le guide « Conception écologique d'un espace public paysager<sup>26</sup> » qui propose une méthodologie pour mener à bien une conception écologique depuis les phases amont de diagnostic jusqu'à l'animation du site.

#### 1. Avant la végétalisation : réaliser le diagnostic de l'existant

**Planter ou semer est un acte raisonné.** Qu'il s'agisse de concevoir un aménagement paysager, de planter une haie ou de semer un mélange herbacé, le préalable commun est la phase de diagnostic qui permet de se poser les bonnes questions pour choisir les techniques, sélectionner les végétaux, concevoir l'espace et organiser le chantier.

Avant tout projet de végétalisation, il est ainsi indispensable d'effectuer un **diagnostic écologique et paysager** du site concerné. Il permettra d'acquérir une connaissance plus précise :

- ▶ du sol et du patrimoine naturel, ce qui inclut les structures végétales et les écosystèmes en place, les connectivités paysagères et la topographie ;
- ▶ des pratiques de gestion actuelles et passées et des usages du site (piétinement, accueil du public, gestion de l'eau, etc.).



<sup>25</sup> [www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/](http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/)

<sup>26</sup> [https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/205/guide\\_de\\_conception\\_ecologique\\_d\\_un\\_espace\\_public\\_paysager/n:24](https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/205/guide_de_conception_ecologique_d_un_espace_public_paysager/n:24)

**Pour vous y aider, voici 3 étapes à suivre :**

#### **a. Connaître le sol et faire un état des lieux du patrimoine naturel**

Dans cette phase du diagnostic<sup>27</sup>, il s'agit de recueillir, via des données, des observations, des relevés et des inventaires, les caractéristiques générales du site qui vont orienter le choix des espèces à y implanter :

- ▶ les milieux (boisés, ouverts, humides) ;
- ▶ les espèces végétales ;
- ▶ la faune et en particulier les insectes ;
- ▶ l'altitude, la pente, l'exposition ;
- ▶ le fonctionnement hydraulique et l'accès à la ressource en eau (cycle de l'eau, circulation de l'eau etc.) ;
- ▶ la composition et le fonctionnement du sol, la nature du sol en particulier (un sol naturel ou artificiel), le pH (neutre, acide ou basique), l'humidité, la texture dominante (caillouteuse, sableuse, limoneuse, argileuse etc.), la quantité de matière organique disponible, la profondeur, etc.

**Le sol est un milieu vivant.** Il influence fortement la reprise des végétaux après plantation. Connaître sa composition et son fonctionnement est donc un préalable indispensable à tout projet de plantation. Il est essentiellement constitué de matières minérales puis, à proportions à peu près égales, d'air et d'eau, et enfin de matières organiques<sup>28</sup>. Riche en bactéries et autres organismes, il effectue des échanges d'air et d'eau et alimente les plantes en éléments nutritifs (azote, phosphore etc.).

L'idée principale est d'adapter les plantations au sol et non l'inverse. L'humble ver de terre est, par exemple, un excellent indice d'un sol riche, oxygéné et vivant. L'observation de la flore spontanée présente (espèces bio-indicatrices) est également un bon indicateur de la composition et de la qualité du sol. Dans certains cas, le recours à une analyse de sol, complétée par une observation de la parcelle où la plantation sera réalisée (profils de sols, carottages), sera nécessaire. Plusieurs laboratoires d'analyses sont d'ailleurs en mesure de vous fournir les données physico-chimiques de votre sol à partir d'un échantillon envoyé. Le recours à des analyses différentes selon les secteurs à planter sera envisagé dans le cas où le contexte pédologique y est différent.

Les facteurs abiotiques ont été renseignés dans les palettes végétales (*cf. PARTIE 2*) : lumière, température, humidité du sol, texture du sol, pH du sol. **Ainsi, au moment de choisir les espèces végétales à planter ou semer, vous pourrez sélectionner celles dont les caractéristiques correspondent à votre terrain d'implantation, leur permettant de se développer dans des conditions optimales.**

<sup>27</sup> Pour aller plus loin dans la phase de diagnostic : afin d'harmoniser les études et de proposer une méthode accessible à tous, le Muséum d'Histoire Naturelle a mis en œuvre, depuis 2015, la méthode IQE/IPE (Indice de Qualité Écologique et Indice de Potentialité Écologique) pour caractériser la biodiversité à l'échelle d'un site : [https://iqe-patrinat.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/GP2021\\_IQE\\_IPE.pdf](https://iqe-patrinat.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/GP2021_IQE_IPE.pdf)

<sup>28</sup> Le sol est théoriquement constitué de 5 % de matières organiques, 45 % de matières minérales, 25 % d'air et 25 % d'eau (Boulaine, J., 2003. Géographie des sols).

#### b. Analyser l'histoire du site, les pratiques de gestion et les usages actuels

Il s'agit ici d'établir la liste la plus exhaustive possible des usages et pratiques de gestion actuels et passés. Cette liste pourra contenir, par exemple : des éléments sur les pratiques de pâturage (période, types d'animaux etc.), sur les méthodes de fauche (période, fréquence, hauteur de coupe, avec ou sans export des rémanents etc.), ou encore sur la circulation d'engins motorisés et la fréquentation par le public (fréquence, types et nombre de visiteurs etc.), etc. Il s'agira également de prendre en compte les besoins et les ressources disponibles en eau en lien avec les différents usages.



**Détail majeur : n'oubliez pas d'inclure d'éventuelles pratiques ou usages futurs à cette analyse lorsqu'un changement de vocation est envisagé.**

#### c. Recenser les atouts et les contraintes éventuelles du site pour le projet de végétalisation

Il s'agit ici d'intégrer les données du site concernant la réglementation ou la planification (identifier le positionnement du site vis-à-vis des trames et des continuités écologiques que sont les réservoirs de biodiversité ou les corridors écologiques – cf. *PARTIE 1, chapitre I* -, identifier les parcelles en zonage spécifique type zones vulnérables aux nitrates<sup>29</sup>).

À ces éléments peuvent encore s'ajouter des contraintes naturelles et géographiques (risques érosifs, pentes fortes, climat, présence d'espèces exotiques envahissantes etc.) ou liées à des aménagements d'infrastructures (bâtiments, routes, chemins etc.), ainsi que des documents ou plans de gestion existants.

**En résumé, il est important de notifier toutes les données obtenues durant cette phase pour les intégrer au projet de végétalisation et déterminer ce que l'on conservera de l'existant (cf. *PARTIE 1 - chapitre III.3*). De ces résultats dépendront en effet l'ensemble de vos choix et objectifs.**

## 2. Définir les objectifs du projet et faire des choix de conception

Après l'étape de diagnostic, il est important de mener une réflexion établissant clairement les objectifs du projet, lesquels guideront alors les choix de conception. On parle de conception différenciée lorsque ces choix diffèrent pour s'adapter aux objectifs et au diagnostic du site.

Les types de sites à aménager au sein des espaces publics sont nombreux : parc et jardin ; espace vert d'accompagnement et zone d'interface ; voirie urbaine et espace de circulation ; espace de stationnement ; cimetière ; terrain de sport ; friche et « délaissé » urbain ; cour d'école et plaine de jeux ; bord de rivière ; mare, etc.

Choisir des espèces indigènes sera plus ou moins pertinent en fonction des objectifs retenus pour chaque site. Ainsi, pour des projets de restauration écologique ou d'agroécologie, l'utilisation d'espèces indigènes est primordiale et évidente. Pour des projets d'aménagements paysagers, en revanche, l'intégration de végétaux indigènes en complémentarité de végétaux horticoles dépendra du parti pris initial et de la part donnée à la biodiversité et à l'approche naturelle et sauvage.

Expérimenter des plantes locales (telles que définies dans la *PARTIE 1, chapitre II.1*) dans les espaces de « nature en ville » et dans les zones d'interface entre le milieu urbain et le milieu plus naturel, permettra d'accroître la préservation et la valorisation de la biodiversité. Au-delà de ces atouts, cette approche incite les porteurs de projets à envisager des aménagements fondés sur la nature, améliorant le cadre de vie et répondant aux phénomènes d'îlots de chaleur ou encore de risques naturels.

**Penser l'organisation et la composition des espaces publics (et les continuités végétalisées entre les espaces publics et les espaces privés) est un point crucial pour aboutir à des formes urbaines qui seront favorables à la biodiversité.**

<sup>29</sup> Directive nitrates - Chambres d'agriculture France (chambres-agriculture.fr)



### 3. Une alternative à la plantation : conserver l'existant et laisser pousser la végétation locale spontanée

Repartir à zéro n'est pas l'approche à privilégier et, dans la majorité des cas, il est préférable de conserver les végétaux déjà implantés. Cette approche permet de ne pas déstructurer le sol lorsque celui-ci est de bonne qualité et favorise de surcroît une meilleure implantation des végétaux plantés. La végétation peut également repartir spontanément grâce à la banque de semences présentes dans le sol (graines, rhizomes). Le recours à la plantation n'est donc pas toujours une nécessité. Pour plus d'informations sur l'importance du sol et de sa conservation, se référer à la *PARTIE 1 - CHAPITRE III.5.C*.

Un site peut être colonisé spontanément par des espèces indigènes qui lui sont spécifiques et naturellement adaptées par le biais d'un changement de pratiques de gestion ou d'usages, mais aussi en laissant son potentiel s'exprimer librement sans la moindre intervention. Des haies vieillissantes pourront ainsi être restaurées par des opérations de recépage des feuillus et de regarnissage éventuel. Dans le cas où la végétation existante est en adéquation avec la vocation de l'aménagement programmé et qu'il ne s'agit pas de plantes exotiques envahissantes, ce type de démarche apporte un certain nombre d'avantages :

- ▶ **la structuration paysagère du site sera harmonieuse et cohérente**, avec une lecture du paysage plus homogène et compréhensible par les usagers et aménageurs du site ;
- ▶ **la rusticité** des végétaux spontanés locaux leur donne une résistance plus grande aux aléas climatiques et aux maladies ;
- ▶ **le stockage de carbone** est assuré en plus grandes proportions par les arbres matures que par les jeunes arbres<sup>30</sup> ;



Conservation des pins existants dans le projet de requalification du boulevard Aubanel à Miramas

- ▶ **les fonctionnalités écologiques intéressantes de captation et rétention de l'eau** pourront contribuer à la conservation de la structure du sol permettant de garder des conditions environnementales propices au développement des futures plantations ;
- ▶ **la diversité végétale locale** en place produira les ressources alimentaires pour les pollinisateurs, sans apport complémentaire de « matériel végétal » ;
- ▶ **le processus naturel** de sélection des espèces qui réapparaîtra sera mieux adapté aux conditions du terrain, participant ainsi à la conservation de la biodiversité. Cette dynamique se met rapidement en place, permettant l'établissement, dans un premier temps, d'espèces pionnières, le plus souvent annuelles ou bisannuelles, puis, dans un second temps, d'espèces vivaces (pérennes). Elle peut être maintenue volontairement à un stade particulier par le biais de la gestion ;
- ▶ sans achat de graines ni de plantes, les **coûts et temps de mise en œuvre** du projet seront plus faibles, tout en maintenant des écosystèmes fonctionnels et adaptés qui ne nécessitent pas ou peu d'entretien, en fonction de l'usage souhaité (milieux ouverts ou fermés).

<sup>30</sup> [www.epa.gov/heatislands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands](http://www.epa.gov/heatislands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands)



Végétation locale spontanée dans une prairie fleurie, parc des Myosotis à Marseille

Cette pratique peut être particulièrement adaptée pour des végétalisations de terre-pleins, de bordures de routes, de friches ou encore de fosses. Elle est également conseillée lorsque le site a été récemment perturbé et n'est plus végétalisé, ou s'il est situé en milieu naturel et semi-naturel avec une réserve de semences à proximité permettant sa revégétalisation spontanée.

Deux points seront alors à surveiller :

- ▶ le phénomène d'érosion du sol si la couverture végétale ne se met pas en place assez rapidement ;
- ▶ la colonisation possible par des EVEC sur un sol perturbé lorsque qu'il en pousse à proximité.

#### 4. Anticiper et dialoguer avec les producteurs pour établir le bon calendrier

**N'hésitez pas à échanger avec des pépiniéristes et semenciers sur leurs contraintes** – voire à établir des « contrats de culture » en cas de besoin (cf. *PARTIE 1, chapitre III.5.b*) - dans l'optique de mieux cadrer votre planning de mise en œuvre et d'y inclure tous les contretemps envisageables : délais de commandes, de production, de réception et de plantation (délais parfois provoqués par des facteurs environnementaux ou liés aux cycles de vie et de production des espèces).

Les plantes ont toutes un cycle de vie différent. Certaines fleurissent à l'automne, d'autres au printemps ou en été. De même, la période de plantation et de semis peut optimiser la croissance et la survie de certaines variétés. Il est ainsi préférable de planter les plantes ligneuses ou à bulbes à l'automne. En zone méditerranéenne, à cette même période, il est plutôt recommandé de semer (en fonction des espèces). Il est évidemment fortement déconseillé de planter en période de gel, notamment en zone alpine. En outre, un pied pourra donner beaucoup de graines une année, puis très peu l'année suivante. La croissance d'une plante herbacée en godet peut ne prendre qu'un mois quand celle d'un arbuste exigera deux ans. Certaines espèces sont aussi très contraignantes et difficiles à faire pousser par nature.

Même si les professionnels savent anticiper ces aléas, il est essentiel de bien intégrer ces contraintes dès le début afin de respecter le planning initial et de ne pas avoir à retarder le projet de végétalisation.

**Pour toutes ces raisons, vous pouvez vous rapprocher des pépiniéristes et semenciers très en amont du projet pour vous assurer du bon approvisionnement en végétaux et de la bonne périodicité de plantation ou de semis.**



## 5. Maintenant, végétalisons ! Quelques recommandations préalables à tout projet

Maintenant que le diagnostic est réalisé et que vous avez identifié les besoins et objectifs précis de votre projet d'aménagement, il est temps de préparer sa mise en œuvre sans oublier quelques paramètres indispensables à sa bonne réussite.

**Pour rappel, se référer pour plus de détails aux règles professionnelles<sup>31</sup> élaborées par les professionnels du secteur : elles vous aideront dans les différentes étapes de ce chapitre.**

### a. Le choix des espèces

Schématiquement, la végétation est composée de quatre strates : **muscinale<sup>32</sup>, herbacée, arbustive et arborescente.**

Sur un endroit donné, il est conseillé de favoriser au maximum la mixité entre ces différentes strates, favorisant ainsi une **végétation étagée.**



En termes de biodiversité, parce qu'elles en multiplient les niches écologiques, les strates jouent un rôle complémentaire pour les espèces qui les constituent. Pour un oiseau, par exemple, la strate arborescente formera un site de nidification (ponte, couvaion, puis nourrissage des oisillons) quand les strates plus basses (arbustive et herbacée) constitueront plutôt des territoires de chasse et de glanage pour la fabrication du nid ou un refuge où s'abriter et dormir. Ainsi, une végétation étagée favorisera la biodiversité et limitera le développement des espèces végétales exotiques envahissantes.

À noter que 80 % de la biodiversité d'une haie diversifiée à plusieurs étages se trouve sous le premier mètre de végétation<sup>33</sup>. Il est donc important de garantir une densité de végétation basse et de ne pas compter sur la seule strate arborée pour maintenir un potentiel de biodiversité. En termes d'ambiances, la constitution de strates végétales variées contribuera à offrir des paysages plus complexes, plus riches, pouvant structurer l'espace de façon différenciée.

<sup>31</sup> [www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/presentation-du-projet](http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/presentation-du-projet)

<sup>32</sup> La strate muscinale est composée de mousses et de lichens.

<sup>33</sup> Source AFAC.

**Il est aussi primordial d'encourager la plantation d'une végétation diversifiée.** Choisir un maximum d'espèces végétales, de variétés différentes, au sein d'un même aménagement ou d'une même composition, permet en effet de :

- ▶ créer une richesse d'ambiance, de texture, de graphisme, de variations de lumière et de teintes en fonction des saisons ;
- ▶ étendre la période de floraison et ainsi participer à la qualité paysagère et esthétique du site ;
- ▶ participer à une meilleure captation de l'eau de pluie par les plantes, à chaque étage de végétation ;
- ▶ établir un écosystème stable et ainsi favoriser un équilibre naturel dans lequel le risque de propagation des maladies sera diminué, notamment celles spécifiques à une espèce. Le nombre d'interventions nécessaires en sera réduit ;
- ▶ faciliter le déploiement de la biodiversité et participer à la continuité écologique de l'aménagement, favorisant son utilisation par un plus grand nombre d'espèces ;
- ▶ proposer aux insectes pollinisateurs une offre en pollen plus importante et variée, ce qui contribuera, en retour, au développement naturel de la végétation de votre aménagement ;
- ▶ attirer les auxiliaires de cultures qui seront des alliés contre les ravageurs.

Au-delà du nombre d'espèces retenues, et afin de répondre aux objectifs cités plus haut, le choix des plantes locales tiendra compte de plusieurs paramètres : hauteur, type de feuillage (espèce végétale à feuillage caduc<sup>34</sup> ou persistant), périodes de floraison, potentiel mellifère et nectarifère, etc.

**À ce stade, il ne s'agit pas « de faire son marché » sur un catalogue d'espèces mais bien d'appréhender le fonctionnement de communautés végétales pour un résultat pérenne.** Dans une logique de création d'un milieu vivant, la sélection des espèces à planter doit découler des caractéristiques du site lui-même ainsi que de celles des sites voisins. C'est la logique des palettes végétales établies en partie 2.

**Pour rappel, il est fortement recommandé d'être conseillé ou accompagné par des experts (naturalistes, écologues, paysagistes-concepteurs, etc.) sur les questions du choix et de l'association des espèces pour son aménagement végétalisé. Les mécanismes d'interrelations sont complexes et ne peuvent se construire en piochant simplement dans des listes.**



#### **Il est là pour vous aider : l'ingénieur écologue !**

L'ingénieur écologue analyse, mesure et prévoit l'impact des activités humaines sur l'environnement et la biodiversité. Il réalise des études d'impact, monte des dossiers réglementaires et fournit conseils et recommandations. Il agit donc en amont des projets, dans la mise en œuvre des recommandations et en aval sur le suivi de la mise en œuvre.

<sup>34</sup> Un arbuste ou un arbre caduc est un végétal perdant l'ensemble de son feuillage à l'automne.

### b. L'établissement du cahier des charges techniques : quelques éléments pour vous guider

Le nouveau fascicule 35<sup>35</sup> du cahier des clauses techniques générales 2021 (CCTG), applicable aux marchés publics de travaux de génie civil, offre un référentiel commun sur les aménagements paysagers, les aires de sports et de loisirs de plein air. Il permet de concevoir et réaliser des projets de végétalisation plus durables, répondant mieux aux enjeux environnementaux et sociétaux. Il institue un niveau de qualité des prestations dans le domaine de la fourniture de végétaux, de travaux de créations paysagères et de travaux d'entretien.

Il se compose de trois parties : nature et qualité des fournitures ; travaux de création ; travaux d'entretien.



Il existe divers labels qui caractérisent la provenance ou d'autres caractéristiques techniques du végétal. Quelques-uns d'entre eux sont décrits dans la *Partie 1 du chapitre II.3* dont la marque Végétal local. Attention, cette marque collective est relativement jeune. Pépiniéristes et semenciers en sont d'ailleurs à développer leurs propres gammes Végétal local, mais certaines espèces restent encore peu produites. Il n'est donc pas réaliste de commander de grandes quantités de végétaux labellisés sans s'assurer au préalable, lors de la préparation de son projet, que les producteurs auront bien la capacité de répondre à vos demandes (cf. *PARTIE 1 - chapitre III.4*).

En cas de commande d'espèces de la marque Végétal local, la région biogéographique associée à l'espèce (zone méditerranéenne ou zone alpine) doit être citée et pourra être contrôlée sur les bons de livraison. La marque Végétal local ne peut en effet pas être utilisée sans mention de la région biogéographique associée.

#### Il existe des documents techniques qui pourront vous guider :

- ▶ le guide de recommandations « Prescriptions techniques sur l'achat de végétaux sauvages et d'origine locale »<sup>36</sup> qui vous aidera dans la rédaction de CCTP de commande de végétaux labellisés Végétal local (consultez bien la dernière version à jour) ;
- ▶ le code de conduite sur les plantes exotiques envahissantes, proposé par Val'hor.



Le Contrat de culture (pour les plants herbacés ou ligneux) ou de récolte (pour les graines) est une solution appropriée pour garantir un approvisionnement en végétaux respectant des caractéristiques techniques précises. Il lie client et producteur (pépiniériste ou semencier) et permet de définir les espèces désirées, leur caractéristique, l'origine des graines (sauvages ou variétés horticoles). L'étape de collecte des graines en milieu naturel peut être intégrée au contrat si cela permet de faciliter le démarrage de la production de certaines espèces indigènes locales. La mise en place de ce contrat est également un soutien au développement d'une filière de végétaux labellisés rendue capable de planifier sa production.

<sup>35</sup> [www.lesentreprisesdupaysage.fr/fascicule-35](http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/fascicule-35)

<sup>36</sup> Version au moment de l'écriture du guide : [www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource\\_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf](http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf)



Au moment d'une commande, il est important d'utiliser **les noms scientifiques** des espèces, plus précis qu'un nom commun<sup>37</sup>. Il se compose du nom de genre suivi du nom de l'espèce puis, parfois, d'une troisième mention indiquant la sous-espèce ou la variété (nom scientifique / genre-espèce / sous-espèce, en latin). Le nom commun peut en effet être associé à plusieurs espèces différentes et il existe des variétés horticoles (dites « cultivars ») d'espèces indigènes. Ces variétés horticoles n'ont pas toutes conservées intégralement l'intérêt écologique de l'espèce indigène (par exemple, le nectar pourra être moins abondant) car elles ont été sélectionnées pour répondre à des objectifs de productivité (capacité de multiplication), d'esthétique (hauteur de la plante, couleurs et formes des fleurs, dimensions des fleurs etc.).

Les listes de la partie 2 indiquent systématiquement le nom scientifique (référentiel national TAXREF) à côté du nom commun pour vous faciliter la recherche.

De nombreux professionnels, spécialistes (concepteur paysagiste, jardinier paysagiste, pépiniériste etc.) sont là pour vous aider à choisir vos espèces : qualité des semences (provenance), qualité de la production (production locale, conteneurs adaptés, plants jeunes, non biberonnés, sans chignons racinaires etc.).



#### Il est là pour vous aider : le paysagiste-concepteur<sup>38</sup>

Les professionnels du végétal, qu'ils soient producteurs ou paysagistes, conseillent sur la palette végétale adaptée au projet d'aménagement choisi. Les entreprises du paysage apportent des techniques et des aménagements adaptés à la pérennité de l'aménagement souhaité, en lien étroit avec les ingénieurs écologues. Capable d'intégrer l'ensemble des enjeux propres à un territoire en s'appuyant sur une large culture scientifique et technique, le paysagiste-concepteur - également appelé architecte-paysagiste - est un acteur de la fabrication de la ville et des territoires de demain. Ses échelles d'interventions s'étendent du jardin au territoire et comprennent : les espaces publics, l'urbanisme opérationnel, les grandes infrastructures, les espaces naturels, culturels et ruraux, la planification, le grand territoire. À chacune de ces catégories correspond un éventail de commandes de natures différentes. Il est complémentaire et partenaire des autres métiers de la conception et de la maîtrise d'œuvre : écologue, architecte, urbaniste, ingénieur etc. avec lesquels il partage le projet d'aménagement.

Site de la Fédération Française du Paysage : [www.f-f-p.org](http://www.f-f-p.org)

Site de l'Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep) : [www.lesentreprisesdupaysage.fr](http://www.lesentreprisesdupaysage.fr)

FNPHP - Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières : <https://fnphp.fr>


<sup>37</sup> Attention, une espèce peut comporter plusieurs noms communs, nous n'en retiendrons qu'un seul pour les listes de la partie 2.

<sup>38</sup> La profession | Fédération Française du Paysage - FFP (<https://www.f-f-p.org/paysagiste-concepteur>)

### c. Le respect du sol et de la ressource en eau

Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations pour la mise en œuvre de votre projet concernant le sol et la ressource en eau.

► **Préserver les spécificités locales des sols (pH, azote, matière organique, etc.),** en proscrivant tout amendement modifiant les propriétés physico-chimiques du sol, les associations symbiotiques<sup>39</sup> et la microfaune, ainsi que tout remaniement du sol ou apport de matériaux extérieurs au site. Il convient d'adapter le cortège végétal implanté au type de sol présent et non l'inverse. Lors d'un aménagement, penser à conserver la couche superficielle du sol pour ainsi préserver la banque de graines qu'il contient. Il est aussi utile de laisser du bois mort se décomposer sur place, favorisant les espèces saproxyliques<sup>40</sup>.



<sup>39</sup> La symbiose est l'association étroite de deux ou plusieurs organismes différents, mutuellement bénéfique, voire indispensable à leur survie.

<sup>40</sup> Une espèce dite saproxylique réalise tout ou partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition, ou les produits de cette décomposition.

- ▶ **Mettre en place des plans de fumures<sup>41</sup>** adaptés qui peuvent proscrire l'usage d'engrais, y compris organiques, si les plants et le sol ne le nécessitent pas. Il est parfois nécessaire d'évacuer une éventuelle terre contaminée du trou de plantation, puis d'ajouter un substrat de culture, parfois amendé en engrais organiques, pour une meilleure reprise végétale.
- ▶ **Proscrire toute utilisation de films et bâches plastiques** et privilégier si nécessaire des matériaux naturels adaptés à votre site, de préférence auto produits ou locaux (pailles, Bois Raméal Fragmenté<sup>42</sup>, déchets verts, pailles de riz, galets, coquilles etc.). Dans ce cas, pensez à décaisser d'au moins 15 cm pour installer un paillage. Si le site est en pente et qu'un paillage auto-produit n'est pas envisageable, privilégier le paillage géotextile biodégradable en fibre naturelle (toile de lin ou de chanvre etc.).
- ▶ **Adopter les principes de la protection biologique intégrée** dans le cadre de la lutte contre les bioagresseurs (respect des pratiques culturales, prophylaxie, favorisation des prédateurs naturels) et **proscrire toute utilisation de produits phytopharmaceutiques** qu'ils soient de synthèse chimique ou d'origine naturelle (minérale, végétale ou animale), **y compris les produits phytopharmaceutiques de bio-contrôle<sup>43</sup>** (herbicides, fongicides, insecticides).
- ▶ **Utiliser la ressource en eau naturelle disponible** en utilisant le cheminement naturel de l'eau pluviale. Cela peut se matérialiser par la mise en place d'espaces de pleine terre en creux autour des végétaux, également appelés impluviums, ou de zones de stockage qui permettront de ralentir la vitesse d'écoulement de l'eau de ruissellement et d'obtenir ainsi une ressource en eau gratuite.

#### d. La préparation de la plantation

Les conseils ci-dessous sont à garder en tête pour la préparation de vos plantations et anticiper leur évolution.

- ▶ **Choisir des plants jeunes** qui s'installeront mieux et plus vite que des plants dont le système racinaire est déjà compromis par les contraintes du pot.
- ▶ **Anticiper l'envergure finale que peuvent atteindre les sujets plantés** en conditions optimales, pour garantir l'espace nécessaire et les distances de plantations adéquates. La distance de plantation sera idéalement définie en fonction des caractères morphologiques des espèces plantées et de leur emprise au sol et aérienne.
- ▶ **Éviter les distances de plantations trop courtes**, qui offrent peu de possibilités aux enrichissements spontanés par de nouvelles espèces.
- ▶ **Anticiper le volume des racines du végétal** afin que celles-ci puissent s'épanouir dans un sol bien vivant, sans être bloquées par un sol imperméabilisé ni engendrer des dégradations de revêtements de surface ou des réseaux enterrés. À noter que le volume des racines de l'arbre à taille adulte correspondra plus ou moins à celui de son houppier. Mieux vous anticiperez la taille adulte du végétal, plus vos coûts d'entretien seront réduits.

---

<sup>41</sup> La mise en place d'un plan de fumure permet de définir la stratégie de fertilisation et ainsi vérifier l'adéquation entre les besoins des plantes et les fournitures du sol, améliorer la gestion des effluents d'élevage et limiter les apports d'engrais. Pour plus d'information : site internet des chambres d'agriculture.

<sup>42</sup> Le Bois Raméal Fragmenté, ou Bois Raméaux Fragmentés (BRF), est un mélange non composté de résidus de broyage (fragmentation) de rameaux de bois (branches), issu majoritairement d'arbres feuillus.

<sup>43</sup> Site Ecophyto Pro : Ecophyto PRO : réduire et améliorer l'utilisation des phytos (ecophyto-pro.fr)  
L'article L.253-6 du CRPM définit les produits phytopharmaceutiques de bio-contrôle comme les produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ». Il s'agit des produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones, et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale ».



- ▶ Le cas échéant, **installer des tuteurs avant la plantation** afin d'éviter d'endommager les racines de la plante (attention aux liens de maintien qui peuvent se transformer en garrots ; ne pas oublier de les enlever lorsqu'ils ne sont plus nécessaires).
- ▶ **Conserver les végétaux déjà implantés et présents sur site et les intégrer dans l'aménagement programmé** (cf. PARTIE 1, chapitre III.3).



## 6. Et après ? Promouvoir une gestion écologique et différenciée

Appliquer une gestion différenciée permet d'adapter l'entretien des espaces en fonction de leurs usages et de leur intérêt écologique et paysager. **Accepter une gestion plus naturelle, y compris en milieu urbain et anthropisé<sup>44</sup>, est le premier pas vers une gestion durable.** Se référer pour plus de détails aux règles professionnelles<sup>45</sup> élaborées par les professionnels du secteur qui vous aideront dans les différentes étapes de cette partie entretien et gestion. **Attention, la gestion sera spécifique pour chaque aménagement, adaptée au contexte, au type de sol et aux végétaux implantés.** Néanmoins, nous pouvons introduire quelques généralités dans ce chapitre.

### a. Gérer la ressource en eau

Les variations climatiques provoquent d'ores et déjà une augmentation et une intensification des périodes de sécheresse. Il est donc nécessaire d'économiser la ressource en eau et de privilégier le paillage en ce sens. Pensez aussi à réutiliser les eaux traitées par les stations d'épuration si le contexte s'y prête, à utiliser de l'eau brute lorsque c'est possible et à récupérer l'eau de pluie si les conditions le permettent. Il conviendra d'adapter la gestion de la ressource en eau au contexte du sol et aux types de plantes présentes.

Dans de nombreux cas, la survie du végétal les premières années est conditionnée par un arrosage estival souvent indispensable en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut bien distinguer l'arrosage nécessaire en phase d'installation et celui des années suivantes. **Attention aux mélanges d'espèces : il faut associer des espèces qui ont des besoins analogues et adaptées aux conditions écologiques.** Par exemple, il ne faut pas associer des plantes de milieux humides dans un massif de plantes de milieux plutôt secs. Par exemple, trop arroser des cistes aimant les milieux secs et ensoleillés peut les faire mourir.



#### La tensiométrie

Pour assurer un bon arrosage avant d'atteindre l'autonomie hydrique du végétal, la tensiométrie est un outil efficace de suivi et d'optimisation de l'arrosage. La tensiométrie revient à mesurer le potentiel hydrique du sol de plantation à l'aide de capteurs introduits dans la fosse du futur végétal : si le sol est sec, le potentiel hydrique sera faible.

Ainsi, en mesurant le potentiel hydrique du sol, il est possible de savoir lorsqu'il est nécessaire d'arroser, et ainsi de ne jamais faire subir un stress hydrique à la plante - ou, a contrario, d'économiser sur l'arrosage excessif et par conséquent de faire des économies.

<sup>44</sup> Se dit d'un milieu modifié par l'intervention humaine.

<sup>45</sup> [www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/presentation-du-projet](http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/presentation-du-projet)

### b. Favoriser des pratiques alternatives à la tonte sur les surfaces enherbées

Pour déterminer le type de fauchage à mettre en œuvre dans chaque espace, il est essentiel d'identifier les enjeux et usages du site en amont. D'une façon générale, la fauche différenciée s'attache à faucher une surface selon les principes suivants :

- ▶ en plusieurs fois de manière alternée, « en mosaïque », afin de laisser des zones refuges et de la nourriture aux micromammifères et aux insectes ;
- ▶ préférentiellement de manière centrifuge (du centre de la parcelle vers l'extérieur) pour permettre aux animaux présents de s'échapper facilement et de se réfugier à l'extérieur de la zone fauchée ;



Illustration de fauchage tardif dans le parc urbain Bernard GIVAUDAN à Gap alliant la préservation de la biodiversité et la prise en compte des usages

- ▶ le moins souvent et le plus tard possible, pour éviter de perturber la faune en période de nidification, et pour permettre aux végétaux de disséminer leur graines (maintien des végétaux et multiplication sur le long terme sans interventions) ;
- ▶ le plus haut possible (au minimum 10 cm pour éviter de décaper le sol et de broyer la petite faune présente).

### III. MONTER UN PROJET DE VÉGÉTALISATION ÉTAPE PAR ÉTAPE



ARBE - GARRIDO Stéphanie

Entretien des espaces verts par écopâturage à Saint-Laurent-du-Var

L'écopâturage<sup>46</sup> est de plus en plus utilisé pour entretenir les surfaces enherbées. On retrouve ces pratiques non seulement sur des espaces très étendus ou des terrains difficiles d'accès mais aussi dans les parcs urbains.



ARBE - GARRIDO Stéphanie

#### Changer de regard et de relation avec la nature

L'herbe « haute » ne doit plus être signe de délaissement. Des espaces où les plantes herbacées ne sont pas tondues au ras du sol ne doivent plus être signes d'abandon ou de manque d'entretien, mais plutôt d'espaces naturels et sauvages. Pour faire passer ce message au grand public, l'enjeu est de communiquer autour de ce mode de gestion en apposant sur site des panneaux d'information.

Communication in situ sur la gestion différenciée des espaces verts à Mouans Sartoux

<sup>46</sup> Pour obtenir plus d'information sur les pratiques d'écopâturage maîtrisé : lien (points de vigilance, etc.) : règles professionnelles écopâturage : [www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/n-c-3-r0-travaux-deco-pastoralisme](http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/n-c-3-r0-travaux-deco-pastoralisme)



### c. Tailler moins souvent

Bien choisir les espèces (cf. PARTIE 1, chapitre III.5.a), permet aussi d'obtenir des végétaux adultes adaptés à l'espace disponible, ne nécessitant pas de taille et offrant un port naturel correspondant à l'effet recherché. Ne pas tailler permet de limiter les coûts d'entretien, de réduire les déchets verts et la propagation de maladies car la taille fragilise les végétaux et constitue une porte d'entrée pour les maladies.

Même dans le cas de jeunes arbres, ne pas intervenir reste possible, selon l'idée du potentiel de développement et de réorganisation naturelle des arbres. Une taille de formation<sup>47</sup> peut néanmoins se révéler nécessaire selon les besoins du site et du sujet, afin de préparer la forme ou les gabarits futurs (routes, façades, etc.) : par exemple, en cas de rupture accidentelle de la cime de l'arbre, ou en présence d'une forte codominance non désirée, ou encore lorsque le houppier définitif est destiné à être plus haut. Ces opérations de taille doivent alors être réalisées par étape plutôt que brutalement, afin de ne pas entraîner de phénomène de réaction comme l'apparition de suppléants. Pour cela, il faut prioriser ces étapes et ne pas hésiter à échelonner les opérations sur de nombreuses années jusqu'à l'obtention de la forme ou du gabarit souhaité.

Le port libre d'arbustes est également à favoriser pour les haies. En choisissant bien la palette végétale, on peut mélanger gabarits et ports de végétaux complémentaires avec un effet paysager intéressant.

### d. Privilégier l'enherbement et favoriser les auxiliaires

Aujourd'hui, le désherbage des espaces verts n'est plus systématique et la tendance est plutôt à l'enherbement. Il est préférable d'occuper l'espace avec des plantes choisies plutôt que de lutter constamment à obtenir un espace sans vie.

De fait, les plantations elles-mêmes représentent la première alternative aux produits phytopharmaceutiques<sup>48</sup> : si les plantations sont constituées d'espèces variées et les bio-agresseurs sont présents en nombre suffisant, elles forment un écosystème favorisant naturellement la présence d'auxiliaires. La nature opère et lutte naturellement et les dépenses sont limitées.

On distingue 3 types d'auxiliaires :

► **les décomposeurs**, qui transforment les débris de végétaux et d'animaux en humus, aèrent, ameublissent et enrichissent le sol (cloportes, staphylins, champignons et bactéries, etc.) ;




Les staphylins



Les cloportes

► **les prédateurs**, qui se nourrissent de bio-agresseurs (ou organismes nuisibles) tels que coccinelles, guêpes, hérissons, mésanges, chauves-souris se nourrissant de pucerons, chenilles, limaces etc.

À titre d'exemple, le hérisson se nourrit de limaces, et une larve de coccinelle peut dévorer jusqu'à 150 pucerons par jour ;



Les mésanges



Les chauves-souris

<sup>47</sup> <https://www.foretriveefrancaise.com/publications/voir/370/la-taille-des-arbres-d-ornement-2e-edition/n:541>

<sup>48</sup> Arrêté du 15 janvier 2021 qui étend les restrictions de la Loi Labbé à tous les espaces non agricoles fréquentés par des personnes : interdictions d'application de produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les espaces publics, d'habitation et accessibles au public (sauf exception produits de biocontrôles, utilisables en agriculture biologique, substances de bases, terrains de sport non accessibles au public ayant des enjeux de sécurité - voies rapides, sites industriels, etc.) depuis 1<sup>er</sup> juillet 2022.



► **les pollinisateurs**, qui butinent les fleurs et jouent ainsi un rôle fondamental dans la reproduction des plantes et dans la production végétale (abeilles, bourdons, papillons, syrphes etc.).



En favorisant la présence de ces auxiliaires, on pratique la lutte intégrée et on limite ainsi l'intervention humaine. Pour ce faire, il convient, complémentirement aux plantations, de conserver le plus grand nombre de micro-habitats tels que les restanques, les éboulis de pierre, les petits tas de bois secs, et de mettre en place, si nécessaire, des nichoirs ou des hôtels à insectes qui ont également une vocation pédagogique. **L'objectif n'est pas l'éradication des bio-agresseurs, mais le maintien de l'équilibre écologique en maintenant des seuils de tolérance adaptés aux végétaux.**

#### e. Suivre et évaluer

Afin de vérifier si les semis ou plantations ont bien réussi, il est parfois pertinent d'utiliser quelques indicateurs.

- Le suivi des espèces semées ou plantées permet de vérifier si la reprise de végétation est efficace et si les espèces choisies sont bien adaptées au projet. Pour cela, il est important de noter chaque année les espèces qui se développent sur la base de la liste des espèces semées ou plantées. Ce suivi permet d'adapter les semis ultérieurs ou de servir de référence à d'autres chantiers. Pour les ligneux, on notera le nombre de plants qui ont survécu.
- En ce qui concerne les chantiers de revégétalisation, le choix le plus simple et le plus efficace est le recouvrement de végétation. Dans le cadre de semis d'herbacées, le recouvrement se mesure via un suivi photographique effectué chaque année à la même période et à la même heure, ou par un suivi sur des zones fixes telles que des quadrats.







PARTIE 2

---

# LES PALETTES VÉGÉTALES



CBNA - BILLARD Gilbert



Les palettes végétales sont proposées par milieux, un milieu étant considéré, dans ce guide, comme un ensemble homogène structuré par des éléments abiotiques<sup>49</sup> c'est-à-dire non-vivants (pH du sol, humidité du sol, ensoleillement, présence de minéraux etc.) et/ou des végétaux, qui façonnent le paysage.

**Chacun de ces « milieux » – boisés, ouverts et humides - sont caractérisés par des fonctionnalités écologiques et une biodiversité particulière : ils constituent un écosystème où les interactions sont nombreuses et spécifiques entre la faune, la flore, et leur environnement biotique<sup>50</sup>. Ils sont également porteurs d'une ambiance et d'une esthétique bien particulières dont vous pouvez être à la recherche pour vos aménagements. C'est bien la mosaïque de milieux qui est recherchée pour favoriser la biodiversité ainsi que le cortège floristique qui lui est associé.**

Ces trois « milieux » sont présentés et accompagnés d'une liste d'espèces végétales dans les trois chapitres suivants :



« **Plantons des arbres** » pour les milieux boisés,



« **Fleurissons nos prairies** » pour les milieux ouverts,



« **Plantons les pieds dans l'eau** » pour les milieux humides.

Les milieux boisés, ouverts et humides ne se retrouvent pas uniquement dans les zones naturelles ou semi-naturelles mais également en zones urbaines. En effet, en fonction des choix d'aménagements, nous pouvons retrouver ces milieux dans le tissu urbain.

C'est pourquoi, cette partie comprend également un chapitre dédié aux aménagements spécifiques de milieux urbanisés :



« **Végétalisons nos villes et nos villages** ».

Ces milieux urbanisés définis dans ce guide avec des sols très pauvres, sinon inexistantes, ne font pas l'objet d'une liste d'espèces végétales à part entière car les espèces végétales listées dans les « milieux » boisés, ouverts et humides peuvent être adaptées à un contexte urbain en fonction des aménagements.

Il existe néanmoins un certain manque de retours d'expériences sur l'usage de ces espèces dans le contexte urbain.

À vous, aménageurs, paysagistes, collectivités, etc., d'expérimenter les espèces indigènes en milieu plus urbanisé en intégrant le contexte et les contraintes spécifiques (absence de sol, pollution, etc.).

**Cette approche par milieux vous guidera pour créer des aménagements diversifiés dans les zones d'interface entre la zone urbaine et la zone naturelle. Nous vous incitons à créer une mosaïque de « milieux » lorsque cela est possible, en tentant d'associer espaces ouverts, points d'eau et/ou bosquets d'arbres, etc. Cela revient à créer différents micro-habitats propices à une plus grande diversité d'espèces végétales et animales ainsi que des aménagements plus esthétiques et fonctionnels.**

Le territoire régional, du fait de ses spécificités écologiques est extrêmement riche en espèces indigènes. Les palettes végétales proposent donc uniquement des espèces indigènes ubiquistes, c'est-à-dire suffisamment généralistes pour être intégrées à une vaste gamme de typologie d'espaces allant du gradient le plus minéral au plus naturel. **Des « zooms » par « milieux » vous sont proposés à titre d'exemples afin d'illustrer certaines possibilités d'aménagements.**

Il s'agit bien d'un premier outil, fourni à titre indicatif pour vous guider dans la réflexion et non d'un catalogue de listes d'espèces « clé en main » dans lequel piocher sans accompagnement préalable. Il est primordial de se référer aux experts de terrain qui, bien mieux que n'importe quel guide, vous accompagneront dans la définition et la mise en œuvre d'un projet de végétalisation.

---

<sup>49</sup> Éléments abiotiques : représente l'ensemble des éléments physico-chimiques.


<sup>50</sup> Environnement biotique : ensemble des interactions du vivant sur le vivant dans un écosystème.

Pour chaque chapitre, deux listes sont proposées : elles sont structurées par grands types végétatifs (grands types biologiques) et par ordre alphabétique pour en faciliter la lecture.

Ainsi, pour chaque milieu :

- **une liste sous forme de vignettes**, avec photographies, présente différentes informations : le nom scientifique et le nom commun de l'espèce et les critères de reconnaissance (couleur de la fleur, caractéristiques climatique et du sol etc.), les particularités (intérêts pour la faune et fonctions écologiques, etc.), le conditionnement, les autres milieux concernés où l'espèce peut se retrouver, les zones biogéographiques concernées (Alpes et/ou Méditerranée\*) ;
- **une liste sous forme de tableaux** donne des informations plus succinctes.

Pour faciliter la lecture des vignettes, certaines de ces informations sont présentées à l'aide de pictogrammes dont voici la légende :











Vignette type, exemple fictif.

Lorsque les données ne sont pas connues, un tiret apparaît à la place du pictogramme.

\* Pour plus d'informations sur l'affichage en liste « Alpes », liste « Méditerranée » ou encore « Alpes et Méditerranée » dans les vignettes et les tableaux, se référer à la méthodologie en annexe.

Détails des caractéristiques présentes dans les vignettes des espèces végétales

<b>MILIEUX</b>	 Plantons des arbres et des arbustes	 Fleurissons nos prairies			
	 Plantons les pieds dans l'eau	 Végétalisons nos villes et nos villages			
<b>LISTES</b>	Alpes	Méditerranée	Alpes & Méditerranée		
<b>TYPE VÉGÉTATIF</b>	 Arbre	 Arbre de petite taille	 Arbrisseau (arbuste)		
	 Liane arborescente	 Vivace	 Vivace à rhizome		
<b>HAUTEUR</b>	 En centimètres ou mètres				
<b>TYPE DE FEUILLAGE</b>	 Caduc	 Semi-persistant	 Persistant		
<b>MOIS FLORAISON</b> Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.	<b>COULEUR FLEUR</b>	 Pétales colorés différemment si plusieurs couleurs			
	<b>EXPOSITION/ENSOLEILLEMENT</b>	 Lumière	 Mi-ombre	 Ombre	
	<b>TEMPÉRATURE</b>	 Tempéré	 Froid	 Chaud	
	<b>HUMIDITÉ DU SOL</b>	 Très sec	 Sec	 Temporairement humide	 Humide
	<b>TEXTURE DU SOL</b>	 de argile à rocher (barre graduée de 0 à 9)	<b>pH</b>  Neutre  Acide		
	<b>TOLÉRANCE À LA SALINITÉ</b>	 de non tolérant à très tolérant (barre graduée de 0 à 9)			
	<b>GÎTE</b>	 Abri-refuge, nidification			
<b>DISPONIBILITÉS EN RESSOURCES ALIMENTAIRES</b>	 Nourriture (pour les insectes, poissons, oiseaux, mammifères, etc.)				
<b>CONDITIONNEMENT</b>	 Semence, graine, godet, motte (mini-motte, maxi-motte), arrachis				
<b>INTERDICTION DE CUEILLETTE</b>	 Interdiction de cueillette dans un département donné				

Pour plus de détails, reportez-vous à l'annexe 1 – Plantons local : la méthodologie.



Pour rappel, la spécificité n'a pas été recherchée dans ce guide, l'ensemble des espèces répertoriées dans la zone méditerranéenne peut s'adapter au littoral provençal (projet LIFE Habitats Calanques).

Certaines caractéristiques liées aux risques incendies, à l'adaptation au changement climatique et à la santé publique (allergies respiratoires, toxicité, réactions cutanées, brûlures, etc.) ne sont pas présentées dans les listes. Ces éléments sont importants à prendre en compte en particulier dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de multiplication des incendies. Toutefois, ces espèces peuvent être utilisées à bon escient dans les projets de végétalisation, toujours en gardant en tête de privilégier la diversification des espèces à planter.

Pour en savoir plus, consulter la législation sur l'obligation d'information sur les plantes à risques pour la santé<sup>51</sup> ainsi que le kit « Loi Santé »<sup>52</sup> comportant des outils prêts à l'emploi mis à disposition par Val'Hor.

<sup>51</sup> L'arrêté du 4 septembre 2020 relatif à l'information préalable devant être délivrée aux acquéreurs de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2021.

Consulter l'arrêté : <https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YpQTV0oS989MjCvHSeGcVclu2zLZQg93bhz0fbNUjoU=>

Site ressources : <https://plantes-risque.info>

Pour en savoir plus, consulter le réseau national de surveillance aérobiologique : <https://www.pollens.fr>

<sup>52</sup> <https://www.valhor.fr/labels-outils/loi-sante>







# I. MILIEUX BOISÉS : PLANTONS DES ARBRES ET DES ARBUSTES



La liste proposée dans ce chapitre inclut des espèces d'arbres, arbustes et herbacées qu'il est possible d'utiliser de cette manière :

- ▶ arbres isolés ou d'alignement ;
- ▶ haies champêtres ;
- ▶ bosquets ;
- ▶ forêts, fourrés ;
- ▶ ourlets, clairières forestières ;
- ▶ maquis, garrigue, pinède, etc.

L'arbre ou l'arbuste, qu'il soit seul au milieu d'un champ ou dans une forêt, représente une multitude de micro-habitats abritant une communauté faunistique particulière. Il pourra créer un point d'accroche dans le paysage ou offrir une fraîcheur salvatrice.

Le milieu boisé est un espace où les arbres sont généralement la forme végétale dominante, leurs cimes se chevauchant ou s'imbriquant de manière à former une voûte ombragée plus ou moins continue. Il se caractérise par différentes strates de végétation. Sa densité en arbres influe sur la quantité de lumière atteignant le sol à travers la canopée<sup>53</sup> : plus elle est grande, plus la variété de plantes pouvant prospérer sur son sol est vaste (mousses, fougères, petites herbes à fleurs, graminées, arbustes etc.).

Depuis l'antiquité, l'arbre est sorti de sa forêt pour accompagner les villes et les villages dans leurs évolutions paysagères. Grâce à sa longévité, son cycle marquant les saisons, et ses dimensions, il est un repère spatial et temporel. Trop souvent considéré comme un simple mobilier urbain et paysager, il est pourtant essentiel et les nombreux services écosystémiques qu'il rend ne sont plus à démontrer :

- ▶ la conservation de la biodiversité : corridor écologique, refuge et nourrissage de l'avifaune (insectes et micromammifères) ;
- ▶ la limitation du ruissellement et de l'érosion des sols ;
- ▶ la fonction de barrière physique contre les produits phytosanitaires, d'épuration des eaux et de limitation de la pollution des sols ;
- ▶ la fonction de brise-vent ;
- ▶ la stabilisation et l'enrichissement des sols ;
- ▶ la protection des animaux d'élevage et des cultures ;
- ▶ l'augmentation des rendements agricoles, par le fait d'attirer des auxiliaires de culture ;
- ▶ le stockage du carbone ;
- ▶ la production de bois ;
- ▶ la qualité esthétique ;
- ▶ la réduction de chaleur par évapotranspiration et ombrage.

---

<sup>53</sup> « Correspond à l'étage supérieur de la forêt directement influencé par les rayonnements du soleil. Il comprend les couronnes de feuilles de l'ensemble des arbres d'un territoire et forme dans les environnements urbains ce que l'on nomme une forêt diffuse. Cette partie de l'arbre est en charge de la photosynthèse, elle absorbe et séquestre le gaz carbonique tout en produisant et diffusant de la vapeur d'eau, ce processus bioclimatique est essentiel et participe au rafraîchissement de l'air », d'après « Une canopée pour la Métropole de Lyon », Décembre 2018.





ARBE - GARRIDO Stéphanie

### Intérêt des arbres morts

Il est important de veiller à la conservation des vieux arbres, des arbres morts et des arbres à cavités, tout en veillant avec soin à la sécurité des personnes. Ces arbres constituent en effet un milieu de vie très particulier, différent de celui qu'offrent les arbres vivants, et dont dépendent d'innombrables espèces d'insectes, de mammifères, d'oiseaux, de mollusques, de champignons, de bactéries, de plantes (mousses, algues, fougères etc.). Il est important de disposer d'arbres de différentes grosseurs, exposés de manière variée (au soleil, à l'ombre, en contact avec le sol, avec l'eau) et aux stades successifs de décomposition.

Maintien sur un site fréquenté des bords du Verdon d'un arbre mort coupé à Gréoux-les-Bains



## LES HAIES CHAMPÊTRES

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme le reste du territoire français, a subi et continue de subir une disparition massive de ses linéaires de haies. Cela reste néanmoins un élément identitaire fort de plusieurs paysages de la région comme dans la Vallée du Rhône ou comme le bocage champaurin. Le terme « haies » regroupe un grand nombre de formations végétales, en général, linéaires, avec pour fonction principale de délimiter les espaces. Elles peuvent être classées en quatre grandes familles :

- ▶ les haies libres ou vives ;
- ▶ les haies taillées ;
- ▶ les petits, moyens et grands brise-vent ;
- ▶ les bandes arbustives.

Les haies « champêtres », éléments structurants du paysage, sont des haies constituées de plusieurs espèces d'arbres, d'arbustes et de plantes grimpantes, qui séparent les parcelles dans les champs et rendent de nombreux autres services écosystémiques. Elles protègent cultures et animaux du vent, attirent les pollinisateurs et contribuent à stabiliser le sol. Elles relient les écosystèmes voisins et constituent elles-mêmes des écosystèmes à part entière ! Elles fournissent refuge, nourriture et abri pour la nidification de nombreuses espèces et servent également de corridor écologique. Ce sont ces caractéristiques qui rendent les haies si riches et importantes pour la biodiversité.


Pour délivrer l'ensemble de ces services écosystémiques et permettre d'accueillir une faune variée, une haie doit notamment être constituée d'une strate arbustive en plus de la strate arborée, composée d'essences variées dont des arbres ou arbustes à baies, et être d'une largeur suffisante.

Les espèces proposées dans ce guide vous aideront pour composer des haies champêtres.





## LES ARBRES D'ALIGNEMENT ET LES BOSQUETS



ARBE - GARRIDO Stéphanie

Essences variées d'arbres et d'arbustes composant le jardin Simian à Miramas

Les arbres d'alignement sont généralement plantés de façon linéaire et régulière le long des voies de circulation, que ce soit pour les embellir ou pour les ombrager. Or il s'agit de proposer des arbres d'alignement diversifiés adaptés à leur milieu, en considérant l'espace disponible et les contraintes. La diversification des essences au sein d'un alignement d'arbres permet en effet d'assurer une meilleure résistance aux maladies et aux ravageurs (dans certaines villes, le chancre du platane a conduit à l'abattage massif d'alignements de platanes âgés, supprimant parfois toute végétation des rues concernées).

Composés d'essences variées, les petits îlots d'arbres ou d'arbustes sont considérés comme un élément très structurant des paysages et présentent généralement un grand intérêt pour la biodiversité.

La faune associée est elle aussi très variée : des oiseaux, des insectes, et surtout de très nombreux petits mammifères qui y trouvent simultanément un refuge, une source d'alimentation et un lieu de reproduction.



Le lierre n'est pas une menace pour les arbres. De plus, sa floraison est attractive et tardive pour les pollinisateurs, ses fruits appréciés par les oiseaux à une période où les sources de nourriture sont rares. Son feuillage persistant et touffu fait du lierre un véritable habitat offrant caches et ressources alimentaires pour de nombreuses espèces.



LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE



**Acer campestre L., 1753**

Érable champêtre



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

Arbre 25 m

Sun icon, Thermometer icon

Water drop icon, pH icon Neutre

Shovel icon, Fertilizer icon, Bottle icon

Nectar +++  
Pollen +

Godet icon Semence

Espèce supportant la pollution et adaptée à des sols secs et compacts. Intéressante en bosquet, haie et comme brise-vent. Floraison discrète. Les racines fixent le sol (lutte contre l'érosion des sols). Espèce allergisante.

LISTE MÉDITERRANÉE



**Acer monspessulanum L., 1753**

Érable de Montpellier



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

Arbre 15 m

Sun icon, Thermometer icon

Water drop icon, pH icon Neutre

Shovel icon, Fertilizer icon, Bottle icon

Nectar +++  
Pollen ++

Godet icon Semence

Espèce qui s'adapte aux sols pauvres et tolérante à la sécheresse. Brise-vent. Petit arbre.

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE



**Acer opalus Mill., 1768**

Érable à feuilles d'obier



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - PACHE Gilles

Arbre 22 m

Sun icon, Thermometer icon

Water drop icon, pH icon Neutre

Shovel icon, Fertilizer icon, Bottle icon

Nectar +++  
Pollen +

Godet icon Semence

LISTE ALPES



**Acer platanoides L., 1753**

Érable plane



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

Arbre 30 m

Sun icon, Thermometer icon

Water drop icon, pH icon Neutre

Shovel icon, Fertilizer icon, Bottle icon

Nectar +++  
Pollen +

Godet icon Semence

Croissance très rapide. Plante ornementale tolérante à la pollution.

LISTE ALPES



**Acer pseudoplatanus L., 1753**

Érable sycomore



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - VILLARÉ Jean-Charles

Arbre 38 m

Sun icon, Thermometer icon

Water drop icon, pH icon Neutre

Shovel icon, Fertilizer icon, Bottle icon

Nectar +++  
Pollen ++

Godet icon Semence

Espèce brise-vent. Croissance rapide. Tolère les embruns.

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE



**Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847**

Alisier blanc



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

Arbre

Sun icon, Thermometer icon

Water drop icon, pH icon Neutre

Shovel icon, Fertilizer icon, Bottle icon

Nectar +  
Pollen +

Godet icon Semence

Fruits comestibles par l'Homme et la faune sauvage. Espèce peu résistante aux fortes chaleurs.





## LISTE ALPES

**Betula pendula Roth, 1788**

Bouleau pleureur



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

Arbre  
30 m

pH Neutre



Nectar ++

-

-

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Celtis australis L., 1753**

Micocoulier de Provence



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - DALMAS Jean-Pierre

Arbre  
-

pH Neutre



-

-



Semence

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Cormus domestica (L.) Spach, 1834**

Cormier



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - MORVANT Yves

Arbre  
-

pH Neutre

Nectar +  
Pollen +Nidification  
pollinisateurs

-

-

Fruits comestibles par l'Homme et la faune sauvage.  
Espèce qui s'adapte en environnement urbain. Supporte mal la concurrence d'autres arbres.

## LISTE ALPES

**Fagus sylvatica L., 1753**

Hêtre des forêts



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - PACHE Gilles

Arbre  
35 m

pH Neutre



Pas nectarifère

-



Godet

-

## LISTE ALPES

**Fraxinus excelsior L., 1753**

Frêne élevé



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

Arbre  
-

pH Neutre

Nectar +  
Pollen +

-

Godet  
Semence

-

Tolérant à l'air marin et aux vents, croissance rapide.  
Allergisante ++

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Ilex aquifolium L., 1753**

Houx commun



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - MORVANT Yves

Arbre  
10 m

pH Neutre

Nectar +  
Pollen +

-



Godet

04  
06  
84

Utilisation comme haie semi-défensive. Fruits comestibles par la faune sauvage. Supporte le plein soleil.



LISTE ALPES

**Laburnum anagyroides Medik., 1787**  
Aubour faux ébénier

		↕	Arbre -	
Jan.		☀	☀	🌡
Fév.		☀	☀	🌡
Mars		☀	☀	🌡
Avr.		☀	☀	🌡
Mai		☀	☀	🌡
Juin		☀	☀	🌡
Jui.		☀	☀	🌡
Août		☀	☀	🌡
Sept.		☀	☀	🌡
Oct.		☀	☀	🌡
Nov.		☀	☀	🌡
Déc.	☀	☀	🌡	
	CBNA - GARRAUD Luc	☕	Nectar ++ Pollen ++	-

CBNA - GARRAUD Luc

Espèce toxique pour l'Homme, pour certains herbivores et appétente pour d'autres. Bois intéressant. Pertinente pour une pépinière d'élevage.

LISTE ALPES

**Larix decidua Mill., 1768**  
Mélèze d'Europe

		↕	Arbre -	
Jan.		☀	☀	🌡
Fév.		☀	☀	🌡
Mars		☀	☀	🌡
Avr.		☀	☀	🌡
Mai		☀	☀	🌡
Juin		☀	☀	🌡
Jui.		☀	☀	🌡
Août		☀	☀	🌡
Sept.		☀	☀	🌡
Oct.		☀	☀	🌡
Nov.		☀	☀	🌡
Déc.	☀	☀	🌡	
	CBNMed - LABROCHE Aurélien	☕	-	-

CBNMed - LABROCHE Aurélien

LISTE MÉDITERRANÉE

**Laurus nobilis L., 1753**  
Laurier noble

		↕	Arbre -	
Jan.		☀	☀	🌡
Fév.		☀	☀	🌡
Mars		☀	☀	🌡
Avr.		☀	☀	🌡
Mai		☀	☀	🌡
Juin		☀	☀	🌡
Jui.		☀	☀	🌡
Août		☀	☀	🌡
Sept.		☀	☀	🌡
Oct.		☀	☀	🌡
Nov.		☀	☀	🌡
Déc.	☀	☀	🌡	
	CBNMed - MORVANT Yves	☕	Pollen +	-
		🔥	Semence	-

CBNMed - MORVANT Yves

Floraison précoce. Supporte les sols calcaires. Propriétés médicinales. Sensible aux parasites et au gel.

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

**Malus sylvestris Mill., 1768**  
Pommier sylvestre

		↕	Arbre -	
Jan.		☀	☀	🌡
Fév.		☀	☀	🌡
Mars		☀	☀	🌡
Avr.		☀	☀	🌡
Mai		☀	☀	🌡
Juin		☀	☀	🌡
Jui.		☀	☀	🌡
Août		☀	☀	🌡
Sept.		☀	☀	🌡
Oct.		☀	☀	🌡
Nov.		☀	☀	🌡
Déc.	☀	☀	🌡	
	CBNA - BILLARD Gilbert	☕	Nectar +++ Pollen +	-
		🔥	Godet Semence (peu)	-

CBNA - BILLARD Gilbert

Fruits comestibles.

LISTE MÉDITERRANÉE

**Phillyrea latifolia L., 1753**  
Phillyrée à feuilles larges

		↕	Arbre -	
Jan.		☀	☀	🌡
Fév.		☀	☀	🌡
Mars		☀	☀	🌡
Avr.		☀	☀	🌡
Mai		☀	☀	🌡
Juin		☀	☀	🌡
Jui.		☀	☀	🌡
Août		☀	☀	🌡
Sept.		☀	☀	🌡
Oct.		☀	☀	🌡
Nov.		☀	☀	🌡
Déc.	☀	☀	🌡	
	CBNMed - MORVANT Yves	☕	-	-

CBNMed - MORVANT Yves

LISTE ALPES

**Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936** - Pin à crochets

		↕	Arbre -	
Jan.		☀	☀	🌡
Fév.		☀	☀	🌡
Mars		☀	☀	🌡
Avr.		☀	☀	🌡
Mai		☀	☀	🌡
Juin		☀	☀	🌡
Jui.		☀	☀	🌡
Août		☀	☀	🌡
Sept.		☀	☀	🌡
Oct.		☀	☀	🌡
Nov.		☀	☀	🌡
Déc.	☀	☀	🌡	
	CBNA - VILLARET Jean-Charles	☕	-	-

CBNA - VILLARET Jean-Charles





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Prunus avium (L.) L., 1755**

Merisier vrai



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - MORVANT Yves



Arbre



Neutre

Nectar ++  
Pollen ++Godet  
Semence

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Quercus ilex L., 1753**

Chêne vert



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - ANDRIEU Frédéric



Arbre



Neutre

Nectar +  
Pollen +

Semence

Stabilise les sols.

Espèce résistante aux incendies et aux maladies.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Quercus pubescens Willd., 1805**

Chêne pubescent



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette



Arbre



Neutre



-

Semence

## LISTE ALPES

**Salix caprea L., 1753**

Saufe marsault



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette



Arbre



Neutre

Nectar +++  
Pollen +++

-

Floraison précoce. Plantation dans les haies au bord des cours d'eau. Espèce allergisante.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Sambucus nigra L., 1753**

Sureau noir



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert




Arbre



Neutre



Pollen +

Nidification  
pollinisateursGodet  
Semence**Tilia platyphyllos Scop., 1771**

Tilleul à grandes feuilles



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert



Arbre

35 m



Neutre

Nectar ++  
Pollen ++

Godet

Fruits comestibles par l'Homme (si cuits) et par la faune sauvage. Propriétés médicinales. Espèce peu résistante à la sécheresse.

Fruits comestibles par la faune. Propriétés médicinales. Espèce allergisante +



LISTE ALPES

***Ulmus glabra* Huds., 1762**  
Orme glabre

		↕	Arbre		
Jan.		☀	🌡		
Fév.		💧	pH	Neutre	
Mars		🌱			
Avr.		-			
Mai		-			
Juin		-			
Jui.		-			
Août		-			
Sept.		-			
Oct.		-			
Nov.		-			
Déc.	-				

CBNA – BILLARD Gilbert

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Ulmus minor* Mill., 1768**  
Orme mineur

		↕	Arbre		
Jan.		☀	🌡		
Fév.		💧	pH	Neutre	
Mars		🌱			
Avr.		-			
Mai		-			
Juin		-			
Jui.		-			
Août		🍽		Nectar +++	
Sept.		-		Pollen +++	
Oct.		-			
Nov.		-			
Déc.	-				

CBNA – BILLARD Gilbert

Floraison précoce. Espèce allergisante +

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Amelanchier ovalis* Medik., 1793**  
Amélanhchier ovale

		↕	Arbre petite taille 3 m		
Jan.		☀	🌡		
Fév.		💧	pH	Neutre	
Mars		🌱			
Avr.		-			
Mai		-			
Juin		-			
Jui.		-			
Août		🍽		Nectar ++	
Sept.		-			
Oct.		-			
Nov.		-			
Déc.	-				

CBNA – GARRAUD Luc

Fruits comestibles par l'Homme et la faune sauvage.

LISTE MÉDITERRANÉE

***Arbutus unedo* L., 1753**  
Arbousier commun

		↕	Arbre petite taille 15 m		
Jan.		☀	🌡		
Fév.		💧	pH	Acide	
Mars		🌱			
Avr.		-			
Mai		-			
Juin		-			
Jui.		-			
Août		🍽		Nectar ++	
Sept.		-		Pollen ++	
Oct.		-			
Nov.		-			
Déc.	-				

CBNA – GARRAUD Luc

Propriétés médicinales. Fruits comestibles. Espèce peu adaptée à la sécheresse.

LISTE MÉDITERRANÉE

***Buxus sempervirens* L., 1753**  
Buis toujours vert

		↕	Arbre petite taille		
Jan.		☀	🌡		
Fév.		💧	pH	Neutre	
Mars		🌱			
Avr.		-			
Mai		-			
Juin		-			
Jui.		-			
Août		-			
Sept.		-			
Oct.		-			
Nov.		-			
Déc.	-				

CBNA – BILLARD Gilbert

Attention à la pyrale du buis.

LISTE MÉDITERRANÉE

***Cistus albidus* L., 1753**  
Ciste blanc

		↕	Arbre petite taille		
Jan.		☀	🌡		
Fév.		💧	pH	Neutre	
Mars		🌱			
Avr.		-			
Mai		-			
Juin		-			
Jui.		-			
Août		-			
Sept.		-			
Oct.		-			
Nov.		-			
Déc.	-				

CBNA – GARRAUD Luc





## LISTE MÉDITERRANÉE

**Cornus mas L., 1753**

Cornouiller mâle



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - LEGLAND Thomas

Arbre  
petite taille  
5 m

Neutre



Nectar ++

Pollen ++



Floraison précoce. Fruits comestibles par l'Homme et la faune sauvage. Feuillage consommé par la faune sauvage. Supporte un sol riche en calcaire.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Cornus sanguinea L., 1753**

Cornouiller sanguin



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - GARRAUD Luc

Arbre  
petite taille

Neutre



Nectar ++

Pollen +



Godet

Semence



Fruits comestibles par la faune sauvage, ne pas utiliser la sous-espèce horticole « australis » invasive. Faiblement toxique pour l'Homme.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Corylus avellana L., 1753**

Noisetier commun



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - DALMAS Jean-Pierre

Arbre  
petite taille

Neutre



Pollen +++



Godet



Floraison précoce.  
Espèce allergisante +++

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Cotinus coggygria Scop., 1771**

Arbre à perruque



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - DIXON Lara

Arbre  
petite taille

Neutre



-



Semence



Très bonne pionnière sur sols pauvres et minéraux.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Crataegus monogyna Jacq., 1775**

Aubépine à un style



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

Arbre  
petite taille

Neutre



Nectar ++

Pollen ++





LISTE MÉDITERRANÉE

***Erica arborea* L., 1753**

Bruyère arborescente

		↕	Arbre petite taille	-	
Jan.					
Fév.					
Mars		💧	pH	Acide	
Avr.					
Mai					
Juin					
Jui.					
Août			Nectar +	Pollen +	-
Sept.					
Oct.			Godet		-
Nov.					
Déc.					

CBNMed - PIRES Mathias

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Euonymus europaeus* L., 1753**

Fusain d'Europe

		↕	Arbre petite taille	-		
Jan.						
Fév.						
Mars		💧	pH	Neutre		
Avr.						
Mai						
Juin						
Jui.						
Août			Nectar ++	Pollen +		Nidification pollinisateurs
Sept.						
Oct.			Godet	Semence	-	
Nov.						
Déc.						

CBNMed - MORVANT Yves

Toxique pour l'Homme.

LISTE ALPES

***Euonymus latifolius* (L.) Mill., 1768**

Fusain à feuilles larges

		↕	Arbre petite taille	-
Jan.				
Fév.				
Mars		💧	pH	Neutre
Avr.				
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				

CBNA - BILLARD Gilbert

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Hippocrepis emerus* (L.) Lassen, 1989**

Hippocrépide faux baguenaudier

		↕	Arbre petite taille	-
Jan.				
Fév.				
Mars		💧	pH	Neutre
Avr.				
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.			Godet	Semence
Déc.				

CBNA - VILLARET Jean-Charles

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Ligustrum vulgare* L., 1753**

Trène commun

		↕	Arbre petite taille	-	
Jan.					
Fév.					
Mars		💧	pH	Neutre	
Avr.					
Mai					
Juin					
Jui.					
Août			Nectar ++	Pollen +	-
Sept.					
Oct.					
Nov.			Godet	Semence	-
Déc.					

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

Fruits comestibles par la faune sauvage. Fleurs très odorantes. Baies toxiques pour l'Homme. Espèce très allergisante.

LISTE ALPES

***Lonicera xylosteum* L., 1753**

Chèvrefeuille des haies

		↕	Arbre petite taille 2 m	-	
Jan.					
Fév.					
Mars		💧	pH	Neutre	
Avr.					
Mai					
Juin					
Jui.					
Août			Nectar ++	-	-
Sept.					
Oct.					
Nov.			Godet	-	-
Déc.					

CBNA - BILLARD Gilbert

Fruits comestibles par la faune sauvage. Baies vomitives. Espèce tolérante à la pollution mais sensible à la sécheresse.





## LISTE MÉDITERRANÉE

**Myrtus communis L., 1753**

Myrte commun



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - DIXON Lara

↕ Arbre  
petite taille

-



pH Neutre



-



Nectar +

-

Godet  
Semence

-

Supporte un sol pauvre, fruits comestibles par la faune sauvage, propriétés médicinales.

## LISTE ALPES

**Ononis fruticosa L., 1753**

Bugrane ligneuse



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - BIZARD Léa

↕ Arbre  
petite taille

-



pH Neutre



-

-

-

-

Espèce supportant un sol pauvre. Fruits comestibles par la faune sauvage. Propriétés médicinales.

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Phillyrea angustifolia L., 1753**

Phillyrée à feuilles étroites



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - MORVANT Yves

↕ Arbre  
petite taille

-



pH Neutre



-

-

-



Semence

-

-

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Pistacia terebinthus L., 1753**

Pistachier térébinthe



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - UGO Julien

↕ Arbre  
petite taille

-



pH Neutre



-

-

-

Godet  
Semence

-

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Prunus mahaleb L., 1753**

Prunier mahaleb



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

↕ Arbre  
petite taille

-



pH Neutre



-

Nectar +  
Pollen +

-

Godet  
Semence

-

Fruits comestibles par la faune sauvage. Espèce tolérante à la sécheresse.



LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE



**Prunus spinosa L., 1753**

Prunier épineux



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Arbre petite taille	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		
🍽	Nectar + Pollen ++	-
🧴	Godet Semence	-

CBNA - VILLARET Jean-Charles

Fruits comestibles par l'Homme et la faune sauvage.  
Propriétés médicinales. Espèce tolérant mal la concurrence.

LISTE MÉDITERRANÉE



**Pyrus spinosa Forssk., 1775**

Poirier épineux



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Arbre petite taille	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		🧴
-		-
🧴	Godet Semence	-

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

LISTE MÉDITERRANÉE



**Quercus coccifera L., 1753**

Chêne Kermès



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Arbre petite taille	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		🧴
-		-
-		-

CBNA - PACHE Gilles

LISTE MÉDITERRANÉE



**Rhamnus alaternus L., 1753**

Nerprun alaterne



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Arbre petite taille	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		
-		-
🧴	Semence	-

CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

LISTE ALPES



**Rhamnus cathartica L., 1753**

Nerprun purgatif



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Arbre petite taille	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		🧴
-		-
🧴	Godet	-

CBNA - BILLARD Gilbert

LISTE MÉDITERRANÉE



**Rhus coriaria L., 1753**

Sumac des corroyeurs



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Arbre petite taille	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		🧴
-		-
🧴	Semence	-

CBNA - BILLARD Gilbert

Fruits comestibles par la faune sauvage.  
Espèce tolérante la sécheresse.





## LISTE ALPES

**Ribes alpinum L., 1753**

Groseillier des Alpes



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août




Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNA - GARRAUD Luc

 Arbre  
petite taille -


## LISTE ALPES

**Ribes uva-crispa L., 1753**

Groseillier épineux



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août




Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNA - DALMAS Jean-Pierre

 Arbre  
petite taille  
1.5 m -


Fruits comestibles par l'Homme. Propriétés médicinales.

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Rosmarinus officinalis L., 1753**

Romarin



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août





Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 Arbre  
petite taille -
Floraison précoce. Propriété anti-insectes (mouches).  
Propriétés médicinales.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Salix eleagnos Scop., 1772**

Saufe drapé



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août


Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNA - VILLARET Jean-Charles

 Arbre  
petite taille -


## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Sambucus racemosa L., 1753**

Sureau à grappes



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août





Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNA - BIZARD Léa

 Arbre  
petite taille -


Baies toxiques pour l'Homme.

**Viburnum lantana L., 1753**

Viorne lantane



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août




Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNA - BILLARD Gilbert

 Arbre  
petite taille -


Toxique pour l'Homme.



LISTE MÉDITERRANÉE



**Viburnum tinus L., 1753**

Viorne tin



CBNMed - NOBLE Virgile

↑↓	Arbre petite taille	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
🍽️	Nectar +	🏠 Nidification pollinisateurs
🧴	Semence	-

- Jan.
- Fév.
- Mars
- Avr.
- Mai
- Juin
- Jui.
- Août
- Sept.
- Oct.
- Nov.
- Déc.

Floraison précoce. Espèce tolérante à la sécheresse. Toxique pour l'Homme.

LISTE MÉDITERRANÉE



**Daphne gnidium L., 1753**

Daphné garou



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

↑↓	Arbrisseau	-
☀		🌡️
💧		pH Acide
🛠️		-
-		-
-		-

- Jan.
- Fév.
- Mars
- Avr.
- Mai
- Juin
- Jui.
- Août
- Sept.
- Oct.
- Nov.
- Déc.

Toxique.

LISTE MÉDITERRANÉE



**Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L., 1753**

Genévrier oxycèdre



CBNMed - MOLINA James

↑↓	Arbrisseau	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
🧴	Semence	-

- Jan.
- Fév.
- Mars
- Avr.
- Mai
- Juin
- Jui.
- Août
- Sept.
- Oct.
- Nov.
- Déc.

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE



**Hedera helix L., 1753**

Lierre grimpant



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

↑↓	Liane arborescente 30 cm	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
🍽️	Nectar ++	Pollen ++
🧴	Semence	-

- Jan.
- Fév.
- Mars
- Avr.
- Mai
- Juin
- Jui.
- Août
- Sept.
- Oct.
- Nov.
- Déc.

Floraison tardive. Espèce résistante aux parasites et aux maladies. Toxique pour l'Homme.

LISTE MÉDITERRANÉE



**Lonicera etrusca Santi, 1795**

Chèvrefeuille d'Étrurie



CBNMed - DIXON Lara

↑↓	Liane arborescente	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
🍽️	Nectar +++	-
🧴	Semence	-

- Jan.
- Fév.
- Mars
- Avr.
- Mai
- Juin
- Jui.
- Août
- Sept.
- Oct.
- Nov.
- Déc.

Espèce tolérante à la pollution et à la sécheresse. Toxique pour l'Homme.

LISTE MÉDITERRANÉE



**Lonicera implexa Aiton, 1789**

Chèvrefeuille entrelacé



CBNMed - LE BERRE Maëlle

↑↓	Liane arborescente	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
🍽️	Nectar +++	-
🧴	Semence	-

- Jan.
- Fév.
- Mars
- Avr.
- Mai
- Juin
- Jui.
- Août
- Sept.
- Oct.
- Nov.
- Déc.

Espèce tolérante à la pollution et à la sécheresse. Fruits comestibles par la faune sauvage.





LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Alliaria petiolata* (M.Bieb.)**  
Cavara & Grande, 1913 - Alliaire

		↕	Vivace		
Jan.		☀	🌡		
Fév.					
Mars					
Avr.		💧	pH	Neutre	
Mai		🛠	🧴		
Juin					
Jui.					
Août		🍽	Nectar ++		
Sept.					
Oct.					
Nov.		📦	Semence		
Déc.					

CBNA – BILLARD Gilbert

LISTE ALPES

***Aquilegia vulgaris* L., 1753**  
Ancolie commune

		↕	Vivace		
Jan.		☀	🌡		
Fév.					
Mars					
Avr.		💧	pH	Neutre	
Mai		🛠	🧴		
Juin					
Jui.					
Août					
Sept.					
Oct.					
Nov.		📦	Semence		
Déc.					

CBNA – BILLARD Gilbert

LISTE ALPES

***Avenella flexuosa* (L.) Drejer, 1838**  
Canche flexueuse

		↕	Vivace		
Jan.		☀	🌡		
Fév.					
Mars					
Avr.		💧	pH	Acide	
Mai		🛠	🧴		
Juin					
Jui.					
Août					
Sept.					
Oct.					
Nov.		📦	Semence		
Déc.					

CBNA – BILLARD Gilbert

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Barbarea vulgaris* W.T.Aiton, 1812**  
Barbarée commune

		↕	Vivace		
Jan.		☀	🌡		
Fév.					
Mars					
Avr.		💧	pH	Neutre	
Mai		🛠	🧴		
Juin					
Jui.					
Août					
Sept.					
Oct.					
Nov.		📦	Semence		
Déc.					

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Brachypodium sylvaticum* (Huds.)**  
P.Beauv., 1812 - Brachypode des forêts

		↕	Vivace	1 m	
Jan.		☀	🌡		
Fév.					
Mars					
Avr.		💧	pH	Neutre	
Mai		🛠	🧴		
Juin					
Jui.					
Août					
Sept.					
Oct.					
Nov.		📦	Semence		
Déc.					

CBNA – BILLARD Gilbert

LISTE ALPES

***Campanula rapunculoides* L., 1753**  
Campanule fausse raiponce

		↕	Vivace		
Jan.		☀	🌡		
Fév.					
Mars					
Avr.		💧	pH	Neutre	
Mai		🛠	🧴		
Juin					
Jui.					
Août					
Sept.					
Oct.					
Nov.		📦	Semence		
Déc.					

CBNA – DALMAS Jean-Pierre

Pour rappel, la liste "Plantons des arbres et des arbustes" inclut des espèces composant la strate herbacée



LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

**Campanula trachelium L., 1753**  
Campanule gantelée

		↕ Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				Neutre
Avr.				
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.			Semence	
Déc.				
CBNA - DALMAS Jean-Pierre				

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

**Clinopodium vulgare L., 1753**  
Clinopode commun

		↕ Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				Neutre
Avr.				
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.			Nectar +	
Oct.				
Nov.			Semence	
Déc.				
CBNA - DALMAS Jean-Pierre				

LISTE ALPES

**Digitalis lutea L., 1753**  
Digitale jaune

		↕ Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				Neutre
Avr.				
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				
CBNA - BILLARD Gilbert				

LISTE ALPES

**Elymus caninus (L.) L., 1755**  
Chiendent des chiens

		↕ Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				Neutre
Avr.				
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				
CBNA - GARRAUD Luc				

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

**Geum urbanum L., 1753**  
Benoîte des villes

		↕ Vivace 60 cm		
Jan.				
Fév.				
Mars				Neutre
Avr.				
Mai				
Juin				
Jui.				
Août			Nectar ++	
Sept.				
Oct.				
Nov.			Semence	
Déc.				
CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette				

LISTE ALPES

**Helleborus foetidus L., 1753**  
Ellébore fétide

		↕ Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				Neutre
Avr.				
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				
CBNA - BILLARD Gilbert				

Pour rappel, la liste "Plantons des arbres et des arbustes" inclut des espèces composant la strate herbacée





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Hippocrepis comosa* L., 1753**

Hippocrévide chevelue



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

 Vivace  
-


Neutre



Nectar +++



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Knautia arvensis* (L.) Coult., 1828**

Knautie des champs



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - VILLARET Jean-Charles

 Vivace  
-


Neutre



Nectar ++



Semence



## LISTE ALPES

***Lavandula angustifolia* Mill., 1768**

Lavande à feuilles étroites



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - UGO Julien

 Vivace  
-


Neutre



Nectar ++



Propriétés médicinales. Anti-insecte naturel (pucerons).

## LISTE ALPES

***Luzula sylvatica* subsp. *sieberi* (Tausch) K.Richt., 1890**

Luzule de Sieber



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - DALMAS Jean-Pierre

 Vivace  
-


Neutre



Nectar ++



Semence



## LISTE MÉDITERRANÉE

***Melissa officinalis* L., 1753**

Mélisse officinale



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 Vivace  
-


Neutre



Nectar ++



Pollen +



Semence



## LISTE ALPES

***Myosotis decumbens* Host, 1827**

Myosotis couché



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - SIGNORET Henri

 Vivace  
-


Neutre



Nectar ++



Pollen +



Semence



Pour rappel, la liste "Plantons des arbres et des arbustes" inclut des espèces composant la strate herbacée



LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Poa compressa* L., 1753**  
Pâturin comprimé

	Vivace -	-
		Neutre
		-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CBNA - LEGLAND Thomas

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Saponaria officinalis* L., 1753**  
Saponaire officinale

	Vivace -	-
		Neutre
		-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CBNA - BIZARD Léa

LISTE ALPES

***Scabiosa lucida* Vill., 1779**  
Scabieuse luisante

	Vivace -	-
		Neutre
		-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CBNA - DALMAS Jean-Pierre

LISTE ALPES

***Sesleria caerulea* (L.) Ard., 1763**  
Seslérie bleue

	Vivace -	-
		Neutre
		-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CBNA - PACHE Gilles

LISTE ALPES

***Silene dioica* (L.) Clairv., 1811**  
Silène dioïque

	Vivace -	-
		Neutre
		-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CBNA - BILLARD Gilbert

LISTE ALPES

***Silene nutans* L., 1753**  
Silène penché

	Vivace -	-
		Neutre
		-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

CBNA - GARRAUD Luc

Pour rappel, la liste "Plantons des arbres et des arbustes" inclut des espèces composant la strate herbacée





LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Silene vulgaris* subsp. *vulgaris***  
(Moench) Garcke, 1869 - Silène commun

		Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Neutre	
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.		Nectar +	-	
Oct.				
Nov.				
Déc.				

CBNA - DALMAS Jean-Pierre

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Solidago virgaurea* L., 1753**  
Solidage verge-d'or

		Vivace 80 cm		
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Neutre	
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.		Nectar ++	-	
Oct.				
Nov.				
Déc.				

CBNMed - PIRES Mathias

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

***Stachys recta* L., 1767**  
Épiaire droit

		Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Neutre	
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.		Nectar +++	-	
Oct.				
Nov.				
Déc.				

CBNMed - ARNOUX Jean-Claude

LISTE ALPES

***Valeriana montana* L., 1753**  
Valériane des montagnes

		Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Neutre	
Mai				
Juin			-	
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				

CBNA - DALMAS Jean-Pierre

LISTE ALPES

***Verbascum lychnitis* L., 1753**  
Molène lychnite

		Vivace -		
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Neutre	
Mai				
Juin			-	
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				

CBNA - DALMAS Jean-Pierre

LISTE ALPES

***Veronica officinalis* L., 1753**  
Véronique officinale

		Vivace 40 cm		
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Acide	
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.		Nectar ++	-	
Oct.				
Nov.				
Déc.				

CBNA - BILLARD Gilbert

Pour rappel, la liste "Plantons des arbres et des arbustes" inclut des espèces composant la strate herbacée



LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE



**Vicia cracca L., 1753**  
Vesce cracca





CBNMed - ANDRIEU Frédéric

	↕	Vivace		
Jan.	☀		🌡	
Fév.				
Mars				
Avr.	💧		pH	Neutre
Mai				
Juin	🌱		🧴	
Jui.				
Août				
Sept.	🍽	Nectar ++		
Oct.				
Nov.				
Déc.				

LISTE ALPES



**Vicia sepium L., 1753**  
Vesce des haies







CBNA - DALMAS Jean-Pierre


	↕	Vivace		
Jan.	☀		🌡	
Fév.				
Mars				
Avr.	💧		pH	Neutre
Mai				
Juin	🌱		🧴	
Jui.				
Août				
Sept.	🍽	Nectar ++		
Oct.				
Nov.				
Déc.				

LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE



**Vicia tenuifolia Roth, 1788**  
Vesce à feuilles ténues





CBNA - GARRAUD Luc

	↕	Vivace		
Jan.	☀		🌡	
Fév.				
Mars				
Avr.	💧		pH	Neutre
Mai				
Juin	🌱		🧴	
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				

LISTE ALPES



**Epilobium angustifolium L., 1753**  
Épilobe à feuilles étroites







CBNA - BILLARD Gilbert


	↕	Vivace à rhizome		
Jan.	☀		🌡	
Fév.				
Mars				
Avr.	💧		pH	Neutre
Mai				
Juin	🌱		🧴	
Jui.				
Août				
Sept.	🍽	Nectar +++ Pollen +++		
Oct.				
Nov.			🌱	Semence
Déc.				

LISTE ALPES



**Trifolium aureum Pollich, 1777**  
Trèfle doré





CBNA - VILLARET Jean-Charles

	↕	Annuelle		
Jan.	☀		🌡	
Fév.				
Mars				
Avr.	💧		pH	Neutre
Mai				
Juin	🌱		🧴	
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				

Pour rappel, la liste "Plantons des arbres et des arbustes" inclut des espèces composant la strate herbacée



## ARBRE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Abies alba</i> Mill., 1768	Sapin blanc	Alpes
<i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i> Mill., 1881	Érable à feuilles d'obier	Alpes & Méditerranée
<i>Ficus carica</i> L., 1753	Figuier commun	Méditerranée
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl., 1835	Aubour des Alpes	Alpes
<i>Olea europaea</i> L., 1753	Olivier d'Europe	Méditerranée
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	Épicéa commun	Alpes
<i>Pinus halepensis</i> Mill., 1768	Pin d'Alep	Méditerranée
<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1753	Pin maritime	Méditerranée
<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre	Alpes & Méditerranée
<i>Populus nigra</i> subsp. <i>neapolitana</i> (Ten.) Maire, 1732	Peuplier de Naples	Alpes & Méditerranée
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble	Alpes
<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc	Méditerranée
<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs	Alpes



## ARBRE DE PETITE TAILLE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Juniperus sabina</i> L., 1753	Genévrier sabine	Alpes
<i>Lonicera alpigena</i> L., 1753	Chèvrefeuille des Alpes	Alpes
<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	Nerprun des Alpes	Alpes
<i>Ribes petraeum</i> Wulfen, 1781	Groseillier des rochers	Alpes
<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	Rosier toujours vert	Méditerranée



## ARBRISSEAU

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825	Busserole raisin-d'ours	Alpes
<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> L., 1753	Genêt d'Espagne	Méditerranée
<i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu	Méditerranée
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme, 1868	Genévrier nain	Alpes
<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Airelle myrtille	Alpes





## LIANE ARBORESCENTE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon lupulin	Alpes & Méditerranée



## VIVACE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871	Adenostyle à feuilles d'alliaire	Alpes
<i>Aegonychon purpureocaeruleum</i> (L.) Holub, 1973	Fausse buglosse pourpre bleu	Méditerranée
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	Alpes & Méditerranée
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	Bétoine officinale	Alpes & Méditerranée
<i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schrad.) Host, 1809	Calamagrostide variée	Alpes
<i>Campanula medium</i> L., 1753	Campanule carillon	Alpes & Méditerranée
<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles de pêcher	Alpes
<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laïche humble	Alpes & Méditerranée
<i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i> L., 1755	Laïche paniculée	Alpes
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Clinopode népéta	Alpes & Méditerranée
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L., 1756	Coronille naine	Alpes
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Croisette commune	Alpes
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Dryoptéride fougère-mâle	Alpes
<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1779	Euphorbe faux amandier	Méditerranée
<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Murr, 1923	Euphorbe pourprée	Alpes
<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	Fétuque hétérophylle	Alpes
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire printanière	Alpes & Méditerranée
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage	Alpes & Méditerranée
<i>Galium aristatum</i> L., 1762	Gaillet aristé	Alpes & Méditerranée
<i>Geranium nodosum</i> L., 1753	Géranium noueux	Alpes
<i>Geranium sanguineum</i> L., 1834	Géranium sanguin	Alpes
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Lamier maculé	Alpes
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> Mill., 1768	Lavande à feuilles étroites	Alpes
<i>Lunaria annua</i> L., 1753	Lunaire annuelle	Alpes & Méditerranée
<i>Melica nutans</i> L., 1753	Mélique penchée	Alpes
<i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>decumbens</i> Host, 1827	Myosotis couché	Alpes

Pour rappel, la liste "Plantons des arbres et des arbustes" inclut des espèces composant la strate herbacée



NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Ononis rotundifolia</i> L., 1753	Bugrane à feuilles rondes	Alpes
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	Boucage élevé	Alpes
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois	Alpes & Méditerranée
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	Polypode intermédiaire	Méditerranée
<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	Polypode commun	Alpes
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799	Polystic lonchite	Alpes
<i>Primula veris</i> L., 1753	Primevère vraie	Alpes
<i>Primula veris</i> var. <i>columnae</i> (Ten.) B.Bock, 2012	Primevère de Colonna	Alpes
<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762	Primevère commune	Alpes
<i>Ranunculus aduncus</i> Gren., 1847	Renoncule crochue	Alpes
<i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> L., 1753	Saponaire faux basilic	Alpes & Méditerranée
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Schédonore des prés	Alpes
<i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Schédonore des prés	Alpes
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang., 1882	Solidage très petit	Alpes
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge-d'or	Alpes
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Tanaisie en corymbe	Alpes & Méditerranée
<i>Trifolium alpestre</i> L., 1763	Trèfle alpestre	Alpes
<i>Verbascum chaixii</i> Vill., 1779	Molène de Chaix	Alpes & Méditerranée
<i>Vinca major</i> L., 1753	Pervenche élevée	Méditerranée
<i>Vinca minor</i> L., 1753	Pervenche mineure	Alpes & Méditerranée



## VIVACE À RHIZOME

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Laïche tomenteuse	Alpes & Méditerranée
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh, 1783	Grande prêle	Alpes & Méditerranée
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	Gaillet odorant	Alpes
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon piquant	Méditerranée

Pour rappel, la liste "Plantons des arbres et des arbustes" inclut des espèces composant la strate herbacée









## II. MILIEUX OUVERTS : FLEURISSEONS NOS PRAIRIES



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

La liste proposée dans ce chapitre inclut des espèces d'arbrisseau, d'annuelle et de vivace.

Les arbres y compris de petite taille ont été écartés, vous les trouverez dans la liste « Plantons des arbres et arbustes » (la vignette comportera alors le pictogramme des milieux ouverts : fleurissons nos prairies).

Il existe plusieurs types de milieux ouverts :

- ▶ friches herbacées ;
- ▶ prairies de fauche ;
- ▶ prairies humides ;
- ▶ prairies tourbeuses ;
- ▶ pelouses (que l'on distingue, dans ce guide, des prairies par leur herbe rase à moins de 50 centimètres) ;
- ▶ landes sèches et landes humides ;
- ▶ garrigues et maquis, etc.

Un milieu ouvert est un milieu dégagé où les arbres sont rares et la végétation dominée par des espèces basses, herbacées ou arbustives. Il s'agit généralement d'un espace semi-naturel ou naturel dont la surface occupée par les arbres est inférieure à 25 %.

Sans intervention humaine (pastoralisme ou entretien), le milieu ouvert a tendance en France à se refermer et évoluer en forêt (climax).

Ces milieux présentent un grand intérêt pour la biodiversité en termes de cortège floristique, d'avifaune, de reptiles et d'insectes, en particulier les pollinisateurs. Ils le sont d'autant plus lorsque des micro-habitats comme des arbres et des points d'eau y sont présents.

Les aménagements en milieu ouvert peuvent être réalisés à des fins de :

- ▶ **fleurissement** : jachères fleuries, massifs de vivaces, prairies fleuries, etc;
- ▶ **végétalisation** : verdissement, couverts herbacées, gazons sauvages, bandes enherbées, etc.

Les milieux ouverts urbanisés quant à eux sont principalement constitués de pelouses, champs, friches, et de prairies plantées ou semi-naturelles.







## LES PRAIRIES FLEURIES



ARBE - PETENIAN Frédéric

Prairie de fauche en milieu montagnard

Une prairie fleurie est un terrain ouvert sur lequel poussent spontanément et en abondance diverses fleurs (graminées, vivaces, annuelles ou bisannuelles).

Les architectes, les paysagistes et les responsables des espaces verts adoptent de plus en plus les prairies fleuries pour leur beauté mais aussi pour des raisons écologiques et économiques. Elles maintiennent en effet des espèces animales et végétales en milieu urbain, stimulent la pollinisation à l'intérieur des zones urbaines, limitent l'entretien des espaces verts en représentant une alternative intéressante aux gazons tondu et homogènes et protègent également les zones sensibles malmenées par les constructions et les aménagements urbains.

Pour autant, et en dépit de leurs atouts esthétiques, floristiques et faunistiques, elles sont parfois boudées par le public qui associe nature sauvage et hauteur de la végétation à un manque d'entretien, d'où l'importance des efforts de communication préalables à leur création ou à leur développement. Cette communication est d'autant plus importante que les prairies fleuries sont très sensibles à la saisonnalité et qu'elles ne restent pas fleuries aux périodes les plus touristiques - surtout dans notre région.

Une prairie favorable aux pollinisateurs n'a pas un fleurissement spectaculaire. L'idée est bien de faire alliance avec la nature et non de la contraindre ou de s'opposer à elle. Passée la première année, où les annuelles aux couleurs vives sont prédominantes, le mélange s'adapte aux conditions spécifiques du lieu et à la gestion choisie. Des espèces s'accommodent mieux que d'autres et certaines disparaissent au fil de la saison et des années dans le respect des temporalités de la nature.



De nombreux mélanges de semences vendus dans le commerce sont composés d'une dizaine d'espèces horticoles favorisant fortement l'abeille domestique, qui n'est pourtant pas l'acteur unique de la pollinisation. Les abeilles solitaires, les papillons, les syrphes<sup>54</sup>, les coléoptères sont d'excellents pollinisateurs qu'il convient de préserver en leur offrant des sources de nourriture variée. Il est donc nécessaire de réaliser des compositions avec une diversité d'espèces végétales. Les plantes indigènes ne nécessitent pas d'apports spécifiques et aucun engrais ne doit alimenter les prairies fleuries. La fertilisation n'est pas l'alliée des plantes à fleurs !

Les professionnels sauront vous conseiller sur des compositions adaptées à vos projets.

<sup>54</sup> Type de mouche aux couleurs vives rappelant celles de l'abeille ou de la guêpe.



## LISTE MÉDITERRANÉE

**Cistus salviifolius L., 1753**

Ciste à feuilles de sauge



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 Arbrisseau  
80 cm


Acide



Pollen ++



Godet

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Coronilla juncea L., 1753**

Coronille à tige de jonc



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - ARNOUX Jean-Claude

 Arbrisseau  
2 m


Neutre

Godet  
Semence

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Globularia alypum L., 1753**

Globulaire alypum



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - UGO Julien

 Arbrisseau  
-


Neutre



Godet

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Jasminum fruticans L., 1753**

Jasmin arbustif



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

 Arbrisseau  
120 cm


Neutre



Godet

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Juniperus communis subsp. communis L., 1753**

Genévrier commun



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - MORVANT Yves

 Arbrisseau  
10 m


Neutre



Godet

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Juniperus phoenicea subsp. phoenicea L., 1753**

Genévrier de phoenicie



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - DIADEMA Katia

 Arbrisseau  
8 m


Neutre



Semence

Attention aux soucis de détermination de la sous-espèce.  
La hauteur est affichée pour des conditions optimales.

La hauteur est affichée pour des conditions optimales.





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Plantago sempervirens Crantz, 1766**

Plantain toujours vert



CBNMed - MICHAUD Henri

Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			Godet
Déc.			

↑ Arbrisseau -

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Rosa canina L., 1753**

Rosier des chiens



CBNA - VILLARET Jean-Charles

Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			Nectar ++ Pollen ++
Oct.			
Nov.			Godet Semence
Déc.			

↑ Arbrisseau 3 m -

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Satureja montana L., 1753**

Sarriette des montagnes



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			Godet
Déc.			

↑ Arbrisseau 40 cm -

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Stachelina dubia L., 1753**

Stéhéline douteuse



CBNMed - UGO Julien

Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			Godet
Déc.			

↑ Arbrisseau 40 cm -

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Ulex parviflorus Pourr., 1788**

Ajonc à petites fleurs



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			
Déc.			

↑ Arbrisseau 1 m -

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Achillea millefolium L., 1753**

Achillée millefeuille



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			Nectar ++
Oct.			
Nov.			Semence
Déc.			

↑ Vivace 70 cm -

Compiqué à produire.





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Agrimonia eupatoria* L., 1753**

Aigremoine eupatoire



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
60 cm -



pH Neutre



Pollen +++



Semence -

CBNMed - NOBLE Virgile

## LISTE ALPES

***Alchemilla alpigena* Buser, 1894**

Alchémille plissée



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
- -



pH Neutre



-

-

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Anthoxanthum odoratum* L., 1753**

Flouve odorante



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
- -



pH Neutre



-



Semence -

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES

***Anthyllis montana* L., 1753**

Anthyllide des montagnes



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
- -



pH Neutre



-

-

CBNMed - PIRES Mathias

Compliqué à produire.

## LISTE ALPES

***Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris*****(Kit.) Asch. & Graebn., 1908** - Anthyllide alpestre

Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
- -



pH Neutre



-



Semence -

CBNMed - PIRES Mathias

## LISTE MÉDITERRANÉE

***Aphyllanthes monspeliensis* L., 1753**

Aphyllanthe de Montpellier



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
- -



pH Neutre



-



Godet -

CBNMed - UGO Julien



## LISTE MÉDITERRANÉE


**Argyrobium zanonii (Turra) P.W.Bal, 1968**  
 Argyrolobe de Zanon


Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - OFFERHAUS Benoît

↑↓	Vivace	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
🧴	Godet	-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


**Artemisia campestris L., 1753**  
 Armoise champêtre


Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNPMP - BERGES Christophe

↑↓	Vivace	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
🧴	Godet	-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


**Artemisia vulgaris L., 1753**  
 Armoise commune



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - MORVANT Yves

↑↓	Vivace	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
-		-

## LISTE ALPES


**Aster alpinus L., 1753**  
 Aster des Alpes



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - ARGAGNON Olivier

↑↓	Vivace	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
🍽️	Nectar ++ Pollen ++	-
-		-

## LISTE ALPES


**Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868**  
 Avoine pubescente



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - PACHE Gilles

↑↓	Vivace	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
🧴	Semence	-

## LISTE MÉDITERRANÉE


**Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981**  
 Psoralée à odeur de bitume


Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - GILBERTAS Lauriane

↑↓	Vivace	-
☀		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
🧴	Semence	-



## LISTE ALPES

**Blitum bonus-henricus (L.) C.A Mey., 1829**

Chénopode bon Henri



CBNMed - MORVANT Yves



Vivace

-



Neutre



-



-



-

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Brachypodium phoenicoides (L.)**

Roem. &amp; Schult., 1817 - Brachypode fausse ivraie



CBNA - DALMAS Jean-Pierre



Vivace

-



Neutre



-



-



Semence

-

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv., 1812**

Brachypode tronqué



CBNMed - ARNOUX Jean-Claude



Vivace

-



Neutre



-



-



Semence

-

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Brachypodium rupestre (Host)**

Roem. &amp; Schult., 1817 - Brachypode rupestre



CBNMed - OFFERHAUS Benoît



Vivace

-



Neutre



-



-



Semence

-

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Briza media L., 1753**

Brize intermédiaire



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette



Vivace

-



Neutre



-



-



Semence

-

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869**

Brome érigé



CBNMed - LE BERRE Maëlle



Vivace

-



Neutre



-



-



Semence

-

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Campanula rotundifolia L., 1753**

Campanule à feuilles rondes



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - UGO Julien

Vivace  
-

pH Neutre

Nectar ++  
Pollen ++Semence  
-

## LISTE ALPES

**Carex caryophyllea Latourr., 1785**

Laïche caryophyllée



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - ARGAGON Olivier

Vivace  
-

pH Neutre



## LISTE ALPES

**Carum carvi L., 1753**

Cumin des prés



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNPMP - BERGES Christophe

Vivace  
-

pH Neutre

Semence  
-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Carex hirta L., 1753**

Laïche hérissée



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

Vivace  
-

pH Neutre



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Centaurea jacea L., 1753**

Centaurée jacée



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

Vivace  
-

pH Neutre

Nectar +++  
Pollen ++Semence  
-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Centaurea jacea subsp. jacea L., 1753**

Centaurée jacée



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.


Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNPMP - BERGES Christophe

Vivace  
-

pH Neutre

Nectar +++  
Pollen ++Semence  
-



## LISTE MÉDITERRANÉE

**Centranthus ruber (L.) DC., 1805**

Centranthe rouge



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 Vivace  
-


Neutre


 Nectar +  
Pollen +


Godet

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex**

Roem. &amp; Schult., 1818 - Céphalaire à fleurs blanches



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 Vivace  
-


Neutre



-



Semence

## LISTE ALPES

**Cerastium arvense subsp. strictum Gaudin, 1828**

Céraiste raide



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNA - VILLARET Jean-Charles

 Vivace  
-


Neutre



-

-

-

En altitude.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Coronilla varia L., 1753**

Coronille variée



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMC - LABROCHE Aurélien

 Vivace  
120 cm


Neutre




Nectar ++

Semence

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth)**

Nyman, 1882 - Dactyle d'Espagne



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMC - LABROCHE Aurélien

 Vivace  
-


Neutre



-

-

-

Espèce à certification obligatoire.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Daucus carota L., 1753**

Carotte sauvage



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 Vivace  
-


Neutre


 Nectar +  
Pollen ++

Semence






## LISTE ALPES

***Dianthus saxicola* Jord., 1852**

Œillet saxicole



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - ARNOUX Jean-Claude

↑↓	Vivace	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		-
-		-
🏠	Godet	🚫 04

En altitude.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Dipsacus fullonum* L., 1753**

Cardère à foulon



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - NOBLE Virgile

↑↓	Vivace	1 m	-
☀			🌡
💧			pH Neutre
🛠			-
🍽	Nectar ++		-
🏠	Semence		-

## LISTE MÉDITERRANÉE

***Dittrichia viscosa* (L.) Greuter, 1973**

Inule visqueuse



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

↑↓	Vivace	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		-
-		-
🏠	Semence	-

En altitude.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Echium vulgare* L., 1753**

Vipérine commune



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

↑↓	Vivace	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		-
🍽	Nectar +++	-
🏠	Semence	-

## LISTE MÉDITERRANÉE

***Euphorbia characias* subsp. *characias* L., 1753**

Euphorbe characias



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

↑↓	Vivace	80 cm	-
☀			🌡
💧			pH Neutre
🛠			-
-			-
-			-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Euphorbia cyparissias* L., 1753**

Euphorbe petit-cyprès



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

↑↓	Vivace	-
☀		🌡
💧		pH Neutre
🛠		-
🍽	Nectar ++	-
🏠	Semence	-





## LISTE ALPES

***Festuca laevigata* Gaudin, 1808**

Fétuque lisse



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNA - ABDULHAK Sylvain



Vivace

-



Neutre



Semence

-

## LISTE ALPES

***Festuca marginata* subsp. *marginata***

(Hack.) K.Richt., 1890 - Fétuque marginée



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMed - ARNOUX Jean-Claude



Vivace

-



Neutre



Semence

-

## LISTE ALPES

***Festuca violacea* Schleich. ex Gaudin, 1808**

Fétuque violacée



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMed - BIZARD Léa



Vivace

-



Neutre



Semence

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Galium album* Mill., 1768**

Gaillet blanc



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNPMP - CORRIOL Gilles



Vivace

-



Neutre



Semence

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Galium mollugo* L., 1753**

Gaillet commun



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNSA - MESLAGE Néhémie



Vivace

-



Neutre



Semence

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Galium verum* L., 1753**

Gaillet vrai



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

CBNMed - GILBERTAS Lauriane



Vivace

60 cm

-



Neutre



Semence

-



## LISTE ALPES

**Gentiana lutea L., 1753**

Gentiane jaune



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace	-
☀️		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
-		🚫 04 06 84

CBNMed - ARNOUX Jean-Claude

## LISTE ALPES

**Gypsophila repens L., 1753**

Gypsophile rampante



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.


↑↓	Vivace	-
☀️		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
🗑️	Godet	-

CBNMed - PIRES Mathias

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768**

Hélianthème des Apennins



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace	-
☀️		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
🗑️	Godet	-

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768**

Hélianthème nummulaire



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace 40 cm	-
☀️		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
🍽️	Pollen +++	-
🗑️	Godet	-

CBNA - VILLARET Jean-Charles

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794**

Hélichryse stoechade



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace	-
☀️		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
-		-
🗑️	Godet	🚫 04

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES

**Heracleum sphondylium L., 1753**

Berce sphondyle



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace 1 m	-
☀️		🌡️
💧		pH Neutre
🛠️		-
🍽️	Nectar ++	-
-		-

CBNA - BILLARD Gilbert





## LISTE MÉDITERRANÉE

***Holcus lanatus* L., 1753**

Houlque laineuse

			↕ Vivace -	-
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.				Neutre
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				Semence
Déc.				

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Hypericum perforatum* L., 1753**

Millepertuis perforé

			↕ Vivace 80 cm	-
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.				Neutre
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				Pollen ++
Sept.				
Oct.				
Nov.				Semence
Déc.				

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE MÉDITERRANÉE

***Hypochaeris radicata* L., 1753**

Porcelle enracinée

			↕ Vivace 70 cm	-
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.				Neutre
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				Nectar ++
Sept.				
Oct.				
Nov.				Semence
Déc.				

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

## LISTE ALPES

***Hyssopus officinalis* L., 1753**

Hysope officinale

			↕ Vivace -	-
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.				Neutre
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				Nectar ++ Pollen ++
Sept.				
Oct.				
Nov.				Godet
Déc.				

CBNMed - MICHAUD Henri

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Inula montana* L., 1753**

Inule des montagnes

			↕ Vivace -	-
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.				Neutre
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				
Déc.				

CBNMed - KREBS Elise

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Isatis tinctoria* L., 1753**

Pastel des teinturiers

			↕ Vivace -	-
Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.				Neutre
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.				
Oct.				
Nov.				Semence
Déc.				

CBNMed - ARCAGNON Olivier





## LISTE ALPES

***Jacobaea vulgaris* Gaertn., 1791**

Jacobée commune



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace 80 cm	-
		Neutre
		-
	Nectar ++	-
	Godet	-

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Koeleria vallesiana* subsp. *vallesiana*  
(Honck.) Gaudin, 1808** - Koellerie du Valais

Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace -	-
		Neutre
		-
-	-	-
-	-	-

CBNMed - UGO Julien

## LISTE ALPES

***Laserpitium gallicum* L., 1753**

Laserpitium de France



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace -	-
		Neutre
		-
-	-	-
-	-	-

CBNMed - UGO Julien

## LISTE ALPES

***Laserpitium latifolium* L., 1753**

Laserpitium à feuilles larges



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace -	-
		Neutre
		-
-	-	-
-	-	-

CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Leontodon hispidus* L., 1753**

Liondent hispide



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace -	-
		Neutre
		-
-	-	-
	Semence	-

CBNA - BIZARD Léa

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Leontodon hispidus* subsp. *hispidus* L., 1753**

Liondent hispide



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓	Vivace -	-
		Neutre
		-
-	-	-
-	-	-

CBNA - DALMAS Jean-Pierre



## LISTE ALPES


***Leucanthemum adustum* (W.D.J.Koch) Grelli, 1898**  
 Marguerite brûlée

 Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - LE BERRE Maëlle

 ↑↓ Vivace  
-


(pH) Neutre



-



-



-

## LISTE ALPES


***Leucanthemum irtutianum* DC., 1838**  
 Marguerite d'Irkutsk

 Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - UGO Julien

 ↑↓ Vivace  
80 cm


(pH) Neutre



-



Nectar ++

Semence

-

## LISTE MÉDITERRANÉE


***Linum campanulatum* L., 1753**  
 Lin campanulé

 Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - OFFERHAUS Benoît

 ↑↓ Vivace  
-


(pH) Neutre



-




-



-

Compiqué à produire.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


***Lolium perenne* L., 1753**  
 Ivraie vivace

 Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 ↑↓ Vivace  
60 cm


(pH) Neutre



-



-



-

## LISTE MÉDITERRANÉE


***Lotus dorycnium* L., 1753**  
 Lotier dorycnie

 Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - UGO Julien

 ↑↓ Vivace  
-


(pH) Neutre



-



-



-

## LISTE MÉDITERRANÉE


***Lotus hirsutus* L., 1753**  
 Lotier hirsute

 Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 ↑↓ Vivace  
50 cm


(pH) Neutre



-



-



Godet

-







## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Lotus maritimus L., 1753**

Lotier maritime



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette




## LISTE MÉDITERRANÉE

**Malva sylvestris L., 1753**

Mauve sauvage



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - ANDRIEU Frédéric



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Melica ciliata L., 1753**

Mélique ciliée



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

Compiqué à produire.




## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Melilotus albus Medik, 1787**

Mélilot blanc



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - NOBLE Virgile




## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779**

Mélilot officinal



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNPMP - BERGES Christophe



## LISTE ALPES

**Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794**

Myosotis alpestre



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques





## LISTE ALPES

**Nardus stricta L., 1753**

Nard raide



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - UGO Julien

↑↓ Vivace  
-



Acide



-

-

-

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012**

Oloptum millet



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - PIRES Mathias

↑↓ Vivace  
-



Neutre



-

-

-



Semence

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Ononis natrix L., 1753**

Bugrane gluante



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - UGO Julien

↑↓ Vivace  
-



Neutre



-

-

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Pastinaca sativa L., 1753**

Panais cultivé



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CNBC - DELAGE Alain

↑↓ Vivace  
-



Neutre



-

-

-

Nectar +++  
Pollen ++

-

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich, 1984**

Orpin blanc jaunâtre



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - NOBLE Virgile

↑↓ Vivace  
-



Neutre



-

-

-



Nectar +++

-

-



Godet

-

## LISTE ALPES

**Phyteuma orbiculare L., 1753**

Raiponce orbiculaire



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - RICARD Pierrick

↑↓ Vivace  
-



Neutre



-

-

-



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


***Pilosella officinarum* F.W.Schultz & Sch.Bip, 1862**  
 Pilloselle officinale

 Jan.  
 Fév.  
 Mars  
 Avr.  
 Mai  
 Juin  
 Jui.  
 Août  
 Sept.  
 Oct.  
 Nov.  
 Déc.



 ↑↓ Vivace  
 3 m -


CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


***Plantago lanceolata* L., 1753**  
 Plantain lancéolé

 Jan.  
 Fév.  
 Mars  
 Avr.  
 Mai  
 Juin  
 Jui.  
 Août  
 Sept.  
 Oct.  
 Nov.  
 Déc.



 ↑↓ Vivace  
 60 cm -


CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


***Plantago major* L., 1753**  
 Plantain élevé

 Jan.  
 Fév.  
 Mars  
 Avr.  
 Mai  
 Juin  
 Jui.  
 Août  
 Sept.  
 Oct.  
 Nov.  
 Déc.


 ↑↓ Vivace  
 -


CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


***Plantago media* L., 1753**  
 Plantain moyen

 Jan.  
 Fév.  
 Mars  
 Avr.  
 Mai  
 Juin  
 Jui.  
 Août  
 Sept.  
 Oct.  
 Nov.  
 Déc.

 ↑↓ Vivace  
 -


CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES


***Poa alpina* L., 1753**  
 Pâturin des Alpes

 Jan.  
 Fév.  
 Mars  
 Avr.  
 Mai  
 Juin  
 Jui.  
 Août  
 Sept.  
 Oct.  
 Nov.  
 Déc.


 ↑↓ Vivace  
 -


CBNMed - DIADEMA Katia

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


***Potentilla verna* L., 1753**  
 Potentille printanière

 Jan.  
 Fév.  
 Mars  
 Avr.  
 Mai  
 Juin  
 Jui.  
 Août  
 Sept.  
 Oct.  
 Nov.  
 Déc.

 ↑↓ Vivace  
 -


CBNMed - ANDRIEU Frédéric





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Poterium sanguisorba L., 1753**

Potérium sanguisorbe



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
-



Neutre



-




-

CBNA - BILLARD Gilbert

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Prunella vulgaris L., 1753**

Brunelle commune



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
45 cm



Neutre



-



Nectar ++



-

CBNMed - RIQUIER Thévenin

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Ranunculus acris L., 1753**

Renoncule âcre



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
60 cm



Neutre



-

Nectar ++  
Pollen +++

-

CBNA - VILLARET Jean-Charles

## LISTE ALPES

**Rumex acetosella L., 1753**

Patience petite-oseille



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
50 cm



Acide



-



-



-

CBNMed - UGO Julien

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Salvia pratensis L., 1753**

Sauge des prés



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
80 cm



Neutre



-



Nectar ++



-

CBNMC - LABROCHE Aurélien

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Scabiosa atropurpurea L., 1753**

Scabieuse pourpre noir



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
-



Neutre



-



-



-

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette





## LISTE ALPES

**Scabiosa columbaria L., 1753**

Scabieuse colombarie



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - ARGAGNON Olivier



Vivace

-



Neutre



-

-

-

-

-

-

-

## LISTE ALPES

**Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794**

Liondent d'automne



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNBrest - GESLIN Julien



Vivace

-



Neutre



-

-

-

-

-

-

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Sedum acre L., 1753**

Orpin âcre



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - MORVANT Yves



Vivace

8 cm

-



Neutre



-



Nectar ++

-



Godet

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Sedum album L., 1753**

Orpin blanc



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette



Vivace

30 cm

-



Neutre



-



Nectar ++

-



Godet

-

## LISTE ALPES

**Sempervivum tectorum L., 1753**

Joubarbe des toits



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - ANDRIEU Frédéric



Vivace

-



Neutre



-

-

-



Godet

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Silene italica subsp. italica (L.) Pers., 1805**

Silène d'Italie



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.


Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - JEAN-PAUL Roger



Vivace

-



Neutre



-

-

-

-

-



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Silene latifolia Poir., 1789**

Silène à feuilles larges



	↑↓ Vivace 1 m	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	Nectar ++	-
Oct.		
Nov.		
Déc.		

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869**

Silène commun



	↑↓ Vivace 20 cm	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	Nectar ++	-
Oct.		
Nov.		
Déc.		

CBNMed - GILBERTAS Lauriane

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Teucrium chamaedrys L., 1753**

Germandrée petit-chêne



	↑↓ Vivace -	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	Nectar ++	-
Oct.		
Nov.		-
Déc.		

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Teucrium polium L., 1753**

Germandrée polium



	↑↓ Vivace -	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		Acide
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.		
Oct.		
Nov.		-
Déc.		

CBNMed - ARNOUX Jean-Claude

## LISTE ALPES

**Thymus pulegioides L., 1753**

Thym faux pouliot



	↑↓ Vivace -	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.		
Oct.		
Nov.		-
Déc.		

CBNMed - MORVANT Yves

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Thymus vulgaris L., 1753**

Thym commun




	↑↓ Vivace -	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	Nectar +++	-
Oct.		
Nov.		-
Déc.		








CBNMC - LABROCHE Aurélien



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.)**  
Čelak., 1871 - Salsifis d'Orient










Jan.		↑↓ Vivace 80 cm	-
Fév.			
Mars			
Avr.			 Neutre
Mai			
Juin			-
Jui.			
Août			
Sept.		 Nectar ++	-
Oct.			
Nov.			
Déc.			

CBNMed - ARNOUX Jean-Claude

## LISTE ALPES

**Trifolium medium L., 1759**  
Trèfle moyen










Jan.		↑↓ Vivace	-
Fév.			
Mars			
Avr.			 Neutre
Mai			
Juin			-
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			
Déc.			

CBNA - PACHE Gilles

## LISTE ALPES

**Trifolium montanum L., 1753**  
Trèfle des montagnes











Jan.		↑↓ Vivace	-
Fév.			
Mars			
Avr.			 Neutre
Mai			
Juin			-
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			
Déc.			

CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812**  
Trisetè jaunissant










Jan.		↑↓ Vivace 1 m	-
Fév.			
Mars			
Avr.			 Acide
Mai			
Juin			-
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			
Déc.		 Semence	-

CBNPMP - BERGES Christophe

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Trisetum flavescens subsp. flavescens (L.)**  
P.Beauv., 1812 - Trisetè jaunissant











Jan.		↑↓ Vivace	-
Fév.			
Mars			
Avr.			 Neutre
Mai			
Juin			-
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			
Déc.			

CBNA - DALMAS Jean-Pierre

## LISTE ALPES

**Valeriana officinalis L., 1753**  
Valériane officinale



Jan.		↑↓ Vivace	-
Fév.			
Mars			
Avr.			 Neutre
Mai			
Juin			-
Jui.			
Août			
Sept.		 Nectar ++ Pollen +++	-
Oct.			
Nov.			
Déc.			

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Verbascum thapsus L., 1753**

Molène bouillon-blanc



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
2 m -



Neutre



Pollen +++

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Verbena officinalis L., 1753**

Verveine officinale



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
80 cm -



Neutre



Nectar ++

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES

**Ziziphora granatensis (Boiss. & Reut.)**

Melnikov, 2016 - Ziziphora de Grenade



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
-



Neutre



Godet

CBNA - ABDULHAK Sylvain

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Aristolochia pistlochial L., 1763**

Aristolochie pistloche



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
à rhizome -



Neutre

Plante hôte  
d'un papillon  
protégéGodet  
Semence

Messicoles.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Lathyrus pratensis L., 1753**

Gesse des prés



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
à rhizome  
80 cm -



Neutre



Nectar ++

CBNA - VILLARET Jean-Charles

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Cistus monspeliensis L., 1753**

Ciste de Montpellier



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↑↓ Vivace  
herbacée  
10 cm -



Acide



Pollen ++

CBNA - GARRAUD Luc



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Ranunculus bulbosus L., 1753**

Renoncule bulbeuse



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - GILBERTAS Lauriane

↕ Vivace  
à tubercule  
60 cm



Neutre

Nectar ++  
Pollen +++

-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Agrostemma githago L., 1753**

Nielle des blés



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - ARNOUX Jean-Claude

↕ Annuelle



Neutre



-



-

Espèce messicole

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora Arcang., 1882**

Anthyllide à fleurs rouges



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - MOLINA James

↕ Annuelle



Neutre



-



Semence

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Bifora radians M.Bieb., 1819**

Bifore rayonnante



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - BONNET Véronique

↕ Annuelle



Acide



-



Semence

Espèce messicole.

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Borago officinalis L., 1753**

Bourrache officinale



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - DIXON Lara

↕ Annuelle



Neutre



Pollen +



Semence

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Calendula arvensis L., 1763**

Souci des champs



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - SIGNORET Henri

↕ Annuelle



Neutre



-



Semence



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik, 1792**

Capselle bourse-à-pasteur



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

↕ Annuelle -



pH Neutre



-



-



Semence -

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Chelidonium majus* L., 1753**

Grande chélidoine



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

↕ Annuelle -



pH Neutre



-



Pollen +++

-

Espèce messicole.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Cichorium intybus* L., 1753**

Chicorée sauvage



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

↕ Annuelle  
1 m -



pH Neutre



-

Nectar +  
Pollen +

Semence -

## LISTE MÉDITERRANÉE

***Cota tinctoria* (L.) J.Gay ex Guss., 1844**

Anthémide des teinturiers



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

↕ Annuelle -



pH Neutre



-



-

Messicoles.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Cyanus segetum* Hill, 1762**

Bleuet des moissons



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - PIRES Mathias

↕ Annuelle -



pH Neutre



-

Nectar +++  
Pollen ++

Semence -

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Delphinium consolida* L., 1753**

Dauphinelle consoude



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - DIXON Lara

↕ Annuelle -



pH Neutre



-



-

Espèce messicole.





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Euphorbia helioscopia* L., 1753**

Euphorbe réveil matin



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - OFFERHAUS Benoît

↕ Annuelle -



💧 pH Neutre



- -

- -

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Gypsophila vaccaria* (L.) Sm., 1809**

Vaccaire d'Espagne



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - VILLARET Jean-Charles

↕ Annuelle -



💧 pH Neutre



- -

- -

Espèce messicole.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Iberis pinnata* L., 1755**

Ibéride pennée




Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - UGO Julien

↕ Annuelle -



💧 pH Neutre



- -

- -

Espèce messicole.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Legosia speculum-veneris* subsp. *speculum-veneris* (L.) Chaix, 1785** - Légousie miroir-de-Vénus

Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - UGO Julien

↕ Annuelle -



💧 pH Neutre



- -

🌱 Semence -

Espèce messicole.

## LISTE MÉDITERRANÉE

***Linum usitatissimum* subsp. *angustifolium***

(Huds.) Thell., 1912 - Lin à feuilles étroites



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - GILBERTAS Lauriane

↕ Annuelle -



💧 pH Neutre



🍽️ Nectar +++  
Pollen ++

- -

## LISTE MÉDITERRANÉE

***Lolium rigidum* Gaudin, 1811**

Ivraie rigide



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNSA - HENRY Emilien

↕ Annuelle -



💧 pH Neutre



- -

🌱 Semence -



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Medicago minima (L.) L., 1754**

Luzerne naine



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↕ Annuelle  
40 cm -



Neutre



Nectar ++

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764**

Myosotis des champs



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↕ Annuelle  
50 cm -



Neutre



Nectar ++

CBNMed - MICHAUD Henri

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Nigella damascena L., 1753**

Nigelle de Damas



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↕ Annuelle  
-



Neutre



Nectar +

CBNMed - DIXON Lara

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814**

Orlaya à grandes fleurs



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↕ Annuelle  
-



Neutre



-

CBNMed - AMBLARD Pascal

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Papaver rhoeas L., 1753**

Coquelicot



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↕ Annuelle  
60 cm -



Neutre



Pollen ++

CBNMed - DIXON Lara

Espèce messicole.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964**

Pétrorhagie prolifère



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

↕ Annuelle  
40 cm -



Neutre




Nectar ++



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

 **Poa annua L., 1753**  
Pâturin annuel



	↑↓ Annuelle -	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		 Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	-	-
Oct.		
Nov.		
Déc.		

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


 **Reseda lutea (L.), 1753**  
Réséda jaune










	↑↓ Annuelle 60 cm	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		 Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	 Nectar + Pollen ++	-
Oct.		
Nov.		
Déc.		

CBNMed - NOBLE Virgile

## LISTE MÉDITERRANÉE


 **Trifolium angustifolium L., 1753**  
Trèfle à feuilles étroites










	↑↓ Annuelle -	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		 Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	-	-
Oct.		
Nov.	 Semence	-
Déc.		

CBNMed - DIXON Lara

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


 **Trifolium arvense L., 1753**  
Trèfle des champs










	↑↓ Annuelle 40 cm	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		 Acide
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	 Nectar ++	-
Oct.		
Nov.		
Déc.		

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE


 **Trifolium campestre Schreb., 1804**  
Trèfle champêtre










	↑↓ Annuelle 50 cm	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		 Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août	 Nectar +++	-
Sept.		
Oct.		
Nov.		
Déc.		

CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

## LISTE MÉDITERRANÉE

 **Trifolium stellatum L., 1753**  
Trèfle étoilé



	↑↓ Annuelle -	-
Jan.		
Fév.		
Mars		
Avr.		 Neutre
Mai		
Juin		-
Jui.		
Août		
Sept.	-	-
Oct.		
Nov.	 Semence	-
Déc.		

CBNMed - DIXON Lara





## LISTE ALPES

***Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch.Bip., 1844**

Tripleurosperme inodore



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - ANDRIEU Frédéric

↕ Annuelle  
40 cm



Neutre



Nectar ++



-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Veronica hederifolia* L., 1753**

Véronique à feuilles de lierre



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - NOBLE Virgile

↕ Annuelle  
-



Neutre



Pollen +



-

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Xeranthemum inapertum* (L.) Mill., 1768**

Xéranthème fermé



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.

CBNMed - DIADEMA Katia

↕ Annuelle  
-



Neutre



-



-



Godet



-



## ARBRISSEAU

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825	Busserole raisin-d'ours	Alpes
<i>Euphorbia dendroides</i> L., 1753	Euphorbe arborescente	Méditerranée
<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> L., 1753	Genêt d'Espagne	Méditerranée
<i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu	Méditerranée
<i>Juniperus sabina</i> L., 1753	Genévrier sabine	Alpes
<i>Juniperis communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook) Syme., 1868	Genévrier nain	Alpes
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824	Myricaire d'Allemagne	Alpes
<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Airelle myrtille	Alpes



## VIVACE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Achillea collina</i> (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883	Achillée des collines	Alpes
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Alpes & Méditerranée
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	Alpes & Méditerranée
<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Anthriscus sylvestre	Alpes & Méditerranée
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	Armérie des sables	Alpes
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé	Alpes & Méditerranée
<i>Artemisia absinthium</i> L., 1753	Armoise absinthe	Alpes
<i>Artemisia alba</i> Turra, 1764	Armoise blanche	Alpes
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> L., 1753	Armoise champêtre	Alpes
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>glutinosa</i> (J.Gay ex Besser) Batt., 1889	Armoise glutineuse	Méditerranée
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette vivace	Méditerranée
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	Bétoine officinale	Alpes & Méditerranée
<i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832	Biscutella lime	Méditerranée
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	Bothriochloa pied-de-poule	Méditerranée
<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	Alpes & Méditerranée
<i>Campanula medium</i> L., 1753	Campanule carillon	Alpes & Méditerranée
<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce	Alpes & Méditerranée
<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	Laïche de Haller	Alpes & Méditerranée
<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laïche humble	Alpes & Méditerranée
<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Laïche tomenteuse	Alpes & Méditerranée

Pour rappel, la liste "Fleurissons nos prairies" comporte également des espèces de type végétatif "abrisseau"



## VIVACE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	Catananche bleue	Alpes & Méditerranée
<i>Centaurea aspera</i> L., 1753	Centaurée rude	Méditerranée
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Petite-centaurée commune	Méditerranée
<i>Cerintho minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Rouy, 1927	Mélinet auriculé	Alpes
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	Cervaire de Rivinus	Alpes & Méditerranée
<i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762	Cerfeuil doré	Alpes
<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	Cerfeuil enivrant	Alpes
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Clinopode népéta	Alpes & Méditerranée
<i>Coris monspeliensis</i> L., 1753	Coris de Montpellier	Méditerranée
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L., 1756	Coronille naine	Alpes
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Croisette commune	Alpes
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Chiendent dactyle	Méditerranée
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768	Cynoglosse de Crète	Méditerranée
<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Cynoglosse officinale	Alpes
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	Alpes & Méditerranée
<i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse	Alpes
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817	Canche moyenne	Méditerranée
<i>Dianthus godronianus</i> Jord., 1855	Œillet de Godron	Méditerranée
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Dryoptéride fougère-mâle	Alpes
<i>Echinops ritro</i> L., 1753	Échinops ritro	Alpes & Méditerranée
<i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>dodonaei</i> Vill., 1779	Épilobe romarin	Alpes
<i>Euphorbia nicaeensis</i> All., 1785	Euphorbe de Nice	Méditerranée
<i>Euphorbia seguieriana</i> subsp. <i>seguieriana</i> Neck., 1770	Euphorbe de Séguier	Méditerranée
<i>Festuca cinerea</i> Vill., 1786	Fétuque cendrée	Alpes
<i>Festuca inops</i> De Not., 1844	Fétuque très grêle	Méditerranée
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire printanière	Alpes & Méditerranée
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	Fenouil commun	Méditerranée
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill., 1768	Fenouil commun	Méditerranée
<i>Galatella sedifolia</i> subsp. <i>sedifolia</i> (L.) Greuter, 2003	Aster à feuilles d'orpin	Méditerranée
<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	Géranium sanguin	Alpes
<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	Globulaire ponctuée	Alpes & Méditerranée
<i>Globularia cordifolia</i> L., 1753	Globulaire à feuilles en cœur	Alpes
<i>Helianthemum oelandicum</i> var. <i>italicum</i> (L.) DC., 1813	Hélianthème d'Italie	Alpes & Méditerranée





## VIVACE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg., 1938	Hélicotrichon toujours vert	Alpes
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes	Méditerranée
<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Jacobée à feuilles de roquette	Alpes & Méditerranée
<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsler & Meijden, 2005	Jacobée maritime	Méditerranée
<i>Knautia collina</i> Heynh., 1840	Knautie des collines	Alpes & Méditerranée
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Lamier maculé	Alpes
<i>Laserpitium siler</i> L., 1753	Laserpitium siler	Alpes
<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	Gesse à feuilles larges	Alpes & Méditerranée
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> Mill., 1768	Lavande à feuilles étroites	Alpes
<i>Lavandula stoechas</i> L., 1753	Lavande stoechade	Méditerranée
<i>Leucanthemum pallens</i> (J.Gay ex Perreyem.) DC., 1838	Marguerite pâle	Méditerranée
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Linaire rampante	Alpes & Méditerranée
<i>Linum narbonense</i> L., 1753	Lin de Narbonne	Méditerranée
<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	Lin à feuilles ténues	Alpes
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i> (DC.) Rothm., 1963	Lotier des Alpes	Alpes
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé	Alpes & Méditerranée
<i>Lotus cytisoides</i> L., 1753	Lotier faux cytise	Méditerranée
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule champêtre	Alpes
<i>Malva alcea</i> L., 1753	Mauve alcée	Alpes
<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	Marrube commun	Alpes & Méditerranée
<i>Melica amethystina</i> Pourr., 1788	Mélique améthyste	Méditerranée
<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée	Alpes & Méditerranée
<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>magnolii</i> (Godr. & Gren.) K.Richt., 1890	Mélique de Magnol	Méditerranée
<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe odorante	Méditerranée
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb., 1842	Minuartie rostrée	Alpes
<i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>decumbens</i> Host, 1827	Myosotis couché	Alpes
<i>Nepeta nepetella</i> L., 1759	Népéta petite népéta	Alpes
<i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC., 1805	Sainfoin couché	Méditerranée
<i>Ononis rotundifolia</i> L., 1753	Bugrane à feuilles rondes	Alpes
<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753	Origan commun	Alpes & Méditerranée
<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter, 1997	Pallénide maritime	Méditerranée
<i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> (L.) Link, 1829	Pétrorhagie saxifrage	Alpes & Méditerranée
<i>Petrosedum ochroleucum</i> (Chaix) Niederle, 2014	Orpin à pétales droits	Méditerranée



## VIVACE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Phleum nodosum</i> L., 1759	Fléole noueuse	Alpes & Méditerranée
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	Boucage élevé	Alpes
<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753	Boucage saxifrage	Alpes
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	Plantain élevé	Alpes
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois	Alpes & Méditerranée
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés	Alpes & Méditerranée
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun	Alpes & Méditerranée
<i>Potentilla recta</i> L., 1753	Potentille droite	Alpes & Méditerranée
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante	Alpes & Méditerranée
<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762	Primevère commune	Alpes
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler, 1775	Brunelle à grandes fleurs	Alpes
<i>Prunella hyssopifolia</i> L., 1753	Brunelle à feuilles d'hysope	Méditerranée
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée	Alpes & Méditerranée
<i>Ranunculus aduncus</i> Gren., 1847	Renoncule crochue	Alpes
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon piquant	Méditerranée
<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	Sauge verveine	Méditerranée
<i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> L., 1753	Saponaire faux basilic	Alpes & Méditerranée
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L., 1753	Saxifrage à feuilles opposées	Alpes
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Schédonore des prés	Alpes
<i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Schédonore des prés	Alpes
<i>Stipa offneri</i> Breistr., 1950	Stipe d'Offner	Méditerranée
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Tanaisie en corymbe	Alpes & Méditerranée
<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>flavum</i> L., 1753	Germandrée jaune	Méditerranée
<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Germandrée des montagnes	Alpes & Méditerranée
<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> L., 1753	Germandrée polium	Méditerranée
<i>Tragopogon crocifolius</i> L., 1759	Salsifis à feuilles de crocus	Alpes
<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	Salsifis douteux	Alpes & Méditerranée
<i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753	Salsifis à feuilles de poireau	Méditerranée
<i>Trifolium alpestre</i> L., 1763	Trèfle alpestre	Alpes
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle porte-fraise	Méditerranée
<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753	Trèfle hybride	Alpes
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	Alpes & Méditerranée
<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	Trèfle des prés	Alpes & Méditerranée



## VIVACE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant	Méditerranée
<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	Urosperme de Daléchamps	Méditerranée
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne	Alpes
<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	Véronique d'Orsini	Méditerranée



## VIVACE À BULBE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Loncomelos narbonense</i> (L.) Raf., 1840	Ornithogale de Narbonne	Méditerranée
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari chevelu	Alpes & Méditerranée



## VIVACE À CORNE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768	Glaïeul d'Italie	Méditerranée



## VIVACE À RHIZOME

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	Prêle très rameuse	Alpes & Méditerranée
<i>Euphorbia serrata</i> L., 1753	Euphorbe dentée	Méditerranée
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Ptéridie aigle	Méditerranée
<i>Valeriana tuberosa</i> L., 1753	Valériane tubéreuse	Alpes & Méditerranée





## ANNUELLE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Alcea rosea</i> L., 1753	Rose trémière	Méditerranée
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	Alysson faux alysson	Alpes & Méditerranée
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812	Brachypode à deux épis	Alpes & Méditerranée
<i>Briza maxima</i> L., 1753	Brize élevée	Alpes & Méditerranée
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	Alpes
<i>Bromus squarrosus</i> L., 1753	Brome squarreux	Alpes & Méditerranée
<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	Carthame laineux	Méditerranée
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Catapode rigide	Méditerranée
<i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753	Caucalide à fruits larges	Alpes & Méditerranée
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr., 1811	Centranthe chausse-trappe	Méditerranée
<i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753	Crucianelle à feuilles étroites	Méditerranée
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner, 1912	Gentianelle des champs	Alpes
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge sauvage	Alpes & Méditerranée
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang., 1882	Orge des lièvres	Méditerranée
<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes	Méditerranée
<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	Lamier amplexicaule	Alpes & Méditerranée
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre	Alpes & Méditerranée
<i>Linum strictum</i> L., 1753	Lin raide	Méditerranée
<i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> Gaudin, 1811	Ivraie rigide	Méditerranée
<i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753	Lupin à feuilles étroites	Méditerranée
<i>Malva setigera</i> Spenn., 1829	Mauve hérissée	Alpes & Méditerranée
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline	Alpes & Méditerranée
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	Renoncule des champs	Alpes & Méditerranée
<i>Reseda phyteuma</i> L., 1753	Réséda raiponce	Alpes & Méditerranée
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971	Rostraire à crête	Méditerranée
<i>Silene gallica</i> L., 1753	Silène de France	Méditerranée
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle élevé	Méditerranée
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilide des champs	Alpes & Méditerranée
<i>Trifolium cherleri</i> L., 1755	Trèfle de Cherler	Méditerranée
<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle souterrain	Méditerranée
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Tubénaire tachetée	Méditerranée
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	Urosperme fausse picride	Méditerranée









### III. MILIEUX HUMIDES : PLANTONS LES PIEDS DANS L'EAU



CBNMed - VINCENT-CARREFOUR Jacques

La liste proposée dans ce chapitre correspond aux espèces utilisables - végétaux ligneux, arbustes et herbacées - dans les habitats suivants :

- ▶ prairies humides ;
- ▶ ripisylves ;
- ▶ bord d'étang ou de petits cours d'eau ;
- ▶ bassins, mares permanentes ou temporaires ;
- ▶ fossés, noues ;
- ▶ roselières ;
- ▶ marais, marécages ;
- ▶ tourbières, etc.

Les milieux humides sont des zones de transition à l'interface des milieux terrestres et aquatiques, caractérisées par la présence d'eau, en surface ou dans le sol. Ce sont des espaces naturels présentant les caractéristiques suivantes :

- ▶ présence d'eau au moins une partie de l'année ;
- ▶ présence de sols hydromorphes (sols saturés en eau) ;
- ▶ présence d'une végétation hygrophile<sup>55</sup>, adaptée à la submersion ou aux sols saturés d'eau.

Il s'y développe une faune et une flore spécifiques, adaptées aux conditions particulières de ces milieux, qui participent à la formation d'écosystèmes variés d'une grande richesse écologique.

La contribution des zones humides aux grands équilibres écosystémiques est primordiale, autant que leur rôle dans l'adaptation au changement climatique et dans son atténuation. Elles participent ainsi à :

- ▶ la gestion de la ressource en eau : régulation des débits des cours d'eau, reconstitution des nappes d'eaux souterraines grâce à l'infiltration, épuration de l'eau par un sol vivant et par phytoremédiation suivant le choix des espèces végétales ;
- ▶ la stabilisation et la protection contre l'érosion des rives et berges grâce au système racinaire et à la dissipation de la force du courant ;
- ▶ l'atténuation des événements climatiques extrêmes : protection contre les vents, contrôle des inondations par modération des effets des crues, réduction du phénomène de ruissellement, diminution du rayonnement solaire limitant la hausse de la température de l'eau et l'eutrophisation ;
- ▶ la filtration de certains polluants, la décomposition et la séquestration du carbone ;
- ▶ l'amélioration du pouvoir d'autoépuration d'une rivière ;
- ▶ la disponibilité en ressources nourricières, en zones de refuge, en lieux de reproduction pour de nombreuses espèces aquatiques et terrestres. La ripisylve est aussi un corridor appelé «trame turquoise» pour la biodiversité quand sa continuité est préservée ainsi qu'un repère pour certains migrants.

---

<sup>55</sup> Plante qui préfère ou exige des milieux humides pour se développer.





## LES MARES PERMANENTES



CBNMed – MICHAUD Henri

Début de végétalisation autour de la mare du plan de la Garde située sur les communes du Pradet et de la Garde.

À l'inverse des mares temporaires et qui passent par des cycles de remplissage/assèchement dictés par la pluviométrie et les saisons, les mares permanentes sont des étendues d'eau à renouvellement généralement limité et de taille variable. De formation naturelle ou anthropique, la mare permanente se trouve dans des dépressions imperméables, en contextes rural, périurbain, voire urbain. Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle peut être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent ; elle exerce alors un rôle tampon sur le ruissellement<sup>56</sup>. Les mares, en particulier lorsqu'elles sont organisées en réseau, assurent des fonctions essentielles de régulation naturelle des milieux. Parmi elles, l'amélioration de la qualité de l'eau (décantation, filtration, épuration) et la gestion quantitative de l'eau (stockage des eaux de ruissellement, lutte contre l'érosion des sols, régulation des débits des cours d'eau, etc.).

Elles assurent également des fonctions sociales et paysagères. Les plantes aquatiques jouent un rôle clé dans l'installation et l'essor de la vie au fond de la mare. À la fois refuge, lieu de reproduction, source de nourriture et d'oxygène, elles sont indispensables à de nombreuses espèces d'amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons et salamandres) et d'insectes, comme les odonates (libellules et demoiselles) ou certains coléoptères aquatiques. Ainsi, plus de 60 larves de libellules ont déjà été dénombrées dans une mare de 2 m<sup>2</sup> située dans un milieu très urbanisé.

Il est d'ailleurs bon de dissiper une idée reçue sur les moustiques, qui ne prolifèrent que rarement aux abords d'une mare tant ses autres habitants en sont friands (notamment les libellules, les oiseaux ou d'autres prédateurs), exerçant alors leur régulation naturelle<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> <http://zones-humides.org>

<sup>57</sup> Note sur les moustiques - [https://www.pram-grandest.fr/medias/fichiers/mares\\_et\\_moustiques.pdf](https://www.pram-grandest.fr/medias/fichiers/mares_et_moustiques.pdf)





## LES RIPISYLVES



PNR du Luberon

La ripisylve du Largue dans le Luberon



ARBE - ROEHLLY Corinne

Plantation en bord de cours d'eau sur le bassin versant des Sorgues utilisant du matériel dégradable

La ripisylve<sup>58</sup> est la bande boisée et la végétation qui l'accompagne, plus ou moins large, qui se trouvent en bordure d'un cours d'eau.

Quand elle est en bon état et suffisamment développée, elle assure de nombreuses fonctions essentielles au bon fonctionnement et à la qualité du cours d'eau. Une phase de plantation peut s'avérer utile quand la régénération naturelle ne se réalise pas.

En région méditerranéenne, les crues torrentielles rencontrées sur certains cours d'eau découpent la végétation du lit. La régénération naturelle s'opère alors par une colonisation spontanée des berges durant laquelle les espèces vont s'échelonner au regard de l'ensoleillement. D'abord très présentes, les espèces pionnières laissent ensuite la place à d'autres végétaux de la strate arbustive puis arborée. Une succession d'espèces s'exprime alors en fonction de la maturité de la ripisylve.

Or, sur les cours d'eau subissant des crues trop fortes ou trop fréquentes, cette succession d'espèces n'a pas le temps de se mettre en place et la ripisylve atteint rarement cette maturité.

D'autre part, les assecs<sup>59</sup> d'été, qui commencent de plus en plus tôt et durent de plus en plus longtemps, limitent le développement des végétaux.

Dans cette partie, vous trouverez des listes d'espèces adaptées<sup>60</sup> pour une phase de transition avant une régénération naturelle.

<sup>58</sup> Quezel, P., & Medail, F. (2003). Valeur phytoécologique et biologique des ripisylves méditerranéennes. *Forêt méditerranéenne*, 24(3), 231-248. Valeur phytoécologique et biologique des ripisylves méditerranéennes. - Notre bibliothèque - Forêt Méditerranéenne (foret-mediterraneenne.org).

<sup>59</sup> L'assec est l'état d'une rivière ou d'un étang qui se retrouve sans eau.

<sup>60</sup> À venir : un guide sur la gestion de la ripisylve, ciblé sur les cours d'eau méditerranéens, à destination des techniciens de rivières, est en cours de réalisation. Ce dernier sera finalisé dans le courant de l'année 2023. Pour en savoir plus : c.roehly@arbe-regionsud.org



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., 1790**

Aulne glutineux





Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.




CBNMed - OFFERHAUS Benoît


↑↓ Arbre  
15 à 28 cm



Neutre

Oiseaux  
Abeilles

-

Godet  
Motte  
Arrachis

-

Espèce aux racines fortes et à la pousse rapide. Fournit de l'azote par nodosités.

## LISTE ALPES

***Alnus incana* (L.) Moench, 1794**

Aulne blanchâtre





Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.




CBNA - VILLARET Jean-Charles


↑↓ Arbre  
12 m



Neutre

Oiseaux  
Abeilles

-

Godet  
Motte  
Arrachis

-

Maintien de berges.  
Espèce aux racines fortes et à la pousse rapide.

## LISTE MÉDITERRANÉE

***Fraxinus angustifolia* Vahl, 1804**

Frêne à feuilles étroites





Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.





CBNMed - ANDRIEU Frédéric


↑↓ Arbre  
20 à 30 m



Neutre



Pollinisateurs

Abri  
refugeGodet  
Motte  
Arrachis

-

Maintien de berges.  
Espèce aux racines fortes et à la pousse rapide.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Salix alba* L., 1753**

Saulé blanc





Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.





CBNA - GARRAUD Luc

↑↓ Arbre  
15 m



Neutre



Nectar ++

Abri  
refuge  
(Oiseaux  
Insectes)Godet  
Plançons  
Boutures  
Pieux

-

Maintien de berges.  
Espèce très colonisatrice en conditions idéales (semis naturel sur terrain humide peu végétalisé).


## LISTE ALPES

***Salix daphnoides* Vill., 1779**

Saulé faux daphné





Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.





CBNA - BILLARD Gilbert


↑↓ Arbre  
10 m



Neutre

Nectar  
Pollen

-



Branches

-

Maintien de berges.  
Espèce très colonisatrice en conditions idéales (semis naturel sur terrain humide peu végétalisé).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

***Salix cinerea* L., 1753**

Saulé cendré





Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.






CBNA - VILLARET Jean-Charles

↑↓ Arbre  
petite taille  
5 m



Neutre

Nectar  
PollenAbri  
refuge  
(Oiseaux  
Insectes)Branches  
Boutures  
Godets

-

Maintien de berges. Réhabilitation de milieu.  
Espèce très colonisatrice en conditions idéales (semis naturel sur terrain humide peu végétalisé).





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Salix eleagnos Scop., 1772**

Saufe drapé



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - VILLARET Jean-Charles

Arbre petite taille 6 m



Neutre

Nectar ++  
Pollen ++Abri refuge  
(Oiseaux)Godets  
Branches  
Boutures

Maintien de berges.  
Espèce très colonisatrice en conditions idéales (semis naturel sur terrain humide peu végétalisé).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Salix purpurea L., 1753**

Saufe pourpre



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - DALMAS Jean-Pierre

Arbre petite taille 6 m



Neutre

Nectar ++  
Pollen ++Abri refuge  
(Oiseaux)Godets  
Branches  
Boutures

Maintien de berges.  
Espèce très colonisatrice en conditions idéales (semis naturel sur terrain humide peu végétalisé).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Salix triandra L., 1753**

Saufe à trois étamines



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

Arbre petite taille 6 m



Neutre

Nectar ++  
Pollen ++

Abri refuge

Godet  
Motte  
Arrachis

Maintien de berges.  
Espèce très colonisatrice en conditions idéales (semis naturel sur terrain humide peu végétalisé).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Carex elata All., 1785**

Laïche raide



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

Vivace 70 cm



Neutre

Abri refuge  
NidificationGodet  
Motte  
Arrachis

Réhabilitation de zones humides. Touffes denses non rhizomateuses. Affectionne les substrats gorgés d'eau.


## LISTE ALPES

**Carex paniculata subsp. paniculata L.,**

1755 - Laïche paniculée



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNMC - LABROCHE Aurélien

Vivace 1 m



Neutre

Abri refuge  
NidificationGodet  
Motte  
Arrachis

Réhabilitation de zones humides. Plante de marais. Touffes denses non rhizomateuses.


## LISTE MÉDITERRANÉE

**Carex pendula Huds., 1762**

Laïche à épis pendants



Jan.  
Fév.  
Mars  
Avr.  
Mai  
Juin  
Jui.  
Août  
Sept.  
Oct.  
Nov.  
Déc.



CBNA - DALMAS Jean-Pierre

Vivace 1,5 m



Neutre

Abri refuge  
NidificationGodet  
Motte  
Arrachis

Maintien de berges et épuration.  
Touffes denses non rhizomateuses très colonisatrices.





## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809**

Marisque



Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			Abri refuge (oiseaux, mammifères)
Oct.			
Nov.		Godet Motte Arrachis	
Déc.			

CBNA - DALMAS Jean-Pierre

Réhabilitation de zones humides. Espèce très rhizomateuse à colonisation dense et feuillage très coupant. Affectionne les substrats gorgés d'eau.

## LISTE ALPES

**Deschampsia cespitosa subsp.****cespitosa (L.) P.Beauv., 1812** - Canche cespitose

Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.		Godet Minimotte Graine Arrachis	
Déc.			

CBNA - DALMAS Jean-Pierre

Touffes denses non rhizomateuses. Très colonisateur (semis).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Epilobium hirsutum L., 1753**

Épilobe hérissé



Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Neutre	
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				
Sept.		Nectar ++		Abri refuge
Oct.				
Nov.		Motte Godet Graine		
Déc.				

CBNA - GARRAUD Luc

Maintien de berges, épuration. Espèce colonisatrice par stolons mais peu durable (sauf semis sur terrain nu).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Eupatorium cannabinum subsp.****cannabinum L., 1753** - Eupatoire chanvrine

Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Neutre	
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				Abri refuge Nidification
Sept.				
Oct.				
Nov.		Godet Minimotte Maximotte		
Déc.				

CBNA - HOUARD Françoise

Maintien de berges, réhabilitation de milieu. Touffes épaisses et naturalisation rapide par semis naturels.

## LISTE ALPES

**Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879**

Reine-des-prés



Jan.			
Fév.			
Mars			
Avr.			Neutre
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.		Nectar Pollen	
Oct.			
Nov.		Godet Motte Arrachis Graines	
Déc.			

CBNA - VILLARET Jean-Charles

Maintien de berges. Réhabilitation de milieu. Touffes épaisses et semis. Plante médicinale.

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Juncus acutus L., 1753**

Jonc aigu



Jan.				
Fév.				
Mars				
Avr.			Neutre	
Mai				
Juin				
Jui.				
Août				Abri refuge
Sept.				
Oct.				
Nov.		Godet Motte Arrachis		
Déc.				

CBNA - BIZARD Léa

Maintien de berges. Touffes denses peu rhizomateuses en milieu favorable (eaux saumâtres).



## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Juncus effusus L., 1753**

Jonc diffus



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.





Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - ANDRIEU Frédéric

 Vivace  
80 cm


Épuration. Réhabilitation de milieu. Touffes denses non rhizomateuses. Espèce pionnière, très colonisatrice (semis).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Juncus inflexus L., 1753**

Jonc glauque



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.





Oct.

Nov.

Déc.



CBNMC - LABROCHE Aurélien

 Vivace  
80 cm


Maintien de berges et réhabilitation. Touffes denses non rhizomateuses. Espèce pionnière, très colonisatrice (semis).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Lycopus europaeus L., 1753**

Lycope d'Europe



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.






Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

 Vivace  
50 cm


Réhabilitation de milieu. Espèce colonisatrice par stolons. Plante discrète. Intéressante dans le mélange mégaphorbier.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Lysimachia vulgaris L., 1753**

Lysimaque commune



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.






Oct.

Nov.

Déc.



CBNA - BILLARD Gilbert

 Vivace  
1 m


Maintien de berges et réhabilitation. Espèce colonisatrice par stolons.

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Lythrum salicaria L., 1753**

Salicaire commune



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.






Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

 Vivace  
1,5 m


Maintien de berges, réhabilitation de milieu et épuration. Espèce très colonisatrice en conditions idéales (semis naturel sur terrain peu végétalisé). Propriétés médicinales.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Mentha aquatica L., 1753**

Menthe aquatique



Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Jui.

Août

Sept.






Oct.

Nov.

Déc.



CBNMed - ANDRIEU Frédéric

 Vivace  
30 cm



Réhabilitation de milieu et épuration. Rampante dynamique.















## LISTE ALPES

**Mentha longifolia (L.) Huds., 1762**  
Menthe à longues feuilles




Jan.		↑ Vivace	
Fév.			
Mars			 Neutre
Avr.			
Mai		 Nectar ++ Pollen +	-
Juin			-
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			
Déc.			











CBNMed - ANDREA Robert

Espèce très colonisatrice en conditions idéales (terrain frais peu végétalisé).

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Molinia arundinacea Schrank, 1789**  
Molinie roseau




Jan.		↑ Vivace 80 cm	
Fév.			
Mars			 Neutre
Avr.			
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			 Abri refuge (Oiseaux)
Oct.			
Nov.			Godet Motte Graine Arrachis
Déc.			










CBNMed - HUYNH-TAN Bernadette

Réhabilitation de milieu.  
Espèce très colonisatrice en conditions idéales (terrain frais peu végétalisé).

## LISTE ALPES

**Molinia caerulea (L.) Moench, 1794**  
Molinie bleue




Jan.		↑ Vivace	
Fév.			
Mars			 Acide
Avr.			
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			
Oct.			
Nov.			Godet Motte Arrachis
Déc.			












CBNA - BILLARD Gilbert

Espèce très colonisatrice en conditions idéales (terrains acides et landes à bruyères).

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Phalaris arundinacea L., 1753**  
Alpiste roseau




Jan.		↑ Vivace 1,5 m	
Fév.			
Mars			 Neutre
Avr.			
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.		 Canard	 Abri refuge (Oiseaux)
Oct.			
Nov.			Godet Motte Graines Arrachis
Déc.			











CBNMed - NOBLE Virgile

Maintien de berges, réhabilitation de milieu et épuration.  
Espèce très rhizomateuses à colonisation dense.  
Affectionne les substrats gorgés d'eau.

## LISTE ALPES &amp; MÉDITERRANÉE

**Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud, 1840**  
Phragmite austral




Jan.		↑ Vivace 2 m	
Fév.			
Mars			 Neutre
Avr.			
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			 Abri refuge (Oiseaux)
Oct.			
Nov.			Godet Motte Arrachis
Déc.			



CBNA - DALMAS Jean-Pierre

Maintien de berges, réhabilitation de milieu et épuration.  
Espèce très rhizomateuse à colonisation dense et couvert vaste.  
Affectionne les substrats gorgés d'eau.

## LISTE MÉDITERRANÉE

**Typha latifolia L., 1753**  
Massette à feuilles larges



Jan.		↑ Vivace 2 m	
Fév.			
Mars			 Neutre
Avr.			
Mai			
Juin			
Jui.			
Août			
Sept.			 Abri refuge (Oiseaux)
Oct.			
Nov.			Godet Motte Arrachis
Déc.			

CBNA - GARRAUD Luc

Épuration. Espèce très rhizomateuse à colonisation dense et couvert vaste. Affectionne les substrats gorgés d'eau.





LISTE ALPES & MÉDITERRANÉE

**Carex acutiformis Ehrh., 1789**  
Laïche des marais

Jan.	<p style="font-size: 8px;">CBNA - VILLARET Jean-Charles</p>	 Vivace à rhizome 80 cm	 Neutre
Fév.		 	
Mars		 Neutre	
Avr.		 	
Mai		-	
Juin		Nidification	
Jui.		-	
Août		-	
Sept.		-	
Oct.		-	
Nov.		Minimotte Maximotte Godet Arrachis	
Déc.		-	

Maintien de berges. Espèce très rhizomateuse donc très couvrante et à colonisation dense. Affectionne les substrats gorgés d'eau.

LISTE MÉDITERRANÉE

**Cyperus longus L., 1753**  
Souchet long

Jan.	<p style="font-size: 8px;">CBNA - BILLARD Gilbert</p>	 Vivace à rhizome 80 cm	
Fév.		 	
Mars		 Neutre	
Avr.		 	
Mai		-	
Juin		Abri refuge	
Jui.		-	
Août		-	
Sept.		-	
Oct.		-	
Nov.		Godet Motte Arrachis	
Déc.		-	

Épuration. Espèce très rhizomateuse à colonisation dense. Absente des Alpes-Maritimes.

LISTE ALPES

**Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817**  
Éléocharide des marais

Jan.	<p style="font-size: 8px;">CBNA - BILLARD Gilbert</p>	 Vivace à rhizome 35 cm	
Fév.		 	
Mars		 Neutre	
Avr.		 	
Mai		-	
Juin		Frayères en zones inondables	
Jui.		-	
Août		-	
Sept.		-	
Oct.		-	
Nov.		Minimotte Maximotte Godet Arrachis	
Déc.		-	

Réhabilitation de milieu. Espèce très rhizomateuse à colonisation dense. Affectionne les substrats gorgés d'eau.

LISTE MÉDITERRANÉE

**Iris pseudacorus L., 1753**  
Iris faux acore

Jan.	<p style="font-size: 8px;">CBNA - VILLARET Jean-Charles</p>	 Vivace à rhizome 1,5 m	
Fév.		 	
Mars		 Neutre	
Avr.		 	
Mai		-	
Juin		Nectar ++ Abri refuge (Oiseaux)	
Jui.		-	
Août		-	
Sept.		-	
Oct.		-	
Nov.		Godet Motte Graines Arrachis	
Déc.		-	

Maintien de berges et épuration. Espèce à rhizomes épais, peu colonisatrice.



## ARBRISSEAU

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824	Myricaire d'Allemagne	Alpes



## LIANE ARBORESCENTE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon lupulin	Alpes & Méditerranée



## VIVACE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Alpes & Méditerranée
<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	Laïche de Davall	Alpes
<i>Carex distans</i> L., 1759	Laïche à épis distants	Méditerranée
<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	Laïche étirée	Méditerranée
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	Laïche écailleuse	Alpes
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Laïche cuivrée	Alpes & Méditerranée
<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche panic	Alpes
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	Alpes & Méditerranée
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	Linaigrette à feuilles larges	Alpes
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Alpes
<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	Glycérie pliée	Alpes
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache nodiflore	Méditerranée
<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe odorante	Méditerranée
<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Cresson officinal	Méditerranée
<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Parnassie des marais	Alpes
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	Potentille dressée	Alpes
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	Méditerranée
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Patience agglomérée	Méditerranée
<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	Véronique beccabonga	Alpes & Méditerranée



## VIVACE À RHIZOME

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc articulé	Alpes & Méditerranée
<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	Jonc maritime	Méditerranée



## ANNUELLE

NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN	LISTES
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Véronique mouron-d'eau	Alpes & Méditerranée









## **IV. MILIEUX URBANISÉS : VÉGÉTALISONS NOS VILLES ET NOS VILLAGES**





Pour rappel, ce milieu ne fait pas l'objet d'une liste d'espèces végétales. **Les espèces végétales des « milieux » ouverts, boisés et humides peuvent également convenir en ville selon les aménagements.** Attention, en fonction des aménagements à réaliser, soyez vigilants sur plusieurs caractéristiques présentes dans les listes comme la toxicité ou le caractère allergène des espèces.

Le milieu urbain peut être défini par deux caractéristiques majeures : il est anthropisé et le sol y est bien souvent imperméabilisé. Ces deux caractéristiques en font donc un milieu très minéral laissant peu de place au végétal.

Dans ces conditions, il est nécessaire de créer des espaces végétalisés afin de bénéficier des services rendus par la nature notamment la réduction des îlots de chaleur urbains<sup>61</sup>, l'amélioration de la qualité de l'air, la lutte contre les inondations, etc. En effet, les conséquences du réchauffement climatique se ressentent de façon plus accrue dans nos villes et villages. Intégrer de la nature en ville est donc un atout plus qu'essentiel pour s'adapter aux conditions météorologiques de demain.

**Pour cela, il est nécessaire de recréer des conditions favorables à la végétalisation en apportant une attention particulière au maintien et à l'équilibre du triptyque sol-eau-plantes.**

Recouvert d'une couche imperméable, le sol doit reprendre une place en ville afin que les espèces végétales puissent se développer en pleine terre. Restreints à des jardinières ou des fosses de faible volume, arbres et plantes peinent à se développer dans de bonnes conditions. La création d'espaces verts limite également l'artificialisation des sols et permet la création d'habitats et continuités écologiques favorables à la faune et la flore.

L'eau pluviale doit être perçue comme un atout dans l'aménagement urbain et non comme une contrainte « à évacuer ». Le dérèglement climatique implique des périodes sèches plus longues et des périodes humides plus intenses. Face à ces perspectives, il faut concevoir des projets de végétalisation du milieu urbain en considérant l'eau pluviale comme une ressource. Un projet orienté sur la gestion de l'eau pluviale intégrera le besoin d'un sol vivant c'est-à-dire végétalisé (cf. *chapitre III.1.a*).

**Le choix d'espèces diversifiées dans les aménagements permet d'améliorer la biodiversité. Des combinaisons entre espèces indigènes et espèces horticoles seront intéressantes à réaliser. Dans ce type de milieu très minéralisé, avec très peu de sol, n'hésitez pas à tester, expérimenter les espèces indigènes en intégrant le contexte et les contraintes spécifiques propres à ce milieu.**

Enfin, les espaces verts urbains tendent à renforcer la cohésion sociale en élargissant l'espace commun et ses usages et améliorent la qualité de vie, à l'instar des « coulées vertes », mails arborés, pieds d'arbres végétalisés, potagers partagés, etc.

---

<sup>61</sup> Les villes sont plus chaudes que les campagnes, de l'ordre de plusieurs degrés à cause de surfaces minérales accumulant la chaleur, de production de chaleur par les activités humaines, etc.



## LES NOUES VÉGÉTALISÉES EN MILIEU URBAIN



ARBE - WEPIERRE Nicolas



ARBE - WEPIERRE Nicolas

Aménagement de noues et bandes enherbées au sein du parking Arena d'Aix-en-Provence

Les noues sont des fossés peu profonds à pente douce dont le rôle est de réguler le ruissellement des eaux par la rétention ou la facilitation de leur infiltration dans les nappes phréatiques. Ce sont des ouvrages qui favorisent la gestion des eaux de surface (les eaux de ruissellement et les eaux pluviales).

Traditionnellement creusées en milieux ouverts, elles ont désormais droit de cité en zone urbaine. Les noues sont conçues pour que l'eau s'infilte afin de laisser le volume disponible pour une nouvelle pluie. Ainsi, en infiltrant l'eau en moins de 5 jours, la réalisation des quatre étapes du cycle biologique des moustiques n'est pas possible ; les noues ne concourent donc pas à leur prolifération.

**Lorsqu'elles sont végétalisées le long des voies de circulation ou à proximité de surfaces potentiellement inondables (places, jardins, pistes cyclables, zone de stationnement etc.), elles contribuent à la lutte contre l'imperméabilisation des sols, la réduction du phénomène de ruissellement ou encore la diminution des îlots de chaleur.**

**Elles ont notamment une vraie carte à jouer en matière de dépollution : elles dégradent certains hydrocarbures et certaines autres graisses émises par le trafic automobile et fixent les métaux lourds.**



## LES TOITURES ET FAÇADES VÉGÉTALISÉES

---

Le bâti<sup>62</sup> incluant les toitures, les murs et les façades représente une surface complémentaire, non négligeable pour la végétalisation, surtout urbaine.

Les espèces végétales retenues pour les toitures végétalisées doivent être adaptées à la sécheresse et aussi et surtout être capables de résilience. Même après une période de stress hydrique, les végétaux choisis doivent donc avoir la capacité de se développer. La toiture évolue au cours des saisons : il faut accepter d'avoir une toiture jaunie en période estivale. En outre, le substrat doit contenir une part d'éléments fins (limons et argiles) pour favoriser l'inertie hydrique après une pluie et la biodisponibilité des minéraux. Le substrat est donc à décrire avec un minimum de détails dans la rédaction du cahier des charges afin de concevoir une toiture végétalisée adaptée, d'où l'importance d'avoir recours à différents professionnels pour cette étape.

En ce qui concerne les murs<sup>63</sup>, il existe une très grande variété de système de végétalisation allant des murs modulaires irrigués nécessitant une ingénierie complexe aux plantes grimpantes pouvant pousser directement sur la façade<sup>64</sup>. **Au-delà de l'aspect esthétique, il est conseillé de privilégier les systèmes simples ne nécessitant pas un arrosage intégré, ni un entretien fréquent et de prévoir des espaces en pleine terre.**

**En plus de leur facilité d'installation, les plantes grimpantes créent un microclimat près des murs qui régule la température et l'humidité relative, cela participe d'autant à la diminution des effets d'îlots de chaleur et forme un refuge et une source de nourriture pour de nombreux pollinisateurs.** On leur prête souvent à tort des actions de dégradation des murs. Il suffit d'éviter les plantes à « crampons » ou d'installer une structure extérieure permettant à la plante de se développer sans s'accrocher au mur. En outre, ces plantes empêchent les rayons ultraviolets, la pluie et les polluants atmosphériques d'atteindre directement la paroi, ce qui protège les matériaux de l'érosion physique et chimique.

Les eaux pluviales de la toiture peuvent être utilisées pour les surfaces de pleine terre autour du bâtiment, nécessaires pour les différentes plantes. Ainsi, l'état des plantes sera amélioré et l'infiltration des eaux pluviales sera favorisée. La pose d'une géomembrane au droit du bâti peut éviter les problèmes de remontées capillaires.

---

<sup>62</sup> cf. l'étude Grooves (Green Roofs Verified Ecosystem Services) de l'ARB Île-de-France, et les recommandations professionnelles de l'Unep sur la conception, la réalisation et l'entretien de toitures végétalisées (avril 2020) : BC4 Règles à respecter pour les toitures végétalisées | Unep (lesentreprisesdupaysage.fr) et BC3-RO Règles de végétalisation de façades par bardage rapporté | Unep (lesentreprisesdupaysage.fr).

<sup>63</sup> Source : « Plantons local en Île-de-France ».

<sup>64</sup> La plantation en pleine terre en pied de façade peut se faire dans le cadre de programmes participatifs mis en place par les communes ou les associations (cf. zoom sur la végétalisation participative).





## LA VÉGÉTALISATION DES COURS D'ÉCOLES



Végétalisation et désimperméabilisation de la cour d'école Roland Scheppler à Avignon

Les cours d'écoles représentent des surfaces bien souvent homogènes et imperméables. Les communes, qui ont la maîtrise foncière de ces espaces, peuvent y voir un potentiel important de désimperméabilisation et de végétalisation. **Les réaménager<sup>65</sup> en îlots de fraîcheur est un enjeu pour l'adaptation et la résilience de nos villes et villages face au changement climatique.**

Le végétal peut permettre de protéger des nuisances et des vents dominants. Il peut servir de point d'ombre, de lieu de rencontre, d'élément de jeu, voire d'appareil à grimper.

Les jeunes générations sont de moins en moins en contact avec la nature. À l'école, cette dernière se limite, dans le meilleur des cas, à l'existence de quelques arbres ceinturés de bitume. La végétalisation et la désimperméabilisation peuvent contribuer, dans une certaine mesure, à recréer ce lien entre les enfants et la nature. Écologie, connaissance et culture de plantes font partie des apprentissages à l'école primaire.

Le jardinage est de plus recommandé pour sensibiliser les enfants aux cycles naturels.

**La renaturation des cours d'écoles est donc l'occasion de repenser et mieux répartir l'espace en alliant davantage de végétation et des espaces plus ludiques et adaptés aux enfants. Pour prévenir tout incident, il convient d'éviter les plantes épineuses, urticantes, allergènes et bien sûr les plantes toxiques. En outre, l'usage et la gestion de ces surfaces végétalisées doivent être bien adaptés, pour faire en sorte qu'elles perdurent et éviter, par exemple, un piétinement trop intense.**

<sup>65</sup> Quelques ressources existent dont un cycle de webinaire organisé par l'ARBE : [www.arbe-regionsud.org/23749-retour-sur-le-cycle-de-webinaires-de-nature-dans-nos-cours-decoles.html](http://www.arbe-regionsud.org/23749-retour-sur-le-cycle-de-webinaires-de-nature-dans-nos-cours-decoles.html)



## LA VÉGÉTALISATION PARTICIPATIVE



ARBE - GARRIDO Stéphanie



ARBE - PETENIAN Frédéric

Permis de végétaliser sur la commune d'Arles

Végétalisation participative dans les rues de Mouans-Sartoux

La végétalisation participative a le vent en poupe. De nombreuses communes s'y sont lancées, accompagnant les habitants soucieux d'améliorer le cadre de vie, de renforcer le lien social, de contribuer à renforcer le confort thermique et favoriser la biodiversité.

Cela peut prendre plusieurs formes et différentes appellations existent : permis de végétaliser, végétalisation citoyenne et participative, etc.

Toutes ont le même objectif : faire confiance aux habitants en leur déléguant la gestion de végétaux plantés dans l'espace public, moyennant des engagements respectant les grandes lignes d'une charte de l'environnement (ou charte de végétalisation participative) adoptée par les villes. Il peut s'agir de jardins partagés, soit une parcelle dans laquelle un groupe de riverains s'investit, ou de jardins de rue, généralement des micro-parcelles type bacs potagers ou fosses creusées à dessein dans le bitume (végétalisation de façades et de pas-de-porte, végétalisation de pieds d'arbres, végétalisation de « délaissés » de terrain sur le domaine public, etc.).

**La végétalisation participative contribue à une meilleure acceptation de la nature et de la flore spontanée dans les espaces urbains et à un renforcement des échanges entre population et agents des services techniques.**







PARTIE 3

.....  
**ANNEXES**



DIXON Lara

## I. PLANTONS LOCAL : LA MÉTHODOLOGIE

Cette annexe présente les aspects méthodologiques de construction de la partie 2 « Les palettes végétales » du guide.

- ▶ Le travail sur les espèces est fondé sur la base de données SIMETHIS<sup>66</sup>, qui répertorie toutes les observations floristiques effectuées sur les territoires d'agrément des Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen.
- ▶ Le référentiel taxonomique utilisé pour nommer les espèces est la version 15 du TAXREF.
- ▶ Seules les observations les plus récentes, c'est-à-dire postérieures à l'année 2000, ont été prises en compte.

La première étape a permis de sélectionner les **espèces indigènes et archéophytes** sur le territoire de deux zones biogéographiques selon les critères de la marque « Végétal local<sup>67</sup> » : la **zone méditerranéenne et la zone alpine**.

- Une espèce est définie comme **indigène** à une région donnée si sa présence dans cette région est le résultat de processus naturels sans intervention humaine.
- Les espèces messicoles ont été intégrées, bien que considérées comme des archéophytes et bénéficiant d'un plan national d'actions, la Région Sud ayant une grande responsabilité quant à leur conservation.
- Les espèces ayant un statut réglementaire (protection nationale, régionale, départementale), ainsi que les espèces mentionnées dans les listes rouges nationale et régionale avec les cotations VU (Vulnérable), EN (en danger) et CR (en danger critique d'extinction) ont été retirées.
- Les arbres fruitiers ont également été écartés.
- Les espèces végétales exotiques envahissantes ont été retirées de ces listes (pour plus d'informations : [invmed.fr](http://invmed.fr)).

La seconde étape a permis de sélectionner les espèces les plus ubiquistes<sup>68</sup> dans les deux zones biogéographiques au sens Végétal local (en croisant avec un pourcentage d'occurrence / présence).

- Pour la zone alpine, le pourcentage de présence retenue dans la zone Végétal local Alpes est de 100 % (selon Végétal local, la zone alpine est découpée en 2 entités, Alpes du nord et Alpes du sud, donc les espèces retenues sont présentes dans les 2 zones).
- Pour la zone méditerranéenne, le pourcentage de présence retenue dans la zone Végétal local Méditerranée varie entre 80 et 100 % (selon Végétal local, la zone méditerranéenne est découpée en 5 zones, donc les espèces retenues sont présentes dans au moins 80 % de ces zones).

La troisième étape a consisté à sélectionner plus finement les espèces les plus ubiquistes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour cela, le résultat obtenu à l'étape 2 a été croisé avec les 30 petites régions naturelles<sup>69</sup> de notre territoire.

Ce troisième filtre a permis de sélectionner les espèces présentes dans plus de 91 % des petites régions naturelles pour la zone alpine et plus de 84 % des petites régions pour la zone méditerranéenne.

---

<sup>66</sup> SIMETHIS. Conservatoire botanique national méditerranéen et Conservatoire botanique national alpin. 2021. SIMETHIS - module Flore [online]. <http://simethis.eu>

<sup>67</sup> Végétal local est une marque créée par l'Office français de la biodiversité (OFB), et plus spécifiquement un outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux.

<sup>68</sup> Ubiquiste : terme caractérisant les espèces, surtout végétales, susceptibles d'être observées dans de très nombreux habitats. On dit que ces espèces ont une forte plasticité écologique.

<sup>69</sup> Découpage des petites régions naturelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur selon le Schéma Régional de Cohérence Écologique.



- ▶ Certains taxons ont été retirés à dire d'experts, ce qui a permis d'éliminer les taxons dont la détermination était trop complexe ou la taxonomie trop difficile (notamment dans le cas de sous-espèces aux conditions écologiques particulières), les espèces rudérales, ou encore les espèces ne produisant pas de graines.
- ▶ Toutes les espèces retenues dans les listes sont potentiellement éligibles à la marque Végétal local (sur l'une et/ou l'autre des deux zones biogéographiques).
- ▶ Dans certains cas, les espèces nuisibles pour la santé ont été retirées de ces listes. Cela n'a pas été réalisé systématiquement. Dans ce cas, et lorsque cela était connu, les particularités des espèces, comme la toxicité ou le caractère allergène, ont été précisées.
- ▶ Un travail avec les professionnels du secteur (horticulteurs, pépiniéristes, producteurs, semenciers, etc.) a permis de ne garder que les espèces potentiellement intéressantes, disponibles, déjà mises en production et/ou faciles à produire.

### **Dans les palettes végétales, deux niveaux sont proposés par milieu :**

- **Liste 1** : une première liste présente les espèces éligibles aujourd'hui à la marque Végétal local (sur une des deux zones biogéographiques et/ou sur les deux zones biogéographiques Alpes et Méditerranée). Cette liste est classée par grand type biologique puis par ordre alphabétique, à la demande des utilisateurs. Elle détaille pour chaque espèce les caractéristiques suivantes (définies de façon partenariale) :

Milieu / Regroupement par grand type biologique / Nom scientifique / Nom commun / Période floraison / Exposition / Température / Humidité du sol / pH / Couleur fleur / Texture du sol / Intérêts pour la faune et fonctions écologiques / Conditionnement / Particularités / Illustrations / Zone biogéographique alpes / Zone biogéographique méditerranée / Autres milieux.

- **Liste 2** : une seconde liste présente les espèces potentiellement éligibles à la marque Végétal local mais non retenues à ce jour (sur l'une et/ou l'autre des deux zones biogéographiques que l'on retrouve sur le territoire régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur). Cette liste est classée par type biologique, puis par ordre alphabétique (toujours à la demande des utilisateurs) mais sans détails au niveau des caractéristiques :

Milieu / Regroupement par grand type biologique / Nom scientifique / Nom commun / Zone biogéographique alpes / Zone biogéographique méditerranée.



**Tableau des caractéristiques présentes dans les listes et sources**

Caractéristiques	Sources
<b>Nom scientifique</b>	TAX REF 15 / SIMETHIS
<b>Nom commun</b>	TAX REF 15 / SIMETHIS
<b>Type biologique-végétatif</b>	SIMETHIS / Baseflor Julve
<b>Floraison début-fin</b>	SIMETHIS / Baseflor Julve
<b>Lumière/ensoleillement</b>	SIMETHIS
<b>Température /Rusticité</b>	SIMETHIS
<b>Humidité du sol</b>	SIMETHIS
<b>PH</b>	SIMETHIS
<b>Couleur fleur</b>	Baseflor Julve / Guide Plantons local en Île de France / Guides de la zone Alpes et Méditerranée - Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages - Essences d'arbres et arbustes pour une biodiversité locale / Liste des plantes attractives pour les abeilles - Plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter
<b>Hauteur en conditions optimales (informations partielles, pas sur toutes les listes)</b>	Baseflor Julve / Guide Plantons local en Île de France / Guides de la zone Alpes et Méditerranée - Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages - Essences d'arbres et arbustes pour une biodiversité locale / Liste des plantes attractives pour les abeilles - Plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter
<b>Feuillage (informations partielles, pas sur toutes les listes)</b>	Dire d'experts (pépiniéristes, etc.) et ressources / Guide Plantons local en Île de France / Guides de la zone Alpes et Méditerranée - Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages - Essences d'arbres et arbustes pour une biodiversité locale / Liste des plantes attractives pour les abeilles - Plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter
<b>Texture du sol (de 1 à 9)</b>	Baseflor Julve / Guide Plantons local en Île de France / Guides de la zone Alpes et Méditerranée - Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages - Essences d'arbres et arbustes pour une biodiversité locale / Liste des plantes attractives pour les abeilles - Plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter. 1 : argile, 2 : intermédiaire, 3 : limon, 4 : sable fin, 5 : sable grossier, 6 : graviers, 7 : galets, rocaillies, 8 : blocs, dalles, replats rocheux, 9 : fissures verticales des parois
<b>Salinité (de 0 à 9)</b>	Baseflor Julve. 0 : ne supportant pas le sel, 1 : hyperligohalines, [0-1‰ Cl-] - 2 : perligohalines, [1-3 ‰ Cl-], 3 : oligohalines, [3-5‰ Cl-], 4 : méso-oligohalines, [5-7 ‰ Cl-], 5 : mésohalines, [7-9 ‰ Cl-], 6 : méso-euhalines, [9-12 ‰ Cl-], 7 : euhalines, [12-16 ‰ Cl-], 8 : pereuhalines, [16-23 ‰ Cl-], 9 : hypereuhalines, [>23 ‰ Cl-]
<b>Intérêt pour la faune/ Gîte (Abri-refuge, nidification) ; Disponibilité en ressources alimentaires</b>	Dire d'experts (pépiniéristes, etc.) et ressources / Guide Plantons local en Île de France / Guides de la zone Alpes et Méditerranée - Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages - Essences d'arbres et arbustes pour une biodiversité locale / Liste des plantes attractives pour les abeilles - Plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter
<b>Conditionnement</b>	Dire d'experts (pépiniéristes, etc..)
<b>Particularités</b>	Dire d'experts (pépiniéristes, etc.) et ressources / Guide Plantons local en Île de France / Guides de la zone Alpes et Méditerranée - Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages - Essences d'arbres et arbustes pour une biodiversité locale / Liste des plantes attractives pour les abeilles - Plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter
<b>Réglementation cueillette</b>	SIMETHIS
<b>Zone Alpes</b>	SIG (Conservatoire botanique national alpes et Conservatoire botanique national méditerranéen)
<b>Zone Méditerranée</b>	SIG (Conservatoire botanique national alpes et Conservatoire botanique national méditerranéen)
<b>Illustrations</b>	Conservatoires Botaniques nationaux

## II. LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE)

Ci-dessous, sont recensées les 143 espèces végétales exotiques envahissantes (Statut EVEE) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au 6 juillet 2022 (source plateforme INVMED-Flore).

Statut	Nom commun	Nom scientifique	Habitats
EVEE	Achillée à feuilles de crithme, Achillée à feuilles de criste marine	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit., 1802	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Agave d'Amérique	<i>Agave americana</i> L., 1753	Côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Ail inodore, Ail odorant	<i>Nothoscordum borbonicum</i> Kunth, 1843	Milieux anthropiques
EVEE	Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailante	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; Forêts et maquis ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Albizia lophantha, Acacia du Cap, Albizzie à crêtes	<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C.Nielsen, 1983	Berges et ripisylves ; côtes rocheuses et falaises ; milieux anthropiques
EVEE	Alysson blanc, Alysse blanche, Bertéroa blanchâtre	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC., 1821	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Amarante blanche	<i>Amaranthus albus</i> L., 1759	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Amarante couchée, Amarante étalée	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	
EVEE	Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Ambroisie à feuilles d'armoise	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Ambroisie à petites feuilles, Ambroisie à feuilles fines	<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng., 1826	dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Ambroisie trifide, Grande herbe à poux	<i>Ambrosia trifida</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Araujia porte-soie, Faux-kapok, Liane cruelle	<i>Araujia sericifera</i> Brot., 1818	Milieux anthropiques
EVEE	Armoise annuelle	<i>Artemisia annua</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877	Berges et ripisylves ; prairies humides
EVEE	Aster à feuilles de saule	<i>Symphotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Berges et ripisylves ; prairies humides
EVEE	Aster écaillé	<i>Symphotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995	Marais, tourbières, tufières ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Azolla fausse-fougère, Azolla fausse-filicule, Fougère d'eau	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	Eaux courantes ou stagnantes
EVEE	Balsamine de Balfour, Impatiente des jardins	<i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903	Berges et ripisylves ; forêts et maquis ; milieux anthropiques



## II. LISTE DES EVEE

Statut	Nom commun	Nom scientifique	Habitats
EVEE	Bambou doré	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Bambou noir du Japon	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Lindl.) Munro, 1868	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Berce du Caucase	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Bident feuillu, Bident feuillé, Bident à fruits noirs	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Bignone, Jasmin de Virginie, Jasmin trompette	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. ex Bureau, 1864	
EVEE	Blé velu	<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) P.Candargy, 1901	Milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Bourreau-des-arbres, Périploca de Grèce	<i>Periploca graeca</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable
EVEE	Brome purgatif, Brome faux uniola	<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter, 1940	Berges et ripisylves ; côtes rocheuses et falaises ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Brome sans arêtes, Brome inerme	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub, 1973	Milieux anthropiques ; prairies humides ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Buddleia, Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Buisson ardent, Arbre de Moïse	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; forêts et maquis ; milieux anthropiques ; prairies humides ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Bunias d'Orient, Roquette d'Orient	<i>Bunias orientalis</i> L., 1753	Milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Campanule des murailles	<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult., 1819	
EVEE	Cèdre de l'Atlas	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière, 1855	Côtes rocheuses et falaises ; forêts et maquis ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Chêne rouge d'Amérique	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	Forêts et maquis
EVEE	Chénopode fausse ambroisie	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Chèvrefeuille du Japon	<i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784	Berges et ripisylves ; forêts et maquis ; marais, tourbières, tufières
EVEE	Cognassier	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., 1768	
EVEE	Conyze du Canada, Vergerette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Crépide à feuilles de capselle, Fausse bourse à pasteur	<i>Crepis bursifolia</i> L., 1753	Milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Cuscute des champs	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932	Berges et ripisylves ; milieux agricoles
EVEE	Cyprés chauve	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810	Berges et ripisylves ; marais, tourbières, tufières ; milieux anthropiques
EVEE	Datura stramoine, Stramoine commune, Herbe à la taupe, Datura officinal	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques

Statut	Nom commun	Nom scientifique	Habitats
EVEE	Digitaire ciliée	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler, 1802	Milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Dischondre à petites fleurs	<i>Dichondra micrantha</i> Urb., 1924	Milieux anthropiques
EVEE	Égérie dense, Égéria, Élodée dense	<i>Egeria densa</i> Planch., 1849	Eaux courantes ou stagnantes
EVEE	Élide en forme d'asperge	<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce, 1914	Côtes rocheuses et falaises ; forêts et maquis ; milieux anthropiques
EVEE	Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St. John, 1920	Eaux courantes ou stagnantes
EVEE	Élodée du Canada	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Eaux courantes ou stagnantes
EVEE	Éphédre élevé, Éphédra élevé	<i>Ephedra altissima</i> Desf., 1799	
EVEE	Éphémère de Rio	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell., 1829	Berges et ripisylves ; forêts et maquis ; milieux anthropiques
EVEE	Érable negundo, Érable frêne, Érable négondo	<i>Acer negundo</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; forêts et maquis
EVEE	Érigéron crépu, Vergerette d'Argentine	<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	Dunes côtières et plages de sable ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Euphorbe à graines entaillées	<i>Euphorbia glyptosperma</i> Engelm., 1859	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Euphorbe de David, Euphorbe dentée	<i>Euphorbia davidii</i> Subils, 1984	Milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée	<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Euphorbe prostrée	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Euphorbe rampante	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Faux kikuyu, Sténotaphrum, Herbe de Saint-Augustin	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, 1891	Dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Faux-indigo, Indigo du Bush, Amorphe buissonnante	<i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Ficoïde (hybride cordifolia x haeckeliana)	<i>Mesembryanthemum cordifolium</i> x <i>Mesembryanthemum haeckelianum</i>	
EVEE	Ficoïde glaciale, Ficoïde à feuilles en coeur	<i>Mesembryanthemum cordifolium</i> L.f., 1782	Côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Figuier de Barbarie, Figuier d'Inde	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill., 1768	Côtes rocheuses et falaises ; milieux anthropiques
EVEE	Freesia blanc	<i>Freesia alba</i> (G.L.Mey.) Gumbel., 1896	Côtes rocheuses et falaises ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Gazania, Gazanie	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn., 1791	Côtes rocheuses et falaises ; milieux anthropiques
EVEE	Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Élodée à feuilles alternes	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928	Eaux courantes ou stagnantes
EVEE	Grassette à fleurs hirsutes	<i>Pinguicula hirtiflora</i> Ten., 1811	Marais, tourbières, tufières

## II. LISTE DES EVEE

Statut	Nom commun	Nom scientifique	Habitats
EVEE	Griffe de sorcière (hybride acinaciformis x edulis)	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> x <i>Carpobrotus edulis</i>	Côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Griffe de sorcière, Ficoïde à feuilles en sabre	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L. Bolus, 1927	Côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Griffe de sorcière, Ficoïde doux, Figuier des Hottentots	<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	Côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Hakéa à feuilles de saule	<i>Hakea salicifolia</i> (Vent.) B.L.Burt., 1941	Forêts et maquis
EVEE	Hakéa soyeux	<i>Hakea sericea</i> Schrad. & J.C.Wendl., 1798	Forêts et maquis
EVEE	Halime, Arroche halime	<i>Atriplex halimus</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques ; prairies humides ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Hélianthe vivace	<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Herbe à alligator	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb., 1879	Berges et ripisylves ; eaux courantes ou stagnantes ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Herbe de la pampa, Roseau à plumes	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Berges et ripisylves ; côtes rocheuses et falaises ; Dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques ; prairies humides ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Jussie à grandes fleurs, Ludwigie à grandes fleurs	<i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>hexapetala</i> (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000	Berges et ripisylves ; eaux courantes ou stagnantes ; prairies humides
EVEE	Jussie rampante	<i>Ludwigia peploides</i> subsp. <i>montevidensis</i> (Spreng.) P.H.Raven, 1964	Berges et ripisylves ; eaux courantes ou stagnantes ; prairies humides
EVEE	Kikuyu, Pennisetum clandestin	<i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone, 2010	Dunes côtières et plages de sable ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Laitue d'eau	<i>Pistia stratiotes</i> L., 1753	Eaux courantes ou stagnantes
EVEE	Lampourde d'Italie	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Lampourde épineuse	<i>Xanthium spinosum</i> L., 1753	Milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Lampsane intermédiaire	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931	Forêts et maquis ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Lentille d'eau minuscule	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Eaux courantes ou stagnantes
EVEE	Lierre d'Allemagne	<i>Delairea odorata</i> Lem., 1844	Côtes rocheuses et falaises ; milieux agricoles
EVEE	Luzerne en arbre	<i>Medicago arborea</i> L., 1753	Côtes rocheuses et falaises ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Lyciet commun	<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	
EVEE	Lyciet de Chine	<i>Lycium chinense</i> Mill., 1768	



Statut	Nom commun	Nom scientifique	Habitats
EVEE	Lyciet d'Europe	<i>Lycium europaeum</i> L., 1753	
EVEE	Marsilée de Drumond, Nardou	<i>Marsilea drummondii</i> A.Braun, 1852	Eaux courantes ou stagnantes ; milieux anthropiques
EVEE	Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	Milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Mimosa d'hiver, Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes	<i>Acacia dealbata</i> Link, 1822	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; forêts et maquis ; milieux anthropiques
EVEE	Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons, Mimosa d'été	<i>Acacia retinodes</i> Schtdl., 1847	Dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Mimule tacheté	<i>Erythranthe guttata</i> (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012	Berges et ripisylves ; eaux courantes ou stagnantes ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Morelle faux chénopode, Morelle grêle, Morelle sublobée	<i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794	Berges et ripisylves ; marais, tourbières, tufières ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Muguet des pampas	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill., 1888	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; forêts et maquis ; milieux anthropiques
EVEE	Mûrier à papier, Broussonétia à papier	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., 1799	Berges et ripisylves ; forêts et maquis ; milieux anthropiques
EVEE	Myriophylle du Brésil, Myriophylle aquatique, Millefeuille aquatique	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	Eaux courantes ou stagnantes
EVEE	Olivier de Bohême, Arbre d'argent, Arbre de paradis	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875	Dunes côtières et plages de sable ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Oponce d'Engelmann, Oponce vigoureuse	<i>Opuntia engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm., 1850	Côtes rocheuses et falaises ; milieux anthropiques
EVEE	Oponce stricte	<i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw., 1812	Côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques
EVEE	Oxalis articulé	<i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798	Milieux anthropiques
EVEE	Oxalis pied-de-chèvre	<i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753	Côtes rocheuses et falaises ; forêts et maquis ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Panic capillaire	<i>Panicum capillare</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Paspale à deux épis	<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	Berges et ripisylves ; marais, tourbières, tufières ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Paspale dilaté	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Patience à crêtes, Rumex à crêtes	<i>Rumex cristatus</i> DC., 1813	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Pennisetum hérissé, Pennisetum velu	<i>Cenchrus longisetus</i> M.C.Johnst., 1963	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Pétasite odorant, Hélioïtrophe d'hiver	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986	Berges et ripisylves

## II. LISTE DES EVEE

Statut	Nom commun	Nom scientifique	Habitats
EVEE	Phyla blanchâtre, Lippia gazon	<i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i> (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura, 2012	Milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Pin noir d'Autriche	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785	Milieux anthropiques
EVEE	Pittospore de Chine, Arbre des Hottentots	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton, 1811	Berges et ripisylves ; côtes rocheuses et falaises ; milieux anthropiques
EVEE	Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; forêts et maquis ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Renouée de Bohême	<i>Reynoutria x bohémica</i> Chrtek & Chrtková, 1983	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Robinier faux-acacia, Carouge	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; forêts et maquis ; milieux anthropiques
EVEE	Sapin d'Espagne	<i>Abies pinsapo</i> Boiss., 1838	Forêts et maquis
EVEE	Sauge de Jérusalem	<i>Phlomis fruticosa</i> L., 1753	
EVEE	Séneçon à feuilles de pétasite	<i>Roldana petasitis</i> (Sims) H.Rob. & Brettell, 1974	Milieux anthropiques
EVEE	Séneçon à feuilles en delta	<i>Senecio deltoideus</i> Less., 1832	Côtes rocheuses et falaises ; forêts et maquis ; milieux anthropiques
EVEE	Séneçon anguleux	<i>Senecio angulatus</i> L.f., 1782	Côtes rocheuses et falaises ; forêts et maquis ; milieux anthropiques
EVEE	Séneçon du Cap, Séneçon sud-africain	<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; marais, tourbières, tufières ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'halimione	<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; Dunes côtières et plages de sable ; Marais, tourbières, tufières ; Milieux anthropiques ; Prairies humides
EVEE	Sicyos anguleux, Concombre anguleux	<i>Sicyos angulatus</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; Milieux agricoles
EVEE	Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante	<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	Berges et ripisylves ; forêts et maquis ; marais, tourbières, tufières ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Souchet vigoureux, Souchet robuste	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Berges et ripisylves ; marais, tourbières, tufières ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Spartine bigarrée, Spartine étalée	<i>Spartina patens</i> (Aiton) Muhl., 1813	Dunes côtières et plages de sable
EVEE	Sporobole engainé	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques
EVEE	Sporobole tenace, Sporobole fertile	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques ; prairies humides
EVEE	Topinambour, Patate de Virginie	<i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753	Berges et ripisylves ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Tordyle des Pouilles	<i>Tordylium apulum</i> L., 1753	Milieux agricoles
EVEE	Troène luisant	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton, 1810	Berges et ripisylves ; forêts et maquis ; milieux anthropiques

Statut	Nom commun	Nom scientifique	Habitats
EVEE	Vergerette annuelle, Érigéron annuel	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Berges et ripisylves ; marais, tourbières, tufières ; milieux anthropiques
EVEE	Vergerette de Karvinski, Vergerette mucronée	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836	Berges et ripisylves ; côtes rocheuses et falaises ; milieux anthropiques
EVEE	Vergerette de Sumatra, Vergerette de Barcelone	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	Dunes côtières et plages de sable ; milieux agricoles ; milieux anthropiques
EVEE	Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Berges et ripisylves ; dunes côtières et plages de sable ; milieux agricoles ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Vigne (hybride acerifolia x riparia)	<i>Vitis acerifolia x Vitis riparia</i>	
EVEE	Vigne des rivages, Vigne des rives	<i>Vitis riparia</i> Michx., 1803	
EVEE	Vigne-vierge à trois pointes, Vigne vierge à trois becs, Vigne-vierge tricuspidée	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch., 1887	
EVEE	Vigne-vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	Berges et ripisylves ; forêts et maquis
EVEE	Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée de Boukhara	<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971	Berges et ripisylves ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues
EVEE	Wigandie de Caracas	<i>Wigandia caracasana</i> Kunth, 1819	Côtes rocheuses et falaises ; milieux anthropiques
EVEE	Yucca glorieux, Dague espagnole	<i>Yucca gloriosa</i> L., 1753	Côtes rocheuses et falaises ; dunes côtières et plages de sable ; milieux anthropiques ; prairies, pelouses sèches et garrigues



### III. BIBLIOGRAPHIE ET RESSOURCES

- ▶ **Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages - Essences d'arbres et arbustes pour une biodiversité locale - Guide de la zone Alpes**, Pollinis, 2021, 36 pages
- ▶ **Composer des haies favorables aux pollinisateurs sauvages - Essences d'arbres et arbustes pour une biodiversité locale - Guide de la zone Méditerranée**, Pollinis, 2021, 36 pages
- ▶ **Conception écologique d'un espace public paysager - Guide méthodologique de conduite de projet**, Plante&Cité, Angers 94 pages
- ▶ **Concevoir, planter et entretenir des haies**, Guide pratique, Parc naturel régional du Verdon, 2018
- ▶ **Guide de plantation pour les Bouches-du-Rhône - Une sélection de 100 plantes tolérant la sécheresse**, Conseil général des Bouches-du-Rhône, CAUE des Bouches-du-Rhône, Comité départemental du tourisme, 2009, 20 pages
- ▶ **Guide pour la mise en place de plantations mellifères**, Communauté d'agglomération Pays de Grasse, 2016, 15 pages
- ▶ **Guide pratique, Fleurs, arbres et arbustes du Nord Est de la France, Tome 1, Choisir les plantes**, Parc naturel régional de Lorraine, des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord, 160 pages, 50 pages
- ▶ **Guide pratique, Fleurs, arbres et arbustes du Nord Est de la France, Tome 2, Planter, cultiver, entretenir**, Parc naturel régional de Lorraine, des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord, 160 pages, 50 pages
- ▶ **L'arbre en ville - Comprendre cet allié d'avenir pour mieux le gérer et le valoriser**, AURAV, 2020, 92 pages
- ▶ **L'eau en Provence, Comment mieux gérer l'eau dans les espaces verts**, Conseil général des Bouches-du-Rhône, CAUE des Bouches-du-Rhône, Comité départemental du tourisme, 28 pages
- ▶ **Le Guide, l'arbre dans le Var - Compagnon de nos villes et villages**, Conseil général du Var, CAUE du Var, 2003, 57 pages
- ▶ **Les plantes adaptées aux jardins et espaces varois - Carnet varois de l'environnement n°5**, Conseil général du Var, 2007, 55 pages
- ▶ **Le végétal, votre maison - Guide technique des plantes couvre-sol pour un jardin facile en Luberon**, Parc naturel régional du Luberon, 2010, 32 pages
- ▶ **Le végétal, votre maison - Guide technique pour planter arbres et arbustes dans le Luberon**, Parc naturel régional du Luberon, 79 pages
- ▶ **Liste des plantes attractives pour les abeilles - Plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter**, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, 2017, 23 pages
- ▶ **Nature en ville - Quels bénéfiques du végétal ?**, AURAV, 2020, 12 pages
- ▶ **Palettes végétales, végétaux adaptés au territoire de la CASA pour aménagements et jardins**, Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis 2019, 70 pages
- ▶ **Pour favoriser la biodiversité Plantons local en Île-de-France - Arbres, Arbustes & Herbacées à privilégier en Île-de-France**, Institut Paris région, Agence Régionale de la Biodiversité, 2019, 97 pages
- ▶ **Pour plus de biodiversité, plantons local - Arbres, arbustes, herbacées à privilégier pour favoriser la biodiversité sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg**, Eurométropole de Strasbourg, 2013, 95 pages
- ▶ **Quels végétaux pour nos villes et villages ? Guide pratique Villes et Villages fleuris**, CAUE 84, CDT 848 pages
- ▶ **Sem'les Alpes - Des semences d'origine locale pour la restauration des milieux ouverts en montagne alpine**, Conservatoire National Alpin, IRSTEA, Société d'économie Alpestre de la Haute-Savoie, 104 pages
- ▶ **SESAME, services écosystémiques rendus par les arbres, modulés selon l'essence**, Cerema, Metz, Metz Métropole, 2019, 160 pages
- ▶ **Toitures végétalisées extensives en climat méditerranéen, retours d'expériences, le toit de l'IUT d'Avignon**, Nature for city life, 2 pages
- ▶ **Un jardin en Provence - Guide Plantation Bouches-du-Rhône**, Conseil général des Bouches-du-Rhône, CAUE des Bouches-du-Rhône, Comité départemental du tourisme, 2014, 10 pages
- ▶ **Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle Aquitaine - Guide pour l'utilisation d'arbres, arbustes et herbacées d'origine locale**, Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, 2018, 80 pages

- ▶ **Cartographie-Régions d'origines et unités naturelles Végétal local** : [umap.openstreetmap.fr/fr/map/vegetal-local-regions-dorigines-et-unites-naturell\\_656487#7/46.548/3.658](http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vegetal-local-regions-dorigines-et-unites-naturell_656487#7/46.548/3.658)
- ▶ **Certification horticole française** : [www.plantebleue.fr](http://www.plantebleue.fr)
- ▶ **Code conduite Val'Hor relatif aux espèces végétales exotiques envahissantes - EVEC** : [www.codeplantesenvahissantes.fr](http://www.codeplantesenvahissantes.fr)
- ▶ **Coefficient de biotope par surface (CBS)** : <http://multimedia.ademe.fr/catalogues/CTecosystemes/fiches/outill1p6364.pdf>
- ▶ **Conception écologique d'un espace public paysager** : [https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/205/guide\\_de\\_conception\\_ecologique\\_d\\_un\\_espace\\_public\\_paysager](https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/205/guide_de_conception_ecologique_d_un_espace_public_paysager)
- ▶ **Conception, réalisation et entretien des toitures végétalisées** : Règles à respecter pour les toitures végétalisées | Unep ([lesentreprisesdupaysage.fr](http://lesentreprisesdupaysage.fr))
- ▶ **Conception, réalisation et entretien des solutions de végétalisation de façades par bardage rapporté** : BC3-R0 Règles de végétalisation de façades par bardage rapporté | Unep ([lesentreprisesdupaysage.fr](http://lesentreprisesdupaysage.fr))
- ▶ **Cooltrees** : <https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/82/cooltrees-le-rafraichissement-des-villes-par-les-arbres-quantification-et-modelisation-pour-le-developpement-des-villes-durables>
- ▶ **Directive nitrates - Chambres d'agriculture France** ([chambres-agriculture.fr](http://chambres-agriculture.fr))
- ▶ **Ecophyto PRO** : *réduire et améliorer l'utilisation des phytos* ([ecophyto-pro.fr](http://ecophyto-pro.fr))
- ▶ **Fascicule 35** : <https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/fascicule-35>
- ▶ **Fédération Française du Paysage** : [www.f-f-p.org](http://www.f-f-p.org)
- ▶ **Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières - FNPHP** : <https://fnphp.fr>
- ▶ **Guide de recommandations « Prescriptions techniques sur l'achat de végétaux sauvages et d'origine locale** : [https://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource\\_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf](https://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/guiderecoachatvegetauxsauvages.pdf)
- ▶ **Kit « Loi Santé » - Val'hor** : <https://www.valhor.fr/labels-outils/loi-sante>
- ▶ **Label, garantissant l'origine française de la production de végétaux** : [www.labelfleursdefrance.fr/accueil](http://www.labelfleursdefrance.fr/accueil)
- ▶ **Les mares comme facteur de dispersion du moustique tigre** : [https://www.pram-grandest.fr/medias/fichiers/mares\\_et\\_moustiques.pdf](https://www.pram-grandest.fr/medias/fichiers/mares_et_moustiques.pdf)
- ▶ **Marque Végétal local - Site ressources** : [www.vegetal-local.fr](http://www.vegetal-local.fr)
- ▶ **Méthode Indice de Qualité écologique et indice de potentialité écologique (IQE/IPE)** : [https://iqe-patrinat.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/GP2021\\_IQE\\_IPE.pdf](https://iqe-patrinat.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/GP2021_IQE_IPE.pdf)
- ▶ **Observatoire des espèces à enjeux pour la santé humaine** : <https://plantes-risque.info>
- ▶ **Plateforme ressources sur la prévention, la gestion et le suivi des espèces végétales exotiques envahissantes** : [www.invmed.fr](http://www.invmed.fr)
- ▶ **Règlementation / Arrêté du 4 septembre 2020 relatif à l'information préalable devant être délivrée aux acquéreurs de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2021** : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042325453/2021-04-01/>
- ▶ **Règles professionnelles - bonnes pratiques du secteur** : [www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/](http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/)
- ▶ **Règles professionnelles - éco-pâturage** : <https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/n-c-3-r0-travaux-deco-pastoralisme>
- ▶ **Réseau national de surveillance aérobiologique** : <https://www.pollens.fr>
- ▶ **Stockage de carbone** : [www.epa.gov/heatlands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands](http://www.epa.gov/heatlands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands)
- ▶ **Taille de formation** : <https://www.cnpf.fr/actualites/parution-la-taille-des-arbres-d-ornement>
- ▶ **Union nationale des entreprises du paysage - UNEP- Site ressources** : [www.lesentreprisesdupaysage.fr](http://www.lesentreprisesdupaysage.fr)
- ▶ **Valeur phytoécologique et biologique des ripisylves méditerranéennes** : Valeur phytoécologique et biologique des ripisylves méditerranéennes. - Notre bibliothèque - Forêt Méditerranéenne ([foret-mediterraneenne.org](http://foret-mediterraneenne.org))
- ▶ **Webinaires « plus de nature dans les cours d'écoles »** : <https://www.arbe-regionsud.org/23749-retour-sur-le-cycle-de-webinaires-de-nature-dans-nos-cours-decoles.html>
- ▶ **Zones humides** : <http://zones-humides.org>

## IV. GLOSSAIRE

- ▶ **Anthropisé** : se dit d'un milieu modifié par l'intervention humaine.
- ▶ **Archéophyte** : une espèce végétale archéophyte est une plante non originaire d'une région géographique, mais qui a été introduite dans des temps anciens, avant le XV<sup>e</sup> siècle.
- ▶ **Assec** : l'état d'une rivière ou d'un étang qui se retrouve sans eau.
- ▶ **Biocontrôle** : le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux basé sur l'utilisation de mécanismes naturels.
- ▶ **Bois raméal fragmenté** : le bois raméal fragmenté, ou bois raméaux fragmentés (BRF), est un mélange non composté de résidus de broyage (fragmentation) de rameaux de bois (branches), issu majoritairement d'arbres feuillus.
- ▶ **Caduc** : un arbuste ou un arbre caduc est un végétal perdant l'ensemble de son feuillage à l'automne.
- ▶ **Canopée** : correspond à l'étage supérieur de la forêt directement influencé par les rayonnements du soleil. Il comprend les couronnes de feuilles de l'ensemble des arbres d'un territoire et forme dans les environnements urbains ce que l'on nomme une forêt diffuse. Cette partie de l'arbre est en charge de la photosynthèse, elle absorbe et séquestre le gaz carbonique tout en produisant et diffusant de la vapeur d'eau. Ce processus bioclimatique est essentiel et participe au rafraîchissement de l'air.
- ▶ **Corridor écologique** : désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou une population.
- ▶ **Éléments abiotiques** : ils représentent l'ensemble des éléments physico-chimiques.
- ▶ **Engrais verts** : plantes cultivées pour améliorer la fertilité et la structure du sol et non pour être récoltées.
- ▶ **Environnement biotique** : ensemble des interactions du vivant sur le vivant dans un écosystème.
- ▶ **Espèce endémique** : espèce végétale propre à une région biogéographique donnée et ne se développant qu'en ce lieu précis du fait, par exemple, d'exigences écologiques particulières.
- ▶ **Espèce spontanée** : plante se développant et se reproduisant sans intervention humaine. Elle peut être indigène ou exotique.
- ▶ **Espèce Végétale Exotique Envahissante (EVEE)** : espèce végétale non indigène sur un territoire donné, dont l'introduction par l'Homme, volontaire ou fortuite, menace les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives. C'est une espèce qui s'est naturalisée et est capable de se propager rapidement au-delà de son lieu d'introduction. Les EVEE peuvent également être qualifiées d'« invasives », mais ils s'agit d'un anglicisme. Toutes les plantes exotiques ne se naturalisent pas systématiquement pour autant, pas plus qu'elles ne deviennent automatiquement envahissantes.
- ▶ **Espèce Exotique** : espèce implantée par l'Homme, volontairement ou accidentellement, à l'extérieur de son aire de distribution d'origine. C'est le contraire d'une plante indigène.
- ▶ **Horticole** : c'est une sélection végétale (espèce, hybride, cultivar etc.) développée par l'Homme pour ses valeurs ornementales, nourricières, thérapeutiques, etc. Elle ne pousse donc pas spontanément dans le territoire d'introduction considéré. Toutefois, une plante horticole peut avoir comme ancêtre une plante indigène dont on n'aurait conservé que certaines caractéristiques (couleur, nombre de pétales, odeur etc.) par sélection. *Rosa gallica*, par exemple, est un des ancêtres sauvages des rosiers cultivés contemporains. Associée à la demande des consommateurs, la production de plantes horticoles est désormais la plus abondante, ce qui favorise leur utilisation sur notre territoire. Certaines ont fait la réputation et constituent désormais l'identité de nombreux paysages urbains et péri-urbains de la Côte d'Azur par exemple.
- ▶ **Hotspot** : la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est un haut lieu de biodiversité. C'est la première des régions métropolitaines en nombre d'espèces. On y retrouve les 2/3 des espèces végétales recensées en France métropolitaine, 1/3 des espèces d'insectes, 94 % des chauves-souris et 85 % des oiseaux nicheurs (Regard sur la Nature 2021, ARBE Provence-Alpes-Côte d'Azur)
- ▶ **Îlot de chaleur urbain** : élévation localisée des températures, particulièrement des températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain.
- ▶ **Indigène** : une espèce est définie comme indigène à une région donnée si sa présence dans cette région est le résultat de processus naturels sans intervention humaine. Une espèce végétale indigène de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est donc une espèce qui n'a été ni transplantée ni importée par l'Homme. Les plantes endémiques font partie des plantes indigènes.
- ▶ **Intraspécifique** : qui existe à l'intérieur d'une même espèce.
- ▶ **Mono-spécifique** : qui ne comprend qu'une seule espèce.
- ▶ **Naturalisée** : espèce végétale introduite rencontrant des conditions écologiques favorables à son implantation durable dans le temps.
- ▶ **Pédologie** : la science étudiant la formation et l'évolution des sols.
- ▶ **Phrygane** : formation composée de petits buissons épineux qui ont adopté différentes techniques afin de se protéger des rayons du soleil. C'est l'habitat phare du projet LIFE Habitats Calanques où l'astragale de Marseille (*Astragalus tragacantha*), le plantain subulé (*Plantago subulata*) et la thymélée tartonraire (*Thymelea tartonrea*) sont les trois espèces structurantes. Elles sont pourtant en déclin car elles subissent, en plus des conditions environnementales extrêmes, de fortes pressions anthropiques.
- ▶ **Réservoir de biodiversité** : espace dans lequel la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou une partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante.
- ▶ **Rudéral** : qui pousse sur les décombres, les tas d'ordures et généralement aux abords des habitations et sur les voies de circulation du fait de la richesse de ces lieux en azote.
- ▶ **Saproxylique** : une espèce dite saproxylique réalise tout ou partie de son cycle de vie dans le bois en décomposition,



ou les produits de cette décomposition.

► **Strate muscinale** : strate de végétation composée de mousses et de lichens.

► **Symbiose** : association étroite de deux ou plusieurs organismes différents, mutuellement bénéfiques, voire indispensables à leur survie.

► **Syrphe** : type de mouche aux couleurs vives rappelant celles de l'abeille ou de la guêpe.

► **Taxon** : ensemble d'êtres vivants partageant certaines caractéristiques, à partir desquelles est établie leur classification.

► **Trame verte et bleue (TVB)** : mesure phare du Grenelle de l'Environnement qui porte l'ambition d'enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Cet outil d'aménagement du territoire vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, qui permette aux espèces animales et végétales, de circuler, de s'alimenter, de se reproduire, de se reposer etc. En d'autres termes, d'assurer leur survie et de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre leurs services à l'Homme. La Trame verte et bleue est ainsi constituée de réservoirs de biodiversité et de corridors qui les relient entre eux. Depuis le Grenelle de l'Environnement, d'autres concepts s'ajoutent à la notion de TVB, notamment la

trame noire, turquoise.

► **Trame turquoise** correspond aux espaces où la trame verte et la trame bleue interagissent très fortement par exemple la végétation qui borde les milieux aquatiques. Elle constitue un corridor écologique propice à la circulation des espèces.

► **Ubiquiste** : une espèce est qualifiée d'ubiquiste lorsqu'elle se maintient dans plusieurs biotopes tout en occupant des niches écologiques variées, éventuellement avec une distribution géographique étendue.

► **Végétal local** : marque créée par l'Office français de la biodiversité (OFB), et plus spécifiquement un outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux.

► **Végétation hygrophile** : plante qui préfère ou exige des milieux humides pour se développer.





PARTIE 4

.....  
**INDEX**



CBNIMed - ANDRIEU Frédéric



# I. INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

<i>Abies alba</i> Mill., 1768	68	<i>Cornus mas</i> L., 1753	56
<i>Acer campestre</i> L., 1753	51	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	56
<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	51	<i>Coronilla juncea</i> L., 1753	76
<i>Acer opalus</i> Mill., 1768	51	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L., 1756	69, 104
<i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i> Mill., 1768	51	<i>Coronilla varia</i> L., 1753	82
<i>Acer platanoides</i> L., 1753	51	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	56
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	51	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay ex Guss., 1844	98
<i>Achillea collina</i> (Becker ex Wirtg.) Helmerl., 1883	103	<i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771	56
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	77	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	56
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871	69	<i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753	108
<i>Aegonychon purpuracaeruleum</i> (L.) Holub, 1973	69	<i>Cruciatia laevipes</i> Opiz, 1852	69, 104
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	78	<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	98
<i>Agrostemma githago</i> L., 1753	97	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	104
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	103, 121	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768	104
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	69, 103	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	104
<i>Alcea rosea</i> L., 1753	108	<i>Cyperus longus</i>	120
<i>Alchemilla alpigena</i> Buser, 1894	78	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843	56
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	62	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	104
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	115	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman, 1882	82
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	115	<i>Daphne gnidium</i> L., 1753	61
<i>Allyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	108	<i>Daucus carota</i> L., 1753	82
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	55	<i>Delphinium consolida</i> L., 1753	98
<i>Anthraxanthum odoratum</i> L., 1753	78	<i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	104
<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	103	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817	104
<i>Anthyllis montana</i> L., 1753	78	<i>Dianthus godronianus</i> Jord., 1855	104
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kit.) Asch. & Craebn., 1908	78	<i>Dianthus saxicola</i> Jord., 1852	83
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> Arcang., 1882	97	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	63
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L., 1753	78	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	83
<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	62	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	83
<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	55	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	69, 104
<i>Arcostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825	68, 103	<i>Echinops ritro</i> L., 1753	104
<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968	79	<i>Echinops vulgare</i> L., 1753	83
<i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem., 1847	51	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	120
<i>Aristolochia pistolochia</i> L., 1763	96	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	63
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	103	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	67
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presi & C.Presi, 1819	103	<i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>dodonaei</i> Vill., 1779	104
<i>Artemisia absinthium</i> L., 1753	103	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	117
<i>Artemisia alba</i> Turra, 1764	103	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	121
<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	79	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	107
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> L., 1753	103	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	70
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>glutinosa</i> (J.Gay ex Besser) Batt., 1889	103	<i>Erica arborea</i> L., 1753	57
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	79	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	121
<i>Aster alpinus</i> L., 1753	79	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	57
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	62	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill., 1768	57
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	62	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	117
<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812	62	<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753	69
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	103	<i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i> L., 1753	83
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	69, 103	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	103
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	97	<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Murr, 1923	69
<i>Bifora radicans</i> M.Bieb., 1819	97	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	99
<i>Biscutella lima</i> Rechb., 1832	79	<i>Euphorbia nicaeensis</i> All., 1785	104
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981	103	<i>Euphorbia seguieriana</i> subsp. <i>seguieriana</i> Neck., 1770	104
<i>Bitum bonus-henricus</i> (L.) Rechb., 1832	97	<i>Euphorbia serrata</i> L., 1753	107
<i>Borago officinalis</i> L., 1753	80	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	52
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	103	<i>Festuca cinerea</i> Vill., 1786	104
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv., 1812	108	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	69
<i>Brachypodium phebicoideis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	80	<i>Festuca inops</i> De Not., 1844	104
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv., 1812	80	<i>Festuca laevigata</i> Gaudin, 1808	84
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	80	<i>Festuca marginata</i> subsp. <i>marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	84
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	62	<i>Festuca violacea</i> Schlecht. ex Gaudin, 1808	84
<i>Briza maxima</i> L., 1753	108	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	69, 104
<i>Briza media</i> L., 1753	80	<i>Ficus carica</i> L., 1753	68
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	80	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	117
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	108	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	104
<i>Bromus squarrosus</i> L., 1753	108	<i>Foeniculum vulgare</i> susp. <i>vulgare</i> Mill., 1768	104
<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	55	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	69
<i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schrad.) Host, 1809	69	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	115
<i>Calendula arvensis</i> L., 1763	97	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	52
<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	103	<i>Gaietella sedifolia</i> subsp. <i>sedifolia</i> (L.) Greuter, 2003	104
<i>Campanula medium</i> L., 1753	69, 103	<i>Galium album</i> Mill., 1768	84
<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	69	<i>Galium aristatum</i> L., 1762	69
<i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753	62	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	84
<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	103	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	70
<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	81	<i>Galium palustre</i> L., 1753	121
<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	63	<i>Galium verum</i> L., 1753	84
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	98	<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> L., 1753	68, 103
<i>Carex acutiformis</i>	120	<i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> L., 1753	68, 103
<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr., 1785	81	<i>Genista lutea</i> L., 1753	85
<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	121	<i>Centianella campestris</i> (L.) Börner, 1912	108
<i>Carex distans</i> L., 1759	121	<i>Ceranium nodosum</i> L., 1753	69
<i>Carex elata</i>	116	<i>Ceranium sanguineum</i> L., 1753	69, 104
<i>Carex extensa</i>	121	<i>Ceum urbanum</i> L., 1753	63
<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	103	<i>Cladifolus italicus</i> Mill., 1768	107
<i>Carex hirta</i> L., 1753	81	<i>Globularia alypum</i> L., 1753	76
<i>Carex humilis</i> Leys., 1758	69, 103	<i>Globularia bisnegaria</i> L., 1753	104
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	121	<i>Globularia cordifolia</i> L., 1753	104
<i>Carex otrubae</i>	121	<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	121
<i>Carex panicea</i> L., 1753	121	<i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753	85
<i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i> L., 1755	69, 116	<i>Cypripedium calceolus</i> (L.) Sm., 1809	99
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	116	<i>Hedera helix</i> L., 1753	61
<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	70, 103	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	85
<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	108	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	85
<i>Carum carvi</i> L., 1753	81	<i>Helianthemum oelandicum</i> var. <i>italicum</i> (L.) DC., 1813	104
<i>Catananche caerulea</i> L., 1753	104	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	85
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	108	<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg., 1938	105
<i>Caucalis platycarpus</i> L., 1753	108	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	63
<i>Celtis australis</i> L., 1753	52	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	121
<i>Centaurea aspera</i> L., 1753	104	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	85
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	81	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	64
<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> L., 1753	81	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	57
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	104	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	86
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufur., 1811	108	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	108
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	82	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang., 1882	108
<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818	82	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	69, 121
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> Gaudin, 1828	82	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	86
<i>Cerintho minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Rouy, 1927	104	<i>Hypericum tetrapetrum</i> Fr., 1823	105
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	104	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	86
<i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762	104	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	86
<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	104	<i>Iberis pinnata</i> L., 1755	99
<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	98	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	52
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	98	<i>Inula montana</i> L., 1753	86
<i>Cistus albidus</i> L., 1753	55	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	120
<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	96	<i>Isatis tinctoria</i> L., 1753	86
<i>Cistus salvifolius</i> L., 1753	76	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	105
<i>Cladium mariscus</i>	117	<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsler & Meijden, 2005	105
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kluntze, 1891	69, 104	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	87
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	63	<i>Jasione montana</i> L., 1753	108
<i>Coris monspeliensis</i> L., 1753	104	<i>Jasminum fruticans</i> L., 1753	76
<i>Cornus domestica</i> (L.) Spach, 1834	52		

<i>Juncus acutus</i> .....	117
<i>Juncus articulatus</i> L., 1753 .....	122
<i>Juncus effusus</i> L., 1753 .....	118
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753 .....	118
<i>Juncus maritimus</i> .....	122
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 .....	76
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme, 1868 .....	68
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i> L., 1753 .....	61
<i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>phoenicea</i> L., 1753 .....	76
<i>Juniperus sabina</i> L., 1753 .....	68, 103
<i>Knaulia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 .....	64
<i>Knaulia collina</i> Heynh., 1840 .....	105
<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 .....	87
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 .....	68
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 .....	53
<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753 .....	108
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763 .....	69, 105
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753 .....	108
<i>Larix decidua</i> Mill., 1768 .....	53
<i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753 .....	87
<i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753 .....	87
<i>Laserpitium siler</i> L., 1753 .....	105
<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753 .....	105
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 .....	96
<i>Laurus nobilis</i> L., 1753 .....	53
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill., 1768 .....	64
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> Mill., 1768 .....	69, 105
<i>Lavandula stoechas</i> L., 1753 .....	105
<i>Legousia speculum-veneris</i> subsp. <i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 .....	99
<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 .....	87
<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753 .....	87
<i>Leucanthemum adustum</i> (W.D.J.Koch) Gremli, 1898 .....	88
<i>Leucanthemum irtutianum</i> DC., 1838 .....	88
<i>Leucanthemum pallens</i> (J.Gay ex Perrey.) DC., 1838 .....	105
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 .....	57
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 .....	105
<i>Linum campanulatum</i> L., 1753 .....	88
<i>Linum narbonense</i> L., 1753 .....	105
<i>Linum strictum</i> L., 1753 .....	108
<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 .....	105
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912 .....	99
<i>Lolium perenne</i> L., 1753 .....	88
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811 .....	99
<i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> Gaudin, 1811 .....	108
<i>Loncomelos narbonense</i> (L.) Raf., 1840 .....	107
<i>Lonicera alpigena</i> L., 1753 .....	68
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795 .....	61
<i>Lonicera implexa</i> Aiton, 1789 .....	61
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 .....	57
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i> (DC.) Rothm., 1963 .....	105
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 .....	105
<i>Lotus cytoides</i> L., 1753 .....	105
<i>Lotus dorycnium</i> L., 1753 .....	88
<i>Lotus hirsutus</i> L., 1753 .....	88
<i>Lotus maritimus</i> L., 1753 .....	89
<i>Lunaria annua</i> L., 1753 .....	69
<i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753 .....	108
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 .....	105
<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt., 1890 .....	64
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 .....	118
<i>Lysimachia vulgaris</i> .....	118
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 .....	118
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768 .....	53
<i>Malva alcea</i> L., 1753 .....	105
<i>Malva setigera</i> Spenn., 1829 .....	108
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753 .....	89
<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753 .....	105
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753 .....	108
<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 .....	100
<i>Melica amethystina</i> Pourr., 1788 .....	105
<i>Melica ciliata</i> L., 1753 .....	89
<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i> L., 1753 .....	105
<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>magnoliifolia</i> (Godr. & Gren.) K.Richt., 1890 .....	105
<i>Melica nutans</i> L., 1753 .....	69
<i>Meibomia albus</i> Medik., 1787 .....	89
<i>Meibomia officinalis</i> (L.) Lam., 1779 .....	89
<i>Melissa officinalis</i> L., 1753 .....	64
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753 .....	118
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762 .....	119
<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792 .....	105, 121
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb., 1842 .....	105
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank, 1789 .....	119
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 .....	119
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 .....	107
<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt, 1794 .....	89
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 .....	100
<i>Myosotis decumbens</i> Host, 1827 .....	64
<i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>decumbens</i> Host, 1827 .....	105
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824 .....	69, 103, 121
<i>Myrtus communis</i> L., 1753 .....	58
<i>Nardus stricta</i> L., 1753 .....	90
<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 .....	121
<i>Nepeta nepetella</i> L., 1759 .....	105
<i>Nigella damascena</i> L., 1753 .....	100
<i>Olea europaea</i> L., 1753 .....	90
<i>Oleoptum millicecum</i> (L.) Röser & Hamasha, 2012 .....	90
<i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC., 1805 .....	105
<i>Ononis fruticosa</i> L., 1753 .....	58
<i>Ononis natrix</i> L., 1753 .....	90
<i>Ononis rotundifolia</i> L., 1753 .....	70, 105
<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753 .....	105
<i>Origanum grandiflorum</i> (L.) Hoffm., 1814 .....	100
<i>Pallenis maritima</i> (L.) Creuter, 1997 .....	105
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 .....	100
<i>Parnassia palustris</i> L., 1753 .....	121
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753 .....	90
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 .....	100
<i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> (L.) Link, 1829 .....	105
<i>Petroselinum ochroleucum</i> (Chaix) Niederle, 2014 .....	105
<i>Petroselinum sediforme</i> (Jacq.) Grulich, 1984 .....	90
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 .....	119
<i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753 .....	58
<i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753 .....	53
<i>Phleum nodosum</i> L., 1759 .....	106
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 .....	90
<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753 .....	119
<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 188 .....	61
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 .....	98
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762 .....	70, 106

<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753 .....	106
<i>Pinus halepensis</i> Mill., 1768 .....	68
<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin, 1936 .....	53
<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 .....	68
<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 .....	68
<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753 .....	58
<i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753 .....	58
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 .....	91
<i>Plantago major</i> L., 1753 .....	91
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753 .....	106
<i>Plantago media</i> L., 1753 .....	91
<i>Plantago sempervirens</i> Crantz, 1766 .....	77
<i>Poa annua</i> L., 1753 .....	101
<i>Poa alpina</i> L., 1753 .....	91
<i>Poa compressa</i> L., 1753 .....	65
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753 .....	70, 106
<i>Poa pratensis</i> L., 1753 .....	106
<i>Poa trivialis</i> L., 1753 .....	106
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 .....	70
<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 .....	69
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799 .....	70
<i>Populus nigra</i> subsp. <i>neapolitana</i> (Ten.) Maire, 1932 .....	68
<i>Populus tremula</i> L., 1753 .....	68
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797 .....	121
<i>Potentilla recta</i> L., 1753 .....	106
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753 .....	106
<i>Potentilla verna</i> L., 1753 .....	91
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 .....	92
<i>Primula veris</i> L., 1753 .....	70
<i>Primula veris</i> var. <i>columnnae</i> (Ten.) B.Bock, 2012 .....	106
<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762 .....	70, 106
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler, 1775 .....	106
<i>Prunella hyssopifolia</i> L., 1753 .....	106
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 .....	106
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 .....	92
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 .....	54
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 .....	58
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753 .....	59
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 .....	107
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 .....	121
<i>Pyrus spinosa</i> Forsk., 1775 .....	59
<i>Quercus coccifera</i> L., 1753 .....	59
<i>Quercus ilex</i> L., 1753 .....	54
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 .....	54
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753 .....	92
<i>Ranunculus aduncus</i> Gren., 1847 .....	70, 106
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753 .....	108
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 .....	97
<i>Reseda lutea</i> L., 1753 .....	101
<i>Reseda phyteuma</i> L., 1753 .....	108
<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753 .....	59
<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753 .....	68
<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 .....	59
<i>Rhus coriaria</i> L., 1753 .....	60
<i>Ribes alpinum</i> L., 1753 .....	60
<i>Ribes petraeum</i> Wulfen, 1781 .....	68
<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 .....	60
<i>Rosa canina</i> L., 1753 .....	77
<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753 .....	68
<i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753 .....	60
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971 .....	108
<i>Rumex acetosella</i> L., 1753 .....	92
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 .....	121
<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 .....	70, 106
<i>Salix alba</i> L., 1753 .....	68, 115
<i>Salix caprea</i> L., 1753 .....	54
<i>Salix cinerea</i> L., 1753 .....	115
<i>Salix daphnoides</i> .....	115
<i>Salix eleagnos</i> .....	60
<i>Salix eleagnos</i> Scop., 1772 .....	116
<i>Salix purpurea</i> L., 1753 .....	116
<i>Salix triandra</i> .....	116
<i>Salvia pratensis</i> L., 1753 .....	92
<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753 .....	106
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753 .....	54
<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 .....	60
<i>Saponaria acymoides</i> subsp. <i>acymoides</i> L., 1753 .....	70, 106
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753 .....	65
<i>Satureja montana</i> L., 1753 .....	77
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L., 1753 .....	106
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753 .....	92
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 .....	93
<i>Scabiosa lucida</i> Vill., 1779 .....	65
<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 .....	70, 106
<i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 .....	70, 106
<i>Scorzoneroideae autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 .....	93
<i>Sedum acre</i> L., 1753 .....	93
<i>Sedum album</i> L., 1753 .....	93
<i>Sempervivum tectorum</i> L., 1753 .....	93
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 .....	65
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 .....	65
<i>Silene gallica</i> L., 1753 .....	108
<i>Silene italica</i> subsp. <i>italica</i> (L.) Pers., 1805 .....	93
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 .....	94
<i>Silene nutans</i> L., 1753 .....	65
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 .....	94
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 .....	66
<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 .....	66
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> (L.) Arcang., 1882 .....	70
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L., 1753 .....	68
<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753 .....	66
<i>Stachys recta</i> L., 1767 .....	77
<i>Stachys rubra</i> L., 1753 .....	77
<i>Stipa offneri</i> Breistr., 1950 .....	106
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 .....	70, 106
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 .....	94
<i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>flavum</i> L., 1753 .....	106
<i>Teucrium montanum</i> L., 1753 .....	106
<i>Teucrium polium</i> L., 1753 .....	94
<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> L., 1753 .....	106
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753 .....	94
<i>Thymus vulgaris</i> L., 1753 .....	94
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 .....	54
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753 .....	108
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 .....	108
<i>Tragopogon crocifolius</i> L., 1759 .....	106
<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772 .....	106
<i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 .....	106
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) ?elak., 1871 .....	95

## I. INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

<i>Trifolium alpestre</i> L., 1763	106	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	68, 103
<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	101	<i>Valeriana montana</i> L., 1753	66
<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	101	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	95
<i>Trifolium aureum</i> Pollich, 1777	67	<i>Valeriana tuberosa</i> L., 1753	107
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	101	<i>Verbascum chaixii</i> Vill., 1779	70
<i>Trifolium cherleri</i> L., 1755	108	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	66
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	106	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	96
<i>Trifolium hybridum</i> L., 1753	106	<i>Verben officinalis</i> L., 1753	96
<i>Trifolium medium</i> L., 1759	95	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	122
<i>Trifolium montanum</i> L., 1753	95	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	121
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	106	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	107
<i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i>	106	<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	102
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	107	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	66
<i>Trifolium stellatum</i> L., 1753	101	<i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830	107
<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	108	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	60
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	102	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	61
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	95	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	67
<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	95	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	67
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	108	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	67
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	119	<i>Vinca major</i> L., 1753	70
<i>Ulex parviflorus</i> Pourr., 1788	77	<i>Vinca minor</i> L., 1753	70
<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	55	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill., 1768	102
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	55	<i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016	96
<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	107		
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795	108		





## II. INDEX DES NOMS COMMUNS

Absinthe, <i>Artemisia absinthium</i> L, 1753.....	103
Acéraille, <i>Acer campestre</i> L, 1753.....	51
Ache à fleurs nodales, <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L) W.D.J.Koch, 1824.....	121
Ache faux cresson, <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L) W.D.J.Koch, 1824.....	121
Ache nodiflore, <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L) W.D.J.Koch, 1824.....	121
Ache noueuse, <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L) W.D.J.Koch, 1824.....	121
Achillée des collines, <i>Achillea collina</i> (Becker ex Wirtg.) Heimerl, 1883.....	103
Achillée millefeuille, <i>Achillea millefolium</i> L, 1753.....	77
Acinos des Pyrénées, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016.....	96
Acinos méridional, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016.....	96
Adénostyle à feuilles d'alliaire, <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern, 1871.....	69
Adénostyle à têtes blanches, <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern, 1871.....	69
Adénostyle alliaire, <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern, 1871.....	69
Agas, <i>Acer monspessulanum</i> L, 1753.....	51
Agrostide stolonifère, <i>Agrastis stolonifera</i> L, 1753.....	103 121
Agrostis stolonifère, <i>Agrastis stolonifera</i> L, 1753.....	103 121
Aigremoine eupatoire, <i>Agrimonia eupatoria</i> L, 1753.....	78
Airelle myrtille, <i>Vaccinium myrtillus</i> L, 1753.....	68, 103
Ajonc à petites fleurs, <i>Ulex parviflorus</i> Pourr, 1788.....	77
Ajonc de Provence, <i>Ulex parviflorus</i> Pourr, 1788.....	77
Alaterne, <i>Rhamnus alaternus</i> L, 1753.....	59
Alavert à feuilles étroites, <i>Phillyrea angustifolia</i> L, 1753.....	58
Alavert à feuilles larges, <i>Phillyrea latifolia</i> L, 1753.....	53
Alcée rose, <i>Alcea rosea</i> L, 1753.....	108
Alchémille alpine, <i>Alchemilla alpigena</i> Buser, 1894.....	78
Alchémille plissée, <i>Alchemilla alpigena</i> Buser, 1894.....	78
Alisier blanc, <i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem, 1847.....	51
Alisier de Bourgogne, <i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem, 1847.....	51
Alliaire, <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913.....	62
Alliaire officielle, <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913.....	62
Alliaire pétiolée, <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913.....	62
Alouchier, <i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem, 1847.....	51
Alpiste roseau, <i>Phalaris arundinacea</i> L, 1753.....	119
Alsine changeante, <i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb, 1842.....	105
Alysson à calice persistant, <i>Alyssum alyssoides</i> (L) L, 1759.....	108
Alysson faux alysson, <i>Alyssum alyssoides</i> (L) L, 1759.....	58
Amarel, <i>Prunus mahaleb</i> L, 1753.....	81
Ambrette, <i>Centaurea jacea</i> L, 1753.....	81
Ambrette, <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> L, 1753.....	81
Amélanancier à feuilles ovales, <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793.....	55
Amélanancier commun, <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793.....	55
Amélanancier ovale, <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793.....	55
Amourette, <i>Briza media</i> L, 1753.....	80
Amourette commune, <i>Briza media</i> L, 1753.....	80
Ancolie commune, <i>Aquilegia vulgaris</i> L, 1753.....	62
Ancolie vulgaire, <i>Aquilegia vulgaris</i> L, 1753.....	62
Anis des Vosges, <i>Carum carvi</i> L, 1753.....	81
Anthémide des teinturiers, <i>Cota tinctoria</i> (L) J.Gay ex Guss, 1844.....	98
Anthriscus sylvestre, <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L) Hoffm., 1814.....	103
Anthyllide à fleurs rouges, <i>Anthyllus vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> Arcang., 1882.....	78
Anthyllide alpestre, <i>Anthyllus vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kit) Asch. & Graebn, 1908.....	78
Anthyllide des montagnes, <i>Anthyllus montana</i> L, 1753.....	78
Anthyllide hâtive, <i>Anthyllus vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> Arcang., 1882.....	78
Anthyllis à fleurs rouges, <i>Anthyllus vulneraria</i> subsp. <i>rubriflora</i> Arcang., 1882.....	78
Aphyllanthe de Montpellier, <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L, 1753.....	78
Arbousier commun, <i>Arbutus unedo</i> L, 1753.....	55
Arbousier traînant, <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L) Spreng, 1825.....	68, 103
Arbre à perruque, <i>Cotinus coggygia</i> Scop., 1771.....	56
Arbre au mastic, <i>Pistacia lentiscus</i> L, 1753.....	58
Arbre aux fraises, <i>Arbutus unedo</i> L, 1753.....	58
Argyrolobe de Linné, <i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968.....	79
Argyrolobe de Zanon, <i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968.....	79
Aristolochie pistoloche, <i>Aristolochia pistolochea</i> L, 1763.....	96
Armérie des sables, <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820.....	103
Armérie faux plantain, <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820.....	103
Armoise absinthe, <i>Artemisia absinthium</i> L, 1753.....	103
Armoise blanche, <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764.....	103
Armoise camphrée, <i>Artemisia alba</i> Turra, 1764.....	103
Armoise champêtre, <i>Artemisia campestris</i> L, 1753.....	79
Armoise champêtre, <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> L, 1753.....	103
Armoise commune, <i>Artemisia vulgaris</i> L, 1753.....	79
Armoise glutineuse, <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>glutinosa</i> (J.Gay ex Besser) Batt., 1889.....	103
Armoise poisseuse, <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>glutinosa</i> (J.Gay ex Besser) Batt., 1889.....	103
Armoise rouge, <i>Artemisia campestris</i> L, 1753.....	79
Armoise rouge, <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> L, 1753.....	103
Aserau, <i>Acer platanoides</i> L, 1753.....	51
Aspérule odorante, <i>Galium odoratum</i> (L) Scop., 1771.....	70
Aster à feuilles d'orpin, <i>Galatella sedifolia</i> subsp. <i>sedifolia</i> (L) Greuter, 2003.....	104
Aster âcre, <i>Galatella sedifolia</i> subsp. <i>sedifolia</i> (L) Greuter, 2003.....	104
Aster des Alpes, <i>Aster alpinus</i> L, 1753.....	79
Astéroïde maritime, <i>Pallenia maritima</i> (L) Greuter, 1997.....	105
Aubépine à un style, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775.....	56
Aubépine monogyne, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775.....	56
Aubour, <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787.....	53
Aubour des Alpes, <i>Laburnum alpinum</i> (Mill) Bercht. & J.Presl, 1835.....	68
Aubour faux ébénier, <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787.....	53
Aulne blanc, <i>Alnus incana</i> (L) Moench, 1794.....	115
Aulne bianchâtre, <i>Alnus incana</i> (L) Moench, 1794.....	115
Aulne bianchi, <i>Alnus incana</i> (L) Moench, 1794.....	115
Aulne des montagnes, <i>Alnus incana</i> (L) Moench, 1794.....	115
Aulne glutineux, <i>Alnus glutinosa</i> (L) Gaertn., 1790.....	115
Aurone des champs, <i>Artemisia campestris</i> L, 1753.....	79
Aurone des champs, <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> L, 1753.....	103
Avelinier, <i>Corylus avellana</i> L, 1753.....	56
Avénelle flexueuse, <i>Avenella flexuosa</i> (L) Drejer, 1838.....	62
Avénelle pubescente, <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868.....	79
avoine dorée, <i>Trisetum flavescens</i> (L) P.Beauv., 1812.....	95
avoine dorée, <i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L) P.Beauv., 1812.....	95
avoine élevée, <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819.....	103
avoine jaunâtre, <i>Trisetum flavescens</i> (L) P.Beauv., 1812.....	95
avoine jaunâtre, <i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L) P.Beauv., 1812.....	95
avoine pubescente, <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868.....	79
avoine sempervirente, <i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg., 1938.....	105
avoine toujours verte, <i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg., 1938.....	105
Azerou, <i>Acer monspessulanum</i> L, 1753.....	51
Badasse, <i>Lotus corniculatus</i> L, 1753.....	88
Baldingère faux roseau, <i>Phalaris arundinacea</i> L, 1753.....	119
Barbarea commune, <i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812.....	62
Barbe-de-capucin, <i>Cichorium intybus</i> L, 1753.....	98
Barbeau, <i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762.....	98
Barbon digité, <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L) Keng, 1936.....	103
Barbon pied-de-poule, <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L) Keng, 1936.....	103
Bâton-de-Jacob, <i>Campanula persicifolia</i> L, 1753.....	69
Baume d'eau, <i>Mentha aquatica</i> L, 1753.....	118
Baume de rivière, <i>Mentha aquatica</i> L, 1753.....	118
Belle-étoile, <i>Galium odoratum</i> (L) Scop., 1771.....	70
Benoîte commune, <i>Ceum urbanum</i> L, 1753.....	63
Benoîte des villes, <i>Ceum urbanum</i> L, 1753.....	63
Berce commune, <i>Heracleum sphondylium</i> L, 1753.....	85
Berce sphondyle, <i>Heracleum sphondylium</i> L, 1753.....	85
Bétoine officielle, <i>Betonica officinalis</i> L, 1753.....	69, 103
Bifora rayonnant, <i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819.....	97
Bifore rayonnant, <i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819.....	97
Biscutella lime, <i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832.....	103
Bitumineuse, <i>Bituminaria bituminosa</i> (L) C.H.Stirt., 1981.....	79
Blanchard, <i>Holcus lanatus</i> L, 1753.....	86
Blette bon Henri, <i>Bilium bonus-henricus</i> (L) Rchb., 1832.....	80
Bleuet, <i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762.....	98
Bleuet des moissons, <i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762.....	98
Bois béni, <i>Buxus sempervirens</i> L, 1753.....	55
Bois de mai, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775.....	56
Bois de Sainte-Lucie, <i>Prunus mahaleb</i> L, 1753.....	58
BonHomme de rivière, <i>Mentha aquatica</i> L, 1753.....	118
Bonjeanie hérissée, <i>Lotus hirsutus</i> L, 1753.....	88
Bonnet-d'évêque, <i>Euonymus europaeus</i> L, 1753.....	57
Boquetier, <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768.....	53
Bothriochloa ischème, <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L) Keng, 1936.....	103
Bothriochloa pied-de-poule, <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L) Keng, 1936.....	103
Boucade élevée, <i>Pimpinella major</i> (L) Huds., 1762.....	70, 106
Boucade saxifrage, <i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L, 1753.....	106
Bouillon femelle, <i>Verbascum lynchitis</i> L, 1753.....	66
Bouillon-blanc, <i>Verbascum thapsus</i> L, 1753.....	96
Boulard, <i>Betula pendula</i> Roth, 1788.....	52
Bouleau pleureur, <i>Betula pendula</i> Roth, 1788.....	52
Bouleau verruqueux, <i>Betula pendula</i> Roth, 1788.....	52
Bourcane officielle, <i>Borago officinalis</i> L, 1753.....	97
Bourse-à-pasteur, <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L) Medik., 1792.....	98
Bourse-de-capucin, <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L) Medik., 1792.....	98
Bouton d'or, <i>Ranunculus acris</i> L, 1753.....	92
Bouton-d'or bulbeux, <i>Ranunculus bulbosus</i> L, 1753.....	97
Brachypode à deux épis, <i>Brachypodium distachyon</i> (L) P.Beauv., 1812.....	108
Brachypode à deux épis, <i>Brachypodium distachyon</i> (L) P.Beauv., 1812.....	108
Brachypode des bois, <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812.....	62
Brachypode des forêts, <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812.....	62
Brachypode des rochers, <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817.....	80
Brachypode fausse ivraie, <i>Brachypodium phoenicoides</i> (L) Roem. & Schult., 1817.....	80
Brachypode rameux, <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv., 1812.....	80
Brachypode rupestre, <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817.....	80
Brachypode tronqué, <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv., 1812.....	80
Bragalou, <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L, 1753.....	78
Brèrelle, <i>Primula veris</i> L, 1753.....	70
Brimbelle, <i>Vaccinium myrtillus</i> L, 1753.....	68, 103
Brize élevée, <i>Briza maxima</i> L, 1753.....	108
Brize intermédiaire, <i>Briza media</i> L, 1753.....	80
Brome des bois, <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812.....	62
Brome dressé, <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869.....	80
Brome érigé, <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869.....	80
Brome mou, <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L, 1753.....	108
Brome orge, <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L, 1753.....	108
Brome raboteux, <i>Bromus squarrosus</i> L, 1753.....	108
Brome squarveux, <i>Bromus squarrosus</i> L, 1753.....	108
Brunelle à feuilles d'hysope, <i>Prunella hyssopifolia</i> L, 1753.....	106
Brunelle à grandes fleurs, <i>Prunella grandiflora</i> (L) Scholler, 1775.....	106
Brunelle blanche, <i>Prunella laciniata</i> (L) L, 1763.....	106
Brunelle commune, <i>Prunella vulgaris</i> L, 1753.....	92
Brunelle laciniée, <i>Prunella laciniata</i> (L) L, 1763.....	106
Bruyère arborescente, <i>Erica arborea</i> L, 1753.....	57
Bruyère arborescente, <i>Erica arborea</i> L, 1753.....	57
Bruyère en arbre, <i>Erica arborea</i> L, 1753.....	57
Bugle rampante, <i>Ajuga reptans</i> L, 1753.....	69, 103
Bugrane à feuilles rondes, <i>Ononis rotundifolia</i> L, 1753.....	70, 105
Bugrane à grandes fleurs, <i>Ononis rotundifolia</i> L, 1753.....	70, 105
Bugrane buissonnante, <i>Ononis fruticosa</i> L, 1753.....	58
Bugrane fétide, <i>Ononis natrix</i> L, 1753.....	90
Bugrane gluante, <i>Ononis natrix</i> L, 1753.....	90
Bugrane ligneuse, <i>Ononis fruticosa</i> L, 1753.....	55
Buis commun, <i>Buxus sempervirens</i> L, 1753.....	55
Buis piquant, <i>Ruscus aculeatus</i> L, 1753.....	70, 106
Buis sempervirent, <i>Buxus sempervirens</i> L, 1753.....	55
Buis toujours vert, <i>Buxus sempervirens</i> L, 1753.....	55
Busserole raisin-d'ours, <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L) Spreng, 1825.....	68, 103
Cabaret des oiseaux, <i>Dipsacus fullonum</i> L, 1753.....	83
Caclie à feuilles d'alliaire, <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern, 1871.....	69
Caillie-lait blanc, <i>Galium mollugo</i> L, 1753.....	84
Caillie-lait jaune, <i>Galium verum</i> L, 1753.....	84
Calamagrostide bigarrée, <i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schrad.) Host, 1809.....	69
Calamagrostide des montagnes, <i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schrad.) Host, 1809.....	69
Calamagrostide variée, <i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schrad.) Host, 1809.....	69
Calamagrostis varié, <i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i> (Schrad.) Host, 1809.....	69
Calament clinopode, <i>Clinopodium vulgare</i> L, 1753.....	63
Calament des Pyrénées, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016.....	96
Calament du Midi, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016.....	96
Calament méridional, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016.....	96
Calament népète, <i>Clinopodium nepeta</i> (L) Kuntze, 1891.....	69, 104
Camérisier à baies, <i>Lonicera xylosteum</i> L, 1753.....	57
Camérisier des haies, <i>Lonicera xylosteum</i> L, 1753.....	57
Camomille des teinturiers, <i>Cota tinctoria</i> (L) J.Gay ex Guss, 1844.....	98
Campanule à feuilles de pêcheur, <i>Campanula persicifolia</i> L, 1753.....	69
Campanule à feuilles rondes, <i>Campanula rotundifolia</i> L, 1753.....	81
Campanule agglomérée, <i>Campanula glomerata</i> L, 1753.....	103
Campanule carillon, <i>Campanula medium</i> L, 1753.....	69, 103
Campanule fausse raiponce, <i>Campanula rapunculoides</i> L, 1753.....	62
Campanule gantelée, <i>Campanula trachelium</i> L, 1753.....	63
Campanule moyenne, <i>Campanula medium</i> L, 1753.....	69, 103
Campanule raiponce, <i>Campanula rapunculoides</i> L, 1753.....	62
Canche à feuilles de jonc, <i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817.....	104
Canche cespitueuse, <i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (L) P.Beauv., 1812.....	104
Canche des champs, <i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (L) P.Beauv., 1812.....	104
Canche flexueuse, <i>Avenella flexuosa</i> (L) Drejer, 1838.....	62
Canche intermédiaire, <i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817.....	104
Canche moyenne, <i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817.....	104
Caprifiguière, <i>Ficus carica</i> L, 1753.....	68
Capselle bourse-à-pasteur, <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L) Medik., 1792.....	98
Cardère à foulon, <i>Dipsacus fullonum</i> L, 1753.....	83
Cardère sauvage, <i>Dipsacus fullonum</i> L, 1753.....	83
Carotte commune, <i>Daucus carota</i> L, 1753.....	82
Carotte sauvage, <i>Daucus carota</i> L, 1753.....	82
Carthame laineux, <i>Carthamus lanatus</i> L, 1753.....	108
Carvi, <i>Carum carvi</i> L, 1753.....	81
Carvi commun, <i>Carum carvi</i> L, 1753.....	81
Catananche bleue, <i>Catananche caerulea</i> L, 1753.....	104
Catapode rigide, <i>Catapodium rigidum</i> (L) C.E.Hubb., 1953.....	108
Caucalide à feuilles de carotte, <i>Caucalis platycarpus</i> L, 1753.....	108
Caucalide à fruits aplatis, <i>Caucalis platycarpus</i> L, 1753.....	108
Caucalide à fruits larges, <i>Caucalis platycarpus</i> L, 1753.....	108
Caucalide à grandes fleurs, <i>Orlaya grandiflora</i> (L) Hoffm., 1814.....	100
Caucalis à fruits larges, <i>Caucalis platycarpus</i> L, 1753.....	108

## II. INDEX DES NOMS COMMUNS

Caucalis à grandes fleurs, <i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	100
Cèdre piquant, <i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i> L., 1753	61
Centaurée jaccée, <i>Centaurea jacea</i> L., 1753	81
Centaurée jaccée, <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> L., 1753	81
Centaurée rude, <i>Centaurea aspera</i> L., 1753	104
Centranthe chausse-trappe, <i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufur., 1811	108
Centranthe chausse-trappe, <i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufur., 1811	108
Centranthe rouge, <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	82
Céphalaire à fleurs blanches, <i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818	82
Céphalaire blanche, <i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818	82
Céraiste raide, <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> Gaudin, 1828	82
Cerfeuil des bois, <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	103
Cerfeuil doré, <i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762	104
Cerfeuil envirant, <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	104
Cerfeuil penché, <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	104
Cérinthe auriculé, <i>Cerintho minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Rouy, 1927	58
Cerisier de Sainte-Lucie, <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	54
Cerisier des bois, <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1753	54
Cervaire de Rivinus, <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	104
Chanvre d'eau, <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	117
Chanvre d'eau, <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	118
Chardon bleu, <i>Echinops ritro</i> L., 1753	104
Chasse-bosse, <i>Lysimachia vulgaris</i>	118
Chausse-trappe des blés, <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	108
Chéridoine éclairé, <i>Chelidonium majus</i> L., 1753	98
Chéridoine élevée, <i>Chelidonium majus</i> L., 1753	98
Chêne humble, <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	59
Chêne Kermès, <i>Quercus coccifera</i> L., 1753	59
Chêne pubescent, <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	54
Chêne vert, <i>Quercus ilex</i> L., 1753	54
Chénétte, <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	94
Chénopode bon Henri, <i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb., 1832	80
Chénopode du bon Henri, <i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb., 1832	80
Chérophylle doré, <i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762	104
Chérophylle penché, <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	104
Chèvrefeuille alpin, <i>Lonicera alpigena</i> L., 1753	68
Chèvrefeuille camérisier, <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	57
Chèvrefeuille d'Étrurie, <i>Lonicera atrusca</i> Santi, 1795	61
Chèvrefeuille de Toscane, <i>Lonicera atrusca</i> Santi, 1795	61
Chèvrefeuille des Alpes, <i>Lonicera alpigena</i> L., 1753	68
Chèvrefeuille des Baléares, <i>Lonicera implexa</i> Aiton, 1789	61
Chèvrefeuille des haies, <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	57
Chèvrefeuille entrealacé, <i>Lonicera implexa</i> Aiton, 1789	61
Chèvrefeuille étrusque, <i>Lonicera atrusca</i> Santi, 1795	61
Chicorée amère, <i>Cichorium intybus</i> L., 1753	98
Chicorée sauvage, <i>Cichorium intybus</i> L., 1753	98
Chiendent dactyle, <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	104
Chiendent des chiens, <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1753	63
Chiendent pied-de-poule, <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	104
Chiendent rouge, <i>Achillea millefolium</i> L., 1753	77
Chrysanthème en corymbe, <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	70, 106
Cigaline, <i>Catananche caerulea</i> L., 1753	104
Cinénaire maritime, <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsler & Meijden, 2005	105
Ciste à feuilles de sauge, <i>Cistus salvifolius</i> L., 1753	76
Ciste blanc, <i>Cistus albidus</i> L., 1753	55
Ciste cotonneux, <i>Cistus albidus</i> L., 1753	55
Ciste de Montpellier, <i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	96
Ciste mâle à feuilles blanches, <i>Cistus albidus</i> L., 1753	55
Citronnelle, <i>Melissa officinalis</i> L., 1753	64
Cladium des marais, <i>Cladium mariscus</i>	117
Cladium marisque, <i>Cladium mariscus</i>	117
Clinopode commun, <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	63
Clinopode des Pyrénées, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016	96
Clinopode méridional, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016	96
Clinopode népéta, <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	69, 104
Clochette, <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	62
Compagnon blanc, <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	94
Compagnon rouge, <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	65
Consyre moyenne, <i>Ajuga reptans</i> L., 1753	69, 103
Coquelicot, <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	100
Coquesigru, <i>Ononis natrix</i> L., 1753	90
Coris de Montpellier, <i>Coris monspeliensis</i> L., 1753	104
Cornier, <i>Cornus domestica</i> (L.) Spach, 1834	52
Cornouiller femelle, <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	56
Cornouiller mâle, <i>Cornus mas</i> L., 1753	56
Cornouiller sanguin, <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	56
cornouiller sauvage, <i>Cornus mas</i> L., 1753	56
Coronille à allure de Jonc, <i>Coronilla juncea</i> L., 1753	76
Coronille à tige de jonc, <i>Coronilla juncea</i> L., 1753	76
Coronille bigarrée, <i>Coronilla varia</i> L., 1753	82
Coronille changeante, <i>Coronilla varia</i> L., 1753	82
Coronille faux séné, <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	57
Coronille mineure, <i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L., 1756	69, 104
Coronille naine, <i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L., 1756	69, 104
Coronille variée, <i>Coronilla varia</i> L., 1753	82
Cota des teinturiers, <i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay ex Guss., 1844	98
Coucou, <i>Primula veris</i> L., 1753	70
Coudrier, <i>Corylus avellana</i> L., 1753	56
Couquet, <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	104
Cresson de cheval, <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	121
Cresson de fontaine, <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	121
Cresson des fontaines, <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	121
Cresson officinal, <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	121
Croisette commune, <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	69, 104
Crucianelle à feuilles étroites, <i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753	108
Cumin des prés, <i>Carum carvi</i> L., 1753	81
Cumin des Vosges, <i>Carum carvi</i> L., 1753	81
Cupidone, <i>Catananche caerulea</i> L., 1753	104
Cynoglosse de Crète, <i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768	104
Cynoglosse officielle, <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	104
Cynoglosse peinte, <i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768	104
Cynoglosse rayée, <i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768	104
Cytise à feuilles sessiles, <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843	56
Cytise argenté, <i>Argyrobolium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball, 1968	79
Cytise aubour, <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	53
Cytise des Alpes, <i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835	58
Cytise faux ébénier, <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	53
Cytisophylle à feuilles sessiles, <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843	56
Dactyle aggloméré, <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	104
Dactyle d'Espagne, <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman, 1882	82
Daphné garou, <i>Daphne gnidium</i> L., 1753	61
Daucus carotte, <i>Daucus carota</i> L., 1753	82
Dauphinelle consoude, <i>Delphinium consolida</i> L., 1753	98
Dauphinelle royale, <i>Delphinium consolida</i> L., 1753	98
Desmazérie rigide, <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	108
Digitale jaune, <i>Digitalis lutea</i> L., 1753	63
Dittrichie visqueuse, <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	83
Dorycnie à cinq feuilles, <i>Lotus dorycnium</i> L., 1753	88
Dorycnie hérissée, <i>Lotus hirsutus</i> L., 1753	88
Dorycnie sous-ligneuse, <i>Lotus dorycnium</i> L., 1753	88
Dryopteride fougère-mâle, <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	69, 104
Dryopteris fougère-mâle, <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	69, 104
Échinops, <i>Echinops ritro</i> L., 1753	104
Échinops ritro, <i>Echinops ritro</i> L., 1753	104
Éclairé, <i>Chelidonium majus</i> L., 1753	98
Églantier, <i>Rosa canina</i> L., 1753	77
Églantier des chiens, <i>Rosa canina</i> L., 1753	77
Éléocharide des marais, <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	120
Éléocharis des marais, <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	120
Ellébore fétide, <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	63
Élyme des chiens, <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1753	63
Épervière piloselle, <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	91
Épiaire droit, <i>Stachys recta</i> L., 1767	66
Épiaire officielle, <i>Betonica officinalis</i> L., 1753	69, 103
Épicéa commun, <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	68
Épilobe à feuilles de romarin, <i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>dodonaei</i> Vill., 1779	104
Épilobe à feuilles étroites, <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	67
Épilobe à petites fleurs, <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	121
Épilobe de Dodone, <i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>dodonaei</i> Vill., 1779	104
Épilobe en épi, <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	67
Épilobe hérissé, <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	117
Épilobe hirsute, <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	117
Épilobe romarin, <i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>dodonaei</i> Vill., 1779	104
Épinard sauvage, <i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb., 1832	80
Épine noire, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	56
Épine noire, <i>Prunus spinosa</i> L., 1753	59
Érable à feuilles d'obier, <i>Acer opalus</i> Mill., 1768	51
Érable à feuilles d'obier, <i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i> Mill., 1768	68
Érable champêtre, <i>Acer campestre</i> L., 1753	51
Érable d'Italie, <i>Acer opalus</i> Mill., 1768	51
Érable d'Italie, <i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i> Mill., 1768	68
Érable de Montpellier, <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	51
Érable faux platane, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	51
Érable opale, <i>Acer opalus</i> Mill., 1768	51
Érable opale, <i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i> Mill., 1768	68
Érable plane, <i>Acer platanoides</i> L., 1753	51
Érable sycamore, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	51
Érythré, <i>Centaurium erythraea</i> Rafn., 1800	104
Érythrée petite-centaurée, <i>Centaurium erythraea</i> Rafn., 1800	104
Escarpette couchée, <i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC., 1805	90
Eupatoire à feuilles de chanvre, <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	117
Eupatoire chanvrine, <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	117
Euphorbe arborescente, <i>Euphorbia dendroidea</i> L., 1753	103
Euphorbe characias, <i>Euphorbia characias</i> subsp. <i>characias</i> L., 1753	83
Euphorbe de Nice, <i>Euphorbia nicaeensis</i> All., 1785	104
Euphorbe de Séguier, <i>Euphorbia seguieriana</i> subsp. <i>seguieriana</i> Neck., 1770	104
Euphorbe dentée, <i>Euphorbia serrata</i> L., 1753	107
Euphorbe des bois, <i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753	69
Euphorbe faux amandier, <i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753	69
Euphorbe faux cyprès, <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	83
Euphorbe négligée, <i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Murr., 1923	69
Euphorbe petit-cyprès, <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	83
Euphorbe pourprée, <i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Murr., 1923	69
Euphorbe réveil matin, <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	99
Falabreguier, <i>Celtis australis</i> L., 1753	52
Farigoule, <i>Thymus vulgaris</i> L., 1753	94
Fatamot, <i>Viburnum tinus</i> L., 1753	61
Fausse buglosse pourpre bleu, <i>Aegonychon purpurocaeeruleum</i> (L.) Holub, 1973	69
Fausse fléole, <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzelev., 1971	108
Fausse germandrée, <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	107
Fausse raiponce, <i>Campanula medium</i> L., 1753	69, 103
Fausse scorsonère d'automne, <i>Scorzoneroideis autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	93
Faux brome dressé, <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	80
Faux brome érigé, <i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	80
Faux ébénier, <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	53
Faux safranetaurée laineuse, <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	108
Fayard, <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	52
Fénasse, <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	103
Fenouil commun, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	104
Fenouil commun, <i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill., 1768	104
Fer-à-cheval, <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	64
Fétuque cendrée, <i>Festuca cinerea</i> Vill., 1786	104
Fétuque de Timbal-Lagrange, <i>Festuca marginata</i> subsp. <i>marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	84
Fétuque des prés, <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	70, 106
Fétuque des prés, <i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	70, 106
Fétuque grêle, <i>Festuca inops</i> De Not., 1844	104
Fétuque hétérophylle, <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	69
Fétuque lisse, <i>Festuca laevigata</i> Gaudin, 1808	84
Fétuque marginée, <i>Festuca marginata</i> subsp. <i>marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	84
Fétuque très grêle, <i>Festuca inops</i> De Not., 1844	104
Fétuque violacée, <i>Festuca violacea</i> Schleich. ex Gaudin, 1808	84
Fétuque violette, <i>Festuca violacea</i> Schleich. ex Gaudin, 1808	84
Ficaire printanière, <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	69, 104
Figuier, <i>Ficus carica</i> L., 1753	68
Figuier commun, <i>Ficus carica</i> L., 1753	68
Figuier de Carie, <i>Ficus carica</i> L., 1753	68
Filaire à feuilles larges, <i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753	53
Filipendule ulmaire, <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	117
Flambe d'eau, <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	120
Fléole de Bertoloni, <i>Pheum nodosum</i> L., 1759	106
Fléole noueuse, <i>Pheum nodosum</i> L., 1759	106
Fléole tardive, <i>Pheum nodosum</i> L., 1759	106
Flouve odorante, <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	78
Foin tréteux, <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	62
Fougère aigle, <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	107
Fougère-mâle, <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	69, 104
Fouteau, <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	52
Fragon, <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	70, 106
Fragon petit houx, <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	70, 106
Fragon piquant, <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	70, 106
Fraisier des bois, <i>Fragaria vesca</i> L., 1753	69
Fraisier sauvage, <i>Fragaria vesca</i> L., 1753	69
Francoisier, <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	78
Frêne à feuilles étroites, <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	115
Frêne commun, <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	52
Frêne élevé, <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	52
Froment des haies, <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1753	63
Fromental, <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	103
Fromental élevé, <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	103
Fromenteau, <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	119
Fusain à feuilles larges, <i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill., 1768	57
Fusain d'Europe, <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	57
Fustet, <i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771	56
Fustet des teinturiers, <i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771	56
Gaillet aristé, <i>Galium aristatum</i> L., 1762	69
Gaillet blanc, <i>Galium album</i> Mill., 1768	84
Gaillet commun, <i>Galium mollugo</i> L., 1753	84
Gaillet croisette, <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	69, 104
Gaillet des marais, <i>Galium palustre</i> L., 1753	121
Gaillet dressé, <i>Galium album</i> Mill., 1768	84
Gaillet jaune, <i>Galium verum</i> L., 1753	84
Gaillet Mollugue, <i>Galium mollugo</i> L., 1753	84
Gaillet mucroné, <i>Galium aristatum</i> L., 1762	69
Gaillet odorant, <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	70
Gaillet vrai, <i>Galium verum</i> L., 1753	84
Galatelle à feuilles d'orpin, <i>Galatella sedifolia</i> subsp. <i>sedifolia</i> (L.) Greuter, 2003	104

Gant de Notre-Dame, <i>Campanula trachelium</i> L., 1753.....	63
Garou, <i>Daphne gnidium</i> L., 1753.....	61
Gauchefer, <i>Calendula arvensis</i> L., 1763.....	97
Gazon d'Angleterre, <i>Poa trivialis</i> L., 1753.....	106
Genêt d'Espagne, <i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> L., 1753.....	68, 103
Genêt poilu, <i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> L., 1753.....	68, 103
Genêt velu, <i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> L., 1753.....	68, 103
Genette, <i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i> L., 1753.....	68, 103
Genévrier commun, <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753.....	76
Genévrier de phoenicie, <i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>phoenicea</i> L., 1753.....	76
Genévrier de Sibérie, <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme, 1868.....	68
Genévrier des Alpes, <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme, 1868.....	68
Genévrier fétide, <i>Juniperus sabina</i> L., 1753.....	68, 103
Genévrier nain, <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme, 1868.....	68
Genévrier oxycedre, <i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>oxycedrus</i> L., 1753.....	61
Genévrier sabine, <i>Juniperus sabina</i> L., 1753.....	68, 103
Genièvre, <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753.....	76
Gentiane champêtre, <i>Gentiana campestris</i> (L.) Börner, 1912.....	108
Gentiane jaune, <i>Gentiana lutea</i> L., 1753.....	85
Gentianelle des champs, <i>Gentiana campestris</i> (L.) Börner, 1912.....	108
Céranium noueux, <i>Ceranium nodosum</i> L., 1753.....	69
Céranium sanguin, <i>Ceranium sanguineum</i> L., 1753.....	69, 104
Cermandrée des montagnes, <i>Teucrium montanum</i> L., 1753.....	106
Cermandrée jaune, <i>Teucrium flavum</i> subsp. <i>flavum</i> L., 1753.....	106
Cermandrée petit-chêne, <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753.....	94
Cermandrée polium, <i>Teucrium polium</i> L., 1753.....	94
Cermandrée polium, <i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> L., 1753.....	106
Cermandrée tomenteuse, <i>Teucrium polium</i> L., 1753.....	94
Cermandrée tomenteuse, <i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> L., 1753.....	106
Cesse à feuilles larges, <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753.....	105
Cesse à larges feuilles, <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753.....	105
Cesse des prés, <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753.....	96
Claieul d'Italie, <i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768.....	107
Claieul des moissons, <i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768.....	107
Globulaire à feuilles cordées, <i>Globularia cordifolia</i> L., 1753.....	104
Globulaire à feuilles en cœur, <i>Globularia cordifolia</i> L., 1753.....	104
Globulaire alypum, <i>Globularia alypum</i> L., 1753.....	76
Globulaire de Bisnagar, <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753.....	104
Globulaire de Willkomm, <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753.....	104
Globulaire ponctuée, <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753.....	104
Glycérie pliée, <i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827.....	121
Grand basilic, <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753.....	63
Grand boucage, <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762.....	70, 106
Grand coquelicot, <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753.....	100
Grand Érable, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753.....	51
Grand plantain, <i>Plantago major</i> L., 1753.....	91
Grand plantain, <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753.....	106
Grand salsifis, <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772.....	106
Grand tardyle, <i>Tordylium maximum</i> L., 1753.....	108
Grande Berce, <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753.....	85
Grande brize, <i>Briza maxima</i> L., 1753.....	108
Grande chélideine, <i>Chelidonium majus</i> L., 1753.....	98
Grande éclaire, <i>Chelidonium majus</i> L., 1753.....	98
Grande gentiane, <i>Gentiana lutea</i> L., 1753.....	85
Grande joubarbe, <i>Sempervivum tectorum</i> L., 1753.....	93
Grande mauve, <i>Malva sylvestris</i> L., 1753.....	89
Grande pervenche, <i>Viola major</i> L., 1753.....	70
Grande pimpinelle, <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762.....	70, 106
Grande prêle, <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783.....	107
Grémil pourpre bleu, <i>Aegonychon purpuracoeruleum</i> (L.) Holub, 1973.....	69
Grille-midi, <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868.....	108
Gros chiendent, <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805.....	104
Groseillier à maquereaux, <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753.....	60
Groseillier des Alpes, <i>Ribes alpinum</i> L., 1753.....	60
Groseillier des rocailles, <i>Ribes petraeum</i> Wulfen, 1781.....	68
Groseillier des rochers, <i>Ribes petraeum</i> Wulfen, 1781.....	68
Groseillier épineux, <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753.....	60
Guède, <i>Isatis tinctoria</i> L., 1753.....	86
Guimauve hérissée, <i>Malva setigera</i> Spenn., 1829.....	108
Cypsochile rampante, <i>Cypsochile repens</i> L., 1753.....	95
Cypsochile vaccaire, <i>Cypsochile vaccaria</i> (L.) Sm., 1809.....	89
Hélianthème blanc, <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768.....	85
Hélianthème commun, <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768.....	85
Hélianthème d'Italie, <i>Helianthemum oelandicum</i> var. <i>italicum</i> (L.) DC., 1813.....	104
Hélianthème des Apennins, <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768.....	85
Hélianthème jaune, <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768.....	85
Hélianthème nummulaire, <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768.....	85
Hélianthème taché, <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868.....	108
Hélianthème tacheté, <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868.....	108
Hélichryse stoéchade, <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794.....	85
Hélicotrichon toujours vert, <i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg., 1938.....	105
Hépatique blanche, <i>Parnassia palustris</i> L., 1753.....	121
Herbe à becauet, <i>Ceranium sanguineum</i> L., 1753.....	69, 104
Herbe à feuilles de Polium, <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768.....	85
Herbe à la faux, <i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753.....	69
Herbe à la verrue, <i>Chelidonium majus</i> L., 1753.....	98
Herbe à midi, <i>Jasione montana</i> L., 1753.....	108
Herbe à savon, <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753.....	65
Herbe au charpentier, <i>Achillea millefolium</i> L., 1753.....	77
Herbe au charpentier, <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753.....	77
Herbe aux aulx, <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913.....	62
Herbe aux écus, <i>Lunaria annua</i> L., 1753.....	69
Herbe aux ladres, <i>Veronica officinalis</i> L., 1753.....	66
Herbe aux verrues, <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753.....	99
Herbe aux vers, <i>Artemisia absinthium</i> L., 1753.....	103
Herbe de Capucin, <i>Nigella damascena</i> L., 1753.....	100
Herbe de feu, <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753.....	79
Herbe de la Saint-Jean, <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753.....	86
Herbe de Saint Benoît, <i>Geum urbanum</i> L., 1753.....	63
Herbe de Saint Jean, <i>Hedera helix</i> L., 1753.....	61
Herbe de Saint Philippe, <i>Isatis tinctoria</i> L., 1753.....	86
Herbe de Saint-Jacques, <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791.....	87
Herbe de Saint-Roch, <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800.....	121
Herbe de Sainte-Barbe, <i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812.....	62
Herbe des Égyptiens, <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753.....	118
Herbe des Juifs, <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753.....	66
Herbe des Juifs, <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L., 1753.....	70
Herbe sacrée, <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753.....	86
Herbe-à-cinq-côtes, <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753.....	91
Herbe-aux-cerfs, <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788.....	94
Herbe-aux-cinq-coutures, <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753.....	101
Herbe-de-Saint-Fiacre, <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753.....	96
Hêtre, <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753.....	52
Hêtre commun, <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753.....	52
Hêtre des forêts, <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753.....	52
Hippocrévide à toupet, <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753.....	64
Hippocrévide chevelue, <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753.....	64
Hippocrévide en ombelle, <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753.....	64
Hippocrévide faux baguenaudier, <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989.....	57
Hippocrévide fer-à-cheval, <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753.....	64
Hippocrépis chevelu, <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753.....	64
Hippocrépis faux baguenaudier, <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989.....	57
Houblon, <i>Humulus lupulus</i> L., 1753.....	69, 121
Houblon grim pant, <i>Humulus lupulus</i> L., 1753.....	69, 121
Houblon lupulin, <i>Humulus lupulus</i> L., 1753.....	69, 121
Houlique laineuse, <i>Holcus lanatus</i> L., 1753.....	86
Houx, <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753.....	52
Houx commun, <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753.....	52
Hysope, <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753.....	86
Hysope officinale, <i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753.....	86
Ibéride pennée, <i>Iberis pinnata</i> L., 1755.....	99
Ibéris à feuilles pennatifides, <i>Iberis pinnata</i> L., 1755.....	99
Ibéris penné, <i>Iberis pinnata</i> L., 1755.....	99
Immortelle à fleurs fermées, <i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill., 1768.....	102
Immortelle des dunes, <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794.....	85
Immortelle jaune, <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794.....	85
Immortelle stoéchade, <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794.....	85
Inule des montagnes, <i>Inula montana</i> L., 1753.....	86
Inule dysentérique, <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800.....	121
Inule visqueuse, <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973.....	83
Iris des marais, <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753.....	120
Iris faux acore, <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753.....	120
Iris jaune, <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753.....	120
Ivraie à épis serrés, <i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811.....	99
Ivraie à épis serrés, <i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> Gaudin, 1811.....	108
Ivraie rigide, <i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811.....	99
Ivraie rigide, <i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> Gaudin, 1811.....	108
Ivraie vivace, <i>Lolium perenne</i> L., 1753.....	88
Jacobée à feuilles de roquette, <i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801.....	105
Jacobée commune, <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791.....	107
Jacobée maritime, <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsler & Meijden, 2005.....	105
Jarosse, <i>Vicia cracca</i> L., 1753.....	67
Jasione des montagnes, <i>Jasione montana</i> L., 1753.....	108
Jasmin arbustif, <i>Jasminum fruticans</i> L., 1753.....	76
Jasmin d'été, <i>Jasminum fruticans</i> L., 1753.....	76
Jasmin jaune, <i>Jasminum fruticans</i> L., 1753.....	76
Jasmin ligneux, <i>Jasminum fruticans</i> L., 1753.....	76
Jonc à fruits brillants, <i>Juncus articulatus</i> L., 1753.....	122
Jonc à fruits luisants, <i>Juncus articulatus</i> L., 1753.....	122
Jonc à tépales pointus, <i>Juncus acutus</i> .....	117
Jonc aigu, <i>Juncus acutus</i> .....	117
Jonc articulé, <i>Juncus articulatus</i> L., 1753.....	122
Jonc courbé, <i>Juncus inflexus</i> L., 1753.....	118
Jonc diffus, <i>Juncus effusus</i> L., 1753.....	118
Jonc épars, <i>Juncus effusus</i> L., 1753.....	118
Jonc glauque, <i>Juncus inflexus</i> L., 1753.....	118
Jonc maritime, <i>Juncus maritimus</i> .....	122
Jonciole, <i>Aphyllanthus monspeliensis</i> L., 1753.....	78
Joubarbe des toits, <i>Sempervivum tectorum</i> L., 1753.....	93
Knautie des champs, <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828.....	64
Knautie des collines, <i>Knautia collina</i> Heynh., 1840.....	105
Knautie pourpre, <i>Knautia collina</i> Heynh., 1840.....	105
Koelérie à crête, <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971.....	108
Koelérie du Valais, <i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i> (Honck) Gaudin, 1808.....	87
Koelérie fausse fiéole, <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971.....	108
Laiche à épis distants, <i>Carex distans</i> L., 1759.....	121
Laiche à épis pendants, <i>Carex pendula</i> Huds., 1762.....	116
Laiche bleuâtre, <i>Carex panicea</i> L., 1753.....	121
Laiche caryophyllée, <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785.....	81
Laiche cuirvée, <i>Carex otrubae</i> .....	121
Laiche de Davall, <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800.....	121
Laiche de Haller, <i>Carex halleriana</i> Asso, 1779.....	103
Laiche des marais, <i>Carex acutiformis</i> .....	120
Laiche distante, <i>Carex distans</i> L., 1759.....	121
Laiche du printemps, <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785.....	81
Laiche écailléeuse, <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834.....	121
Laiche élevée, <i>Carex elata</i> .....	116
Laiche étirée, <i>Carex extensa</i> .....	121
Laiche fausse laiche aiguë, <i>Carex acutiformis</i> .....	120
Laiche hérissée, <i>Carex hirta</i> L., 1753.....	81
Laiche humble, <i>Carex humilis</i> Leys., 1758.....	69, 103
Laiche millet, <i>Carex panicea</i> L., 1753.....	121
Laiche panic, <i>Carex panicea</i> L., 1753.....	121
Laiche paniculée, <i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i> L., 1755.....	69, 116
Laiche pendante, <i>Carex pendula</i> Huds., 1762.....	116
Laiche printanière, <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785.....	81
Laiche raide, <i>Carex elata</i> .....	116
Laiche tomenteuse, <i>Carex tomentosa</i> L., 1767.....	70, 103
Lamier à feuilles embrassantes, <i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753.....	108
Lamier à feuilles panachées, <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763.....	69, 105
Lamier amplexicaule, <i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753.....	108
Lamier maculé, <i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763.....	69, 105
Lamier pourpre, <i>Lamium purpureum</i> L., 1753.....	108
Laser à feuilles larges, <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753.....	87
Laser blanc, <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753.....	87
Laser de France, <i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753.....	87
Laser de Gaulle, <i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753.....	87
Laser odorant, <i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753.....	87
Laser siler, <i>Laserpitium siler</i> L., 1753.....	105
Laserpitium à feuilles larges, <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753.....	87
Laserpitium à larges feuilles, <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753.....	87
Laserpitium de France, <i>Laserpitium gallicum</i> L., 1753.....	87
Laserpitium siler, <i>Laserpitium siler</i> L., 1753.....	105
Laurier de Saint Antoine, <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753.....	67
Laurier noble, <i>Laurus nobilis</i> L., 1753.....	53
Laurier-sauce, <i>Laurus nobilis</i> L., 1753.....	53
Laurier-tin, <i>Viburnum tinus</i> L., 1753.....	64
Lavande à feuilles étroites, <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., 1768.....	64
Lavande à feuilles étroites, <i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> Mill., 1768.....	69, 105
Lavande officinale, <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., 1768.....	64
Lavande officinale, <i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> Mill., 1768.....	69, 105
Lavande papillon, <i>Lavandula stoechas</i> L., 1753.....	105
Lavande stéchade, <i>Lavandula stoechas</i> L., 1753.....	105
Lavande stoéchade, <i>Lavandula stoechas</i> L., 1753.....	105
Lavande vraie, <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., 1768.....	64
Lavande vraie, <i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> Mill., 1768.....	69, 105
Légousie miroir-de-Vénus, <i>Legousia speculum-veneris</i> subsp. <i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785.....	99
Lentisque, <i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753.....	58
Lierre commun, <i>Hedera helix</i> L., 1753.....	61
Lierre grim pant, <i>Hedera helix</i> L., 1753.....	61
Lilas d'Espagne, <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805.....	82
Lin à feuilles étroites, <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912.....	99
Lin à feuilles menues, <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753.....	105
Lin à feuilles ténues, <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753.....	105
Lin à petites feuilles, <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753.....	105
Lin à tige raide, <i>Linum strictum</i> L., 1753.....	108
Lin bisannuel, <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912.....	99
Lin campanulé, <i>Linum campanulatum</i> L., 1753.....	88
Lin de Narbonne, <i>Linum narbonense</i> L., 1753.....	105
Lin droit, <i>Linum strictum</i> L., 1753.....	108
Lin raide, <i>Linum strictum</i> L., 1753.....	108
Linaigrette à feuilles larges, <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800.....	121
Linaire rampante, <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768.....	105
Liondent d'automne, <i>Scorzoneroideis autumnalis</i> (L.) Moench, 1794.....	105
Liondent hispide, <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753.....	87
Liondent hispide, <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753.....	87



## II. INDEX DES NOMS COMMUNS

Liondent variable, <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753.....	87
Liondent variable, <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> L., 1753.....	87
Loncomélos de Narbonne, <i>Loncomelos narbonense</i> (L) Raf., 1840.....	107
Lotier à gousses carrées, <i>Lotus maritimus</i> L., 1753.....	89
Lotier corniculé, <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753.....	105
Lotier des Alpes, <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>alpinus</i> (DC) Rothm., 1963.....	105
Lotier dorycnie, <i>Lotus dorycnium</i> L., 1753.....	88
Lotier faux cytise, <i>Lotus cytisoides</i> L., 1753.....	105
Lotier hérissé, <i>Lotus hirsutus</i> L., 1753.....	105
Lotier hirsute, <i>Lotus hirsutus</i> L., 1753.....	105
Lotier maritime, <i>Lotus maritimus</i> L., 1753.....	89
Lunaire annuelle, <i>Lunaria annua</i> L., 1753.....	69
Lunetière à feuilles en cornes de cerf, <i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832.....	103
Lunetière de Lamotte, <i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832.....	103
Lunetière de Méditerranée, <i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832.....	103
Lunetière du granite, <i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832.....	103
Lunetière intriquée, <i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832.....	103
Lunetière lime, <i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832.....	103
Lunetière pinnatifide, <i>Biscutella lima</i> Rchb., 1832.....	103
Lupin à feuilles étroites, <i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753.....	108
Lupin bleu, <i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753.....	108
Luzerne lupuline, <i>Medicago lupulina</i> L., 1753.....	108
Luzerne minime, <i>Medicago minima</i> (L) L., 1754.....	100
Luzerne naine, <i>Medicago minima</i> (L) L., 1754.....	100
Luzule champêtre, <i>Luzula campestris</i> (L) DC., 1805.....	105
Luzule de Sieber, <i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K.Richt., 1890.....	64
Luzule des champs, <i>Luzula campestris</i> (L) DC., 1805.....	105
Lychnide des bois, <i>Silene dioica</i> (L) Clairv., 1811.....	65
Lychnide nielle, <i>Agrostemma githago</i> L., 1753.....	97
Lychnis des bois, <i>Silene dioica</i> (L) Clairv., 1811.....	65
Lychnis nielle, <i>Agrostemma githago</i> L., 1753.....	97
Lycien, <i>Juniperus phoenicea</i> subsp. <i>phoenicea</i> L., 1753.....	76
Lycope d'Europe, <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753.....	118
Lysimaque commune, <i>Lysimachia vulgaris</i> .....	118
Lysimaque vulgaire, <i>Lysimachia vulgaris</i> .....	118
Mancienne, <i>Viburnum lantana</i> L., 1753.....	87
Marguerite brûlée, <i>Leucanthemum adustum</i> (W.D.J.Koch) Gremli, 1898.....	88
Marguerite d'Irksut, <i>Leucanthemum irtutianum</i> DC., 1838.....	88
Marguerite en corymbe, <i>Tanacetum corymbosum</i> (L) Sch.Bip., 1844.....	70, 106
Marguerite pâle, <i>Leucanthemum pallens</i> (J.Gay ex Perreyem) DC., 1838.....	105
Marisque, <i>Cladium mariscus</i> .....	117
Marjolaine sauvage, <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753.....	105
Marrube aquatique, <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753.....	118
Marrube commun, <i>Marrubium vulgare</i> L., 1753.....	105
Marrube vulgaire, <i>Marrubium vulgare</i> L., 1753.....	105
Marsaule, <i>Salix caprea</i> L., 1753.....	54
Marsault, <i>Salix caprea</i> L., 1753.....	54
Massette à feuilles larges, <i>Typha latifolia</i> L., 1753.....	119
Massette à larges feuilles, <i>Typha latifolia</i> L., 1753.....	119
Matricaire inodore, <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L) Sch.Bip., 1844.....	102
Matricaire perforée, <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L) Sch.Bip., 1844.....	102
Maurette, <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753.....	68, 103
Mauve alcée, <i>Malva alcea</i> L., 1753.....	105
Mauve hérissée, <i>Malva setigera</i> Spenn., 1829.....	108
Mauve hirsute, <i>Malva setigera</i> Spenn., 1829.....	108
Mauve sauvage, <i>Malva sylvestris</i> L., 1753.....	89
Mauve sylvestre, <i>Malva sylvestris</i> L., 1753.....	89
Médaille de Judas, <i>Lunaria annua</i> L., 1753.....	69
Mélèze d'Europe, <i>Larix decidua</i> Mill., 1768.....	53
Mélèze décidue, <i>Larix decidua</i> Mill., 1768.....	53
Méliilot blanc, <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787.....	89
Méliilot jaune, <i>Melilotus officinalis</i> (L) Lam., 1779.....	89
Méliilot officinal, <i>Melilotus officinalis</i> (L) Lam., 1779.....	89
Mélinet auriculé, <i>Cerintho minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Rouy, 1927.....	104
Mélique améthyste, <i>Melica amethystina</i> Pourr., 1788.....	105
Mélique ciliée, <i>Melica ciliata</i> L., 1753.....	89
Mélique ciliée, <i>Melica ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i> L., 1753.....	105
Mélique couleur d'améthyste, <i>Melica amethystina</i> Pourr., 1788.....	105
Mélique de Bauhin, <i>Melica amethystina</i> Pourr., 1788.....	105
Mélique de Magnol, <i>Melica ciliata</i> subsp. <i>magnolii</i> (Godr. & Gren.) K.Richt., 1890.....	105
Mélique penchée, <i>Melica nutans</i> L., 1753.....	69
Méliste citronnelle, <i>Melissa officinalis</i> L., 1753.....	64
Méliste officinale, <i>Melissa officinalis</i> L., 1753.....	64
Menthe à feuilles longues, <i>Mentha longifolia</i> (L) Huds., 1762.....	119
Menthe à feuilles rondes, <i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792.....	105, 121
Menthe à grenouilles, <i>Mentha aquatica</i> L., 1753.....	118
Menthe à longues feuilles, <i>Mentha longifolia</i> (L) Huds., 1762.....	119
Menthe aquatique, <i>Mentha aquatica</i> L., 1753.....	118
Menthe des bois, <i>Mentha longifolia</i> (L) Huds., 1762.....	119
Menthe odorante, <i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792.....	105, 121
Menthe rouge, <i>Mentha aquatica</i> L., 1753.....	54
Merisier, <i>Prunus avium</i> (L) L., 1755.....	54
Merisier vrai, <i>Prunus avium</i> (L) L., 1755.....	54
Micocoulier austral, <i>Celtis australis</i> L., 1753.....	52
Micocoulier de Provence, <i>Celtis australis</i> L., 1753.....	52
Millefeuille, <i>Achillea millefolium</i> L., 1753.....	77
Millepertuis à quatre ailes, <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823.....	105
Millepertuis à quatre angles, <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823.....	105
Millepertuis perforé, <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753.....	86
Minette, <i>Medicago lupulina</i> L., 1753.....	108
Minuartie à rostre, <i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb., 1842.....	105
Minuartie changeante, <i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb., 1842.....	105
Miroir rostrée, <i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb., 1842.....	105
Miroir-de-Vénus, <i>Legousia speculum-veneris</i> subsp. <i>speculum-veneris</i> (L) Chaix, 1785.....	99
Molène bouillon-blanc, <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753.....	96
Molène de Chaix, <i>Verbascum chaixii</i> Vill., 1779.....	70
Molène lychnide, <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753.....	66
Molène lychnite, <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753.....	66
Molinie bleue, <i>Molinia caerulea</i> (L) Moench, 1794.....	119
Molinie élevée, <i>Molinia arundinacea</i> Schrank, 1789.....	119
Molinie roseau, <i>Molinia arundinacea</i> Schrank, 1789.....	119
Mondré, <i>Cistus salvifolius</i> L., 1753.....	76
Monnaie-du-Pape, <i>Lunaria annua</i> L., 1753.....	69
Mouron aquatique, <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753.....	122
Mouron d'eau, <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753.....	122
Muguet des dames, <i>Galium odoratum</i> (L) Scop., 1771.....	70
Muscari à toupet, <i>Muscari comosum</i> (L) Mill., 1768.....	107
Muscari chevelu, <i>Muscari comosum</i> (L) Mill., 1768.....	107
Myosotis alpestre, <i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt, 1794.....	89
Myosotis couché, <i>Myosotis decumbens</i> Host, 1827.....	64
Myosotis couché, <i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>decumbens</i> Host, 1827.....	105
Myosotis des Alpes, <i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt, 1794.....	89
Myosotis des champs, <i>Myosotis arvensis</i> (L) Hill, 1764.....	100
Myosotis étalé, <i>Myosotis decumbens</i> Host, 1827.....	64
Myosotis étalé, <i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>decumbens</i> Host, 1827.....	105
Myosotis retombant, <i>Myosotis decumbens</i> Host, 1827.....	54
Myosotis retombant, <i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>decumbens</i> Host, 1827.....	105
Myricaire d'Allemagne, <i>Myricaria germanica</i> (L) Desv., 1824.....	69, 103, 121
Myrte commun, <i>Myrtus communis</i> L., 1753.....	58
Myrtille, <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753.....	68, 103
Nard raide, <i>Nardus stricta</i> L., 1759.....	105
Népéta à feuilles lancéolées, <i>Nepeta nepetella</i> L., 1759.....	105
Népéta petite népéta, <i>Nepeta nepetella</i> L., 1759.....	105
Nerprun alaterne, <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753.....	59
Nerprun des Alpes, <i>Rhamnus alpina</i> L., 1753.....	68
Nerprun purgatif, <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753.....	59
Nielle des blés, <i>Agrostemma githago</i> L., 1753.....	97
Nigelle de Damas, <i>Nigella damascena</i> L., 1753.....	100
Noisetier, <i>Corylus avellana</i> L., 1753.....	56
Noisetier commun, <i>Corylus avellana</i> L., 1753.....	56
Œil-de-chien, <i>Plantago sempervirens</i> Crantz, 1766.....	77
Œil-de-perdrix, <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753.....	93
Œillet bleu de Montpellier, <i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L., 1753.....	78
Œillet de Godron, <i>Dianthus godronianus</i> Jord., 1855.....	104
Œillet des rochers, <i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> (L) Link, 1829.....	105
Œillet prolifère, <i>Petrorhagia prolifera</i> (L) P.W.Ball & Heywood, 1964.....	100
Œillet saxicole, <i>Dianthus saxicola</i> Jord., 1852.....	83
Œillet saxifrage, <i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> (L) Link, 1829.....	105
Olivier d'Europe, <i>Olea europaea</i> L., 1753.....	68
Oloptum millet, <i>Oloptum millicaceum</i> (L) Röser & Hamasha, 2012.....	90
Orge de des lièvres, <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang., 1882.....	104
Orge des rats, <i>Hordeum murinum</i> L., 1753.....	108
Orge queue-de-rat, <i>Hordeum murinum</i> L., 1753.....	108
Orge sauvage, <i>Hordeum murinum</i> L., 1753.....	108
Origan commun, <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753.....	105
Orlaya à grandes fleurs, <i>Orlaya grandiflora</i> (L) Hoffm., 1814.....	100
Orme champêtre, <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768.....	55
Orme cilié, <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768.....	55
Orme des montagnes, <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762.....	55
Orme glabre, <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762.....	55
Orme mineur, <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768.....	55
Ormeau, <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768.....	55
Ornithogale de Narbonne, <i>Loncomelos narbonense</i> (L) Raf., 1840.....	107
Orpin à pétales droits, <i>Petrosedum ochroleucum</i> (Chaix) Niederle, 2014.....	105
Orpin acre, <i>Sedum acre</i> L., 1753.....	93
Orpin blanc, <i>Sedum album</i> L., 1753.....	93
Orpin blanc jaunâtre, <i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich, 1984.....	90
Orpin de Nice, <i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich, 1984.....	90
Ortie bleue, <i>Campanula trachelium</i> L., 1753.....	63
Ortie rouge, <i>Lamium purpureum</i> L., 1753.....	108
Oseille agglomérée, <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770.....	121
Oseille des brebis, <i>Rumex acetosella</i> L., 1753.....	92
Osier blanc, <i>Salix alba</i> L., 1753.....	70, 106
Osier brun, <i>Salix triandra</i> .....	116
Osier pourpre, <i>Salix purpurea</i> L., 1753.....	116
Osier rouge, <i>Salix purpurea</i> L., 1753.....	116
Pallénide maritime, <i>Pallenis maritima</i> (L) Greuter, 1997.....	105
Pallénis maritime, <i>Pallenis maritima</i> (L) Greuter, 1997.....	105
Panais cultivé, <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753.....	90
Pâquerette, <i>Bellis perennis</i> L., 1753.....	103
Pâquerette vivace, <i>Bellis perennis</i> L., 1753.....	103
Parnassie des marais, <i>Parnassia palustris</i> L., 1753.....	121
Passerose, <i>Alcea rosea</i> L., 1753.....	108
Pastel des teinturiers, <i>Isatis tinctoria</i> L., 1753.....	86
Pastinaciacier, <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753.....	90
Patience agglomérée, <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770.....	121
Patience petite-oseille, <i>Rumex acetosella</i> L., 1753.....	92
Patte d'ours, <i>Heraclium sphondylium</i> L., 1753.....	85
Pâturin à tiges aplaties, <i>Poa compressa</i> L., 1753.....	65
Pâturin annuel, <i>Poa annua</i> L., 1753.....	101
Pâturin commun, <i>Poa trivialis</i> L., 1753.....	106
Pâturin comprimé, <i>Poa compressa</i> L., 1753.....	65
Pâturin des Alpes, <i>Poa alpina</i> L., 1753.....	91
Pâturin des bois, <i>Poa nemoralis</i> L., 1753.....	70, 106
Pâturin des forêts, <i>Poa nemoralis</i> L., 1753.....	70, 106
Pâturin des prés, <i>Poa pratensis</i> L., 1753.....	106
Pâturin rigide, <i>Catapodium rigidum</i> (L) C.E.Hubb., 1953.....	108
Pavot coquelicot, <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753.....	100
Pelossier, <i>Prunus spinosa</i> L., 1753.....	59
Persil de Bouc, <i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753.....	106
Persil des bois, <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L) Hoffm., 1814.....	106
Pervenche à grandes fleurs, <i>Vinca major</i> L., 1753.....	70
Pervenche élevée, <i>Vinca major</i> L., 1753.....	70
Pervenche humble, <i>Vinca minor</i> L., 1753.....	70
Pervenche mineure, <i>Vinca minor</i> L., 1753.....	70
Peteron, <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753.....	76
Petit boucage, <i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753.....	106
Petit genêt d'Espagne, <i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> L., 1753.....	68, 106
Petit houx, <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753.....	70, 106
Petit orme, <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768.....	55
Petit Tamaris, <i>Myricaria germanica</i> (L) Desv., 1824.....	69, 103, 121
Petite coronille, <i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L., 1756.....	69, 104
Petite érule, <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753.....	83
Petite luzerne, <i>Medicago minima</i> (L) L., 1754.....	100
Petite népéta, <i>Nepeta nepetella</i> L., 1759.....	105
Petite oseille, <i>Rumex acetosella</i> L., 1753.....	92
Petite pervenche, <i>Vinca minor</i> L., 1753.....	70
Petite pimpinelle, <i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753.....	106
Petite pimprenelle, <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753.....	92
Petite sangisorbe, <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753.....	92
Petite verge-d'or, <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L) Arcang., 1882.....	70
Petite-centaurée commune, <i>Centaurium erythraea</i> Rafn., 1800.....	104
Petite-centaurée érythraée, <i>Centaurium erythraea</i> Rafn., 1800.....	104
Pétrorhagie prolifère, <i>Petrorhagia prolifera</i> (L) P.W.Ball & Heywood, 1964.....	100
Pétrorhagie saxifrage, <i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> (L) Link, 1829.....	105
Peucedan des cerfs, <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788.....	104
Peucedan herbe-aux-cerfs, <i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788.....	104
Peuplier de Naples, <i>Populus nigra</i> subsp. <i>neapolitana</i> (Ten.) Maire, 1932.....	68
Peuplier tremble, <i>Populus tremula</i> L., 1753.....	68
Phillyrée à feuilles étroites, <i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753.....	58
Phillyrée à feuilles larges, <i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753.....	53
Phillyrée à larges feuilles, <i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753.....	119
Phragmite austral, <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840.....	119
Phragmite commun, <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840.....	119
Pied-d'alouette royal, <i>Delphinium consolida</i> L., 1753.....	98
Pied-de-coq, <i>Ranunculus acris</i> L., 1753.....	63
Pied-de-griffon, <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753.....	92
Pied-de-lièvre, <i>Trifolium arvense</i> L., 1753.....	67
Pied-de-poule, <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753.....	104
Pied-de-poule, <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753.....	105
Piloselle officinale, <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862.....	91
Pimpinelle élevée, <i>Pimpinella major</i> (L) Huds., 1762.....	106
Pimpinelle à fruits réticulés, <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753.....	92
Pin à crochets, <i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin, 1936.....	53
Pin blanc, <i>Pinus halepensis</i> Mill., 1768.....	68
Pin blanc de Provence, <i>Pinus halepensis</i> Mill., 1768.....	68
Pin d'Alep, <i>Pinus halepensis</i> Mill., 1768.....	68
Pin de Briançon, <i>Larix decidua</i> Mill., 1768.....	53
Pin des Landes, <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789.....	68
Pin maritime, <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789.....	68
Pin mésogéen, <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789.....	68
Pin sylvestre, <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753.....	68
Piopolet, <i>Dianthus saxicola</i> Jord., 1852.....	83
Piptathère faux millet, <i>Oloptum millicaceum</i> (L) Röser & Hamasha, 2012.....	90
Piptathère millet, <i>Oloptum millicaceum</i> (L) Röser & Hamasha, 2012.....	90

Pistachier lentisque, <i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753.....	58
Pistachier térébinthe, <i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753.....	69
Pistolochie, <i>Aristolochia pistolochia</i> L., 1763.....	96
Plane, <i>Acer platanoides</i> L., 1753.....	51
Plantain à bouquet, <i>Plantago major</i> L., 1753.....	91
Plantain à bouquet, <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753.....	106
Plantain élevé, <i>Plantago major</i> L., 1753.....	91
Plantain élevé, <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753.....	106
Plantain lancéolé, <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753.....	91
Plantain majeur, <i>Plantago major</i> L., 1753.....	91
Plantain majeur, <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753.....	106
Plantain moyen, <i>Plantago media</i> L., 1753.....	91
Plantain toujours vert, <i>Plantago sempervirens</i> Crantz, 1766.....	77
Poil-de-bouc, <i>Nardus stricta</i> L., 1753.....	90
Poirier à feuilles d'amandier, <i>Pyrus spinosa</i> Forssk., 1775.....	59
Poirier amandier, <i>Pyrus spinosa</i> Forssk., 1775.....	59
Poirier épineux, <i>Pyrus spinosa</i> Forssk., 1775.....	59
Pois vivace, <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753.....	105
Poivre de muraille, <i>Sedum acre</i> L., 1753.....	93
Poivre des murailles, <i>Sedum acre</i> L., 1753.....	92
Polypode commun, <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753.....	69
Polypode intermédiaire, <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961.....	70
Polypode vulgaire, <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753.....	69
Polystic en fer de lance, <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799.....	70
Polystic en forme de lance, <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799.....	70
Polystic lonchite, <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799.....	70
Pommier des bois, <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768.....	53
Pommier sauvage, <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768.....	53
Pommier sylvestre, <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768.....	53
Porcelle enracinée, <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753.....	86
Porte-aigle, <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879.....	107
Porte-fraise, <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753.....	106
Potentille de Neumann, <i>Potentilla verna</i> L., 1753.....	91
Potentille de printemps, <i>Potentilla verna</i> L., 1753.....	91
Potentille de Tabernaemontanus, <i>Potentilla verna</i> L., 1753.....	91
Potentille dressée, <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797.....	121
Potentille dressée, <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797.....	121
Potentille droite, <i>Potentilla recta</i> L., 1753.....	106
Potentille printanière, <i>Potentilla verna</i> L., 1753.....	91
Potentille rampante, <i>Potentilla reptans</i> L., 1753.....	121
Potentille tormentille, <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797.....	106
Potérium sanguisorbe, <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753.....	92
Prêle d'ivoire, <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783.....	70
Prêle rameuse, <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799.....	107
Prêle très rameuse, <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799.....	107
Primevère à grandes fleurs, <i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762.....	70, 106
Primevère acule, <i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762.....	70, 106
Primevère commune, <i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds., 1762.....	70, 106
Primevère de Colonna, <i>Primula veris</i> var. <i>columnae</i> (Ten.) B.Bock, 2012.....	70
Primevère officielle, <i>Primula veris</i> L., 1753.....	70
Primevère vraie, <i>Primula veris</i> L., 1753.....	70
Prunellier, <i>Prunus spinosa</i> L., 1753.....	59
Prunier de Sainte-Lucie, <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753.....	58
Prunier des oiseaux, <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755.....	54
Prunier épineux, <i>Prunus spinosa</i> L., 1753.....	59
Prunier mahaleb, <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753.....	58
Prunier merisier, <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755.....	54
Psoralée à odeur de bitume, <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981.....	79
Ptéridie aigle, <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879.....	107
Ptéridium aigle, <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879.....	107
Pudis, <i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753.....	58
Pulicaria dysentérique, <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800.....	121
Queue-de-renard, <i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753.....	101
Quintefeuille, <i>Potentilla reptans</i> L., 1753.....	106
Raiponce orbiculaire, <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753.....	90
Raisin de chien, <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753.....	57
Raisin-d'ours, <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng., 1825.....	68, 103
Ray-grass anglais, <i>Lolium perenne</i> L., 1753.....	88
Ray-grass français, <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819.....	103
Ray-grass rigide, <i>Lolium rigidum</i> Gaudin, 1811.....	99
Ray-grass rigide, <i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> Gaudin, 1811.....	108
Régliasse des bois, <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753.....	69
Reine-des-prés, <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879.....	117
Renoncule âcre, <i>Ranunculus acris</i> L., 1753.....	92
Renoncule bulbeuse, <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753.....	97
Renoncule crochue, <i>Ranunculus aduncus</i> Gren., 1847.....	70, 106
Renoncule de Villars, <i>Ranunculus aduncus</i> Gren., 1847.....	70, 106
Renoncule des champs, <i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753.....	108
Renoncule ficaria, <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762.....	69, 104
Réséda bâtard, <i>Reseda lutea</i> L., 1753.....	101
Réséda jaune, <i>Reseda lutea</i> L., 1753.....	101
Réséda raiponce, <i>Reseda phyteuma</i> L., 1753.....	108
Riolet, <i>Mentha aquatica</i> L., 1753.....	118
Robinet rouge, <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811.....	65
Roegnérie des chiens, <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755.....	63
Romarin, <i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753.....	60
Romarin officinal, <i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753.....	60
Rose trémière, <i>Alcea rosea</i> L., 1753.....	108
Roseau, <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840.....	119
Roseau à balais, <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840.....	119
Roseau commun, <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840.....	119
Rosier de tous les mois, <i>Rosa sempervirens</i> L., 1753.....	68
Rosier des chiens, <i>Rosa canina</i> L., 1753.....	77
Rosier des haies, <i>Rosa canina</i> L., 1753.....	77
Rosier toujours vert, <i>Rosa sempervirens</i> L., 1753.....	68
Rostraire à crête, <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzevel, 1971.....	108
Rostraria à crête, <i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzevel, 1971.....	108
Rumex aggloméré, <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770.....	121
Sabine, <i>Juniperus sabina</i> L., 1753.....	68, 103
Sablaine rostrée, <i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb., 1842.....	105
Sabot-de-la-mariée, <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753.....	61
Sain-Bois, <i>Daphne gnidium</i> L., 1753.....	61
Sainfoin couché, <i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC., 1805.....	105
Salade de chouette, <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753.....	121
Salade-de-porc, <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753.....	86
Salicaire commune, <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753.....	118
Salicaire pourpre, <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753.....	118
Salsifis à feuilles de crocus, <i>Tragopogon crocifolius</i> L., 1759.....	106
Salsifis à feuilles de poireau, <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753.....	106
Salsifis d'Orient, <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Telak., 1871.....	95
Salsifis de Daléchamps, <i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795.....	107
Salsifis douteux, <i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772.....	106
Salsifis du Midi, <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753.....	106
Salsifis fausse picride, <i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795.....	108
Sampéchie, <i>Sambucus nigra</i> L., 1753.....	54
Sanguinaire, <i>Ceranium sanguineum</i> L., 1753.....	69, 104
Sanguine, <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753.....	56
Sanguisorbe mineure, <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753.....	92
Sapin blanc, <i>Abies alba</i> Mill., 1768.....	68
Sapin pectiné, <i>Abies alba</i> Mill., 1768.....	68
Saponaire d'Espagne, <i>Cypsophila vaccaria</i> (L.) Sm., 1809.....	99
Saponaire de Montpellier, <i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> L., 1753.....	70, 106
Saponaire des vaches, <i>Cypsophila vaccaria</i> (L.) Sm., 1809.....	99
Saponaire faux basilic, <i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> L., 1753.....	70, 106
Saponaire officinale, <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753.....	63
Sarriette commune, <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753.....	65
Sarriette de montagne, <i>Satureja montana</i> L., 1753.....	77
Sarriette des montagnes, <i>Satureja montana</i> L., 1753.....	77
Sarriette des Pyrénées, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016.....	96
Sarriette méridionale, <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016.....	96
Sarriette népéta, <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891.....	69, 104
Sauge commune, <i>Salvia pratensis</i> L., 1753.....	92
Sauge des prés, <i>Salvia pratensis</i> L., 1753.....	92
Sauge fausse verveine, <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753.....	106
Sauge verveine, <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753.....	106
Saule à trois étamines, <i>Salix triandra</i> .....	116
Saule amandier, <i>Salix triandra</i> .....	116
Saule blanc, <i>Salix alba</i> L., 1753.....	68, 115
Saule blanchâtre, <i>Salix eleagnos</i> .....	60
Saule blanchâtre, <i>Salix eleagnos</i> Scop., 1772.....	116
Saule cendré, <i>Salix cinerea</i> L., 1753.....	115
Saule commun, <i>Salix alba</i> L., 1753.....	70, 106
Saule des chèvres, <i>Salix caprea</i> L., 1753.....	54
Saule drapé, <i>Salix eleagnos</i> .....	60
Saule drapé, <i>Salix eleagnos</i> Scop., 1772.....	116
Saule faux daphné, <i>Salix daphnoides</i> .....	115
Saule marsault, <i>Salix caprea</i> L., 1753.....	54
Saule noir, <i>Salix daphnoides</i> .....	115
Saule pourpre, <i>Salix purpurea</i> L., 1753.....	116
Saule pruineux, <i>Salix daphnoides</i> .....	115
Savonnière, <i>Saponaria officinalis</i> L., 1753.....	65
Saxifrage à feuilles opposées, <i>Saxifraga oppositifolia</i> L., 1753.....	106
Saxifrage glanduleuse, <i>Saxifraga oppositifolia</i> L., 1753.....	106
Scabieuse colombaire, <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753.....	93
Scabieuse des jardins, <i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753.....	92
Scabieuse luisante, <i>Scabiosa lucida</i> Vill., 1779.....	65
Scabieuse pourpre foncé, <i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753.....	92
Scabieuse pourpre noir, <i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753.....	92
Schédonore des prés, <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812.....	70, 106
Schédonore des prés, <i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812.....	70, 106
Scirpe des marais, <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817.....	120
Sécurigère bigarrée, <i>Coronilla varia</i> L., 1753.....	82
Sécurigère variée, <i>Coronilla varia</i> L., 1753.....	82
Sédum de Nice, <i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich, 1984.....	90
Séné batarde, <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989.....	57
Séneçon à feuilles de roquette, <i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801.....	105
Séneçon cinéraire, <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsler & Meijden, 2005.....	105
Séneçon jacobée, <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791.....	87
Sérénite, <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881.....	68
Sermentain, <i>Laserpitium siler</i> L., 1753.....	105
Serpolet faux pouliot, <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753.....	94
Seslérie blanchâtre, <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763.....	65
Seslérie bleue, <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763.....	65
Silène à feuilles larges, <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789.....	94
Silène à larges feuilles, <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789.....	94
Silène commun, <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869.....	94
Silène commun, <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869.....	66
Silène d'Angleterre, <i>Silene gallica</i> L., 1753.....	108
Silène d'Italie, <i>Silene italica</i> subsp. <i>italica</i> (L.) Pers., 1805.....	93
Silène de France, <i>Silene gallica</i> L., 1753.....	108
Silène dioïque, <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811.....	65
Silène enflé, <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869.....	94
Silène enflé, <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869.....	66
Silène penché, <i>Silene nutans</i> L., 1753.....	65
Sixalix pourpre noir, <i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753.....	92
Solidage alpestre, <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang., 1882.....	70
Solidage très petit, <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang., 1882.....	70
Solidage verge-d'or, <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753.....	66
Solidage verge-d'or, <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L., 1753.....	70
Sorbier des Alpes, <i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem., 1847.....	51
Sorbier des oiseaux, <i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753.....	68
Sorbier des oiseleurs, <i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753.....	68
Sorbier domestique, <i>Cornus domestica</i> (L.) Spach, 1834.....	52
Sorbier sauvage, <i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753.....	68
Souchet allongé, <i>Cyperus longus</i> .....	120
Souchet long, <i>Cyperus longus</i> .....	120
Souchet odorant, <i>Cyperus longus</i> .....	120
Souci des champs, <i>Calendula arvensis</i> L., 1763.....	97
Sourcil-de-Vénus, <i>Achillea millefolium</i> L., 1753.....	77
Spéculaire miroir-de-Vénus, <i>Legousia speculum-veneris</i> subsp. <i>speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785.....	99
Spirée Ulmaire, <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879.....	117
Stéhéline douteuse, <i>Stachelia dubia</i> L., 1753.....	117
Stipe d'Offner, <i>Stipa offneri</i> Breistr., 1950.....	106
Sudeur, <i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819.....	97
Sumac des corroyeurs, <i>Rhus coriaria</i> L., 1753.....	59
Sumac fustet, <i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771.....	56
Sureau à grappes, <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753.....	60
Sureau de montagne, <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753.....	60
Sureau noir, <i>Sambucus nigra</i> L., 1753.....	54
Sureau rouge, <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753.....	60
Surelle, <i>Rumex acetosella</i> L., 1753.....	92
Tamarin d'Allemagne, <i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824.....	69, 103, 121
Tamarinis d'Allemagne, <i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824.....	69, 103, 121
Tanaisie en corymbes, <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844.....	70, 106
Tapotte, <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869.....	94
Tapotte, <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869.....	66
Térébinthe, <i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753.....	58
Tête de moineau, <i>Centaurea jacea</i> L., 1753.....	81
Tête de moineau, <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> L., 1753.....	81
Téragonolobe maritime, <i>Lotus maritimus</i> L., 1753.....	89
Thé d'Europe, <i>Veronica officinalis</i> L., 1753.....	66
Thé suisse, <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771.....	70
Thym commun, <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753.....	94
Thym commun, <i>Thymus vulgaris</i> L., 1753.....	94
Thym faux pouliot, <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753.....	94
Tilleul à feuilles larges, <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771.....	54
Tilleul à grandes feuilles, <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771.....	54
Tilleul à larges feuilles, <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771.....	54
Tordyle élevé, <i>Tordylium maximum</i> L., 1753.....	108
Tordyle majeur, <i>Tordylium maximum</i> L., 1753.....	108
Torilide des champs, <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821.....	108
Torilis des champs, <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821.....	108
Tormentille, <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797.....	121
Trainasse, <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753.....	103, 121
Trance, <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804.....	101
Trèfle à feuilles étroites, <i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753.....	101
Trèfle à folioles étroites, <i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753.....	101
Trèfle agraire, <i>Trifolium aureum</i> Pollich., 1777.....	67
Trèfle alpestre, <i>Trifolium alpestre</i> L., 1763.....	106
Trèfle bâtard, <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753.....	106
Trèfle bitumeux, <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981.....	79
Trèfle bitumeux, <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt., 1981.....	79
Trèfle blanc, <i>Trifolium repens</i> L., 1753.....	107
Trèfle champêtre, <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804.....	101
Trèfle de Cherler, <i>Trifolium cherleri</i> L., 1755.....	108
Trèfle de Hollande, <i>Trifolium repens</i> L., 1753.....	107

## II. INDEX DES NOMS COMMUNS

<b>Trèfle des champs</b> , <i>Trifolium arvense</i> L., 1753.....	101	<b>Valériane tubéreuse</b> , <i>Valeriana tuberosa</i> L., 1753.....	107
<b>Trèfle des montagnes</b> , <i>Trifolium montanum</i> L., 1753.....	95	<b>Verge-d'or</b> , <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753.....	66
<b>Trèfle des prés</b> , <i>Trifolium pratense</i> L., 1753.....	106	<b>Verge-d'or</b> , <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L., 1753.....	70
<b>Trèfle des prés</b> , <i>Trifolium pratense</i> var. <i>pratense</i> .....	106	<b>Verge-d'or alpestre</b> , <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang., 1882.....	70
<b>Trèfle doré</b> , <i>Trifolium aureum</i> Pollich, 1777.....	67	<b>Vergne</b> , <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790.....	115
<b>Trèfle enterreur</b> , <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753.....	108	<b>Vermiculaire</b> , <i>Sedum acre</i> L., 1753.....	93
<b>Trèfle étoilé</b> , <i>Trifolium stellatum</i> L., 1753.....	101	<b>Verne</b> , <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790.....	115
<b>Trèfle fistuleux</b> , <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753.....	106	<b>Véronique à feuilles de lierre</b> , <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753.....	102
<b>Trèfle hybride</b> , <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753.....	106	<b>Véronique beccabonga</b> , <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753.....	121
<b>Trèfle intermédiaire</b> , <i>Trifolium medium</i> L., 1759.....	95	<b>Véronique d'Orsini</b> , <i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830.....	107
<b>Trèfle jaune</b> , <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804.....	101	<b>Véronique des ruisseaux</b> , <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753.....	121
<b>Trèfle moyen</b> , <i>Trifolium medium</i> L., 1759.....	95	<b>Véronique douteuse</b> , <i>Veronica orsiniana</i> Ten., 1830.....	107
<b>Trèfle Pied-de-lièvre</b> , <i>Trifolium arvense</i> L., 1753.....	101	<b>Véronique mouron-d'eau</b> , <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753.....	122
<b>Trèfle porte-fraise</b> , <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753.....	106	<b>Véronique officinale</b> , <i>Veronica officinalis</i> L., 1753.....	66
<b>Trèfle rampant</b> , <i>Trifolium repens</i> L., 1753.....	107	<b>Véronique petit-chêne</b> , <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753.....	107
<b>Trèfle semeur</b> , <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753.....	108	<b>Verveine officinale</b> , <i>Verbena officinalis</i> L., 1753.....	96
<b>Trèfle souterrain</b> , <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753.....	108	<b>verveine sauvage</b> , <i>Verbena officinalis</i> L., 1753.....	96
<b>Trèfle violet</b> , <i>Trifolium pratense</i> L., 1753.....	106	<b>Vesce à épis</b> , <i>Vicia cracca</i> L., 1753.....	67
<b>Trèfle-fraise</b> , <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753.....	106	<b>Vesce à feuilles étroites</b> , <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788.....	67
<b>Tremble</b> , <i>Populus tremula</i> L., 1753.....	68	<b>Vesce à petites feuilles</b> , <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788.....	67
<b>Tripleurosperme inodore</b> , <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch Bip., 1844.....	102	<b>Vesce cracca</b> , <i>Vicia cracca</i> L., 1753.....	67
<b>Trisète commun</b> , <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812.....	95	<b>Vesce des haies</b> , <i>Vicia sepium</i> L., 1753.....	67
<b>Trisète commun</b> , <i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812.....	95	<b>Veuve-céleste</b> , <i>Globularia cordifolia</i> L., 1753.....	104
<b>Trisète jaunâtre</b> , <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812.....	95	<b>Vigne du Nord</b> , <i>Humulus lupulus</i> L., 1753.....	69, 121
<b>Trisète jaunâtre</b> , <i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812.....	95	<b>Vinaigrier des corroyeurs</b> , <i>Rhus coriaria</i> L., 1753.....	59
<b>Trisète jaunissant</b> , <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812.....	95	<b>Violettes de serpent</b> , <i>Vinca minor</i> L., 1753.....	70
<b>Trisète jaunissant</b> , <i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812.....	95	<b>Viorne lantane</b> , <i>Viburnum lantana</i> L., 1753.....	60
<b>Troène</b> , <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753.....	57	<b>Viorne mancienne</b> , <i>Viburnum lantana</i> L., 1753.....	60
<b>Troène commun</b> , <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753.....	57	<b>Viorne tin</b> , <i>Viburnum tinus</i> L., 1753.....	61
<b>Tubénaire tachetée</b> , <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868.....	108	<b>Vipérine commune</b> , <i>Echium vulgare</i> L., 1753.....	83
<b>Urosperme de Daléchamps</b> , <i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795.....	107	<b>Vipérine vulgaire</b> , <i>Echium vulgare</i> L., 1753.....	83
<b>Urosperme fausse picride</b> , <i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 1795.....	108	<b>Vulnéraire des montagnes</b> , <i>Anthyllis montana</i> L., 1753.....	78
<b>Vaccaire d'Espagne</b> , <i>Cypsophila vaccaria</i> (L.) Sm., 1809.....	99	<b>Xéranthème fermé</b> , <i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill., 1768.....	102
<b>Valériane des montagnes</b> , <i>Valeriana montana</i> L., 1753.....	66	<b>Yeuse</b> , <i>Quercus ilex</i> L., 1753.....	54
<b>Valériane officinale</b> , <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753.....	95	<b>Ziziphora de Grenade</b> , <i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016.....	96
<b>Valériane rouge</b> , <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805.....	82		





# REMERCIEMENTS

## APPARITION PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES STRUCTURES SUIVANTES :

**Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse :**  
Philippe PIERRON, Cathy-Anna VALENTINI POIRIER

**Agence Régionale de la Biodiversité - Occitanie :** Véronique VENTRE

**Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur :**

Alexandra ACCA, Emma AUBERT, Corinne DRAGONE, Thomas FOUREST, Annelise FREIHAUT, Stéphanie GARRIDO, Audrey GLORIAN, Sandrine HALBEDEL, Agnès HENNEQUIN, Pauline JEAN, Sabine LABAT, Lisa LAMBLIN, Cynthia LLAS, Audrey MICHEL, Frédéric PETENIAN, Corinne ROEHLLY, Aurélie RUFFINATTI, Nicolas WEPIERRE

**Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (AFAC - Agroforesteries) :** Danielé ORI

**Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :** Frédérique MAQUAIRE

**Direction régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement :**  
Audrey DONNAREL-PONT, Sylvaine IZE, Anaïs MAREL

**Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) :** Florian CARLET

**Communauté d'agglomération Sophia Antipolis :**  
Céline CHARRIER, Fabienne GUITARD

**Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Vaucluse (CAUE 84) :**  
Jean-Charles GROS, Thomas KLEITZ

**Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Var (CAUE 83) :** Pierre DAVID

**Conservatoire botanique national alpin :**  
Stéphanie HUC, Myriam MOLINATTI

**Conservatoire botanique national de Brest**

**Conservatoire botanique national de Corse :** Yohan PETIT

**Conservatoire botanique national du Massif central**

**Conservatoire botanique national Méditerranéen :**  
Cyril COTTAZ, Guilhem DEBARRO, Lara DIXON, Sylvia LOCHON-MENSEAU, Julien UGO

**Conservatoire botanique national Pyrénées Midi-Pyrénées :** Ninon LAPORTE

**Conservatoire botanique national Sud-Atlantique :**  
Cécile PONTAGNIER

**Fédération Française du Paysage (délégation Provence Alpes Côte d'Azur Corse) :** Pierre DAVID

**HORTIS- les responsables d'espaces nature en ville- Délégation régionale :**

Philippe DALMASSO (Ville d'Antibes),  
Didier VIDAL (Ville de Marseille)

**Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) :**  
Catherine DUCATILLION, Gildas GATEBLE

**Office français de la Biodiversité :**  
Elsa BARRANDON, Virginie CROQUET, David MOULIN

**Parc naturel régional des Alpilles :**  
Anne-Catherine PRIVAT-MADELIN

**Parc naturel régional du Luberon :**  
Nicolas BOUEDEC, Françoise DELVILLE

**Région Sud :**  
Nadège ARNAL, Sarah JEANROY

**Réseau des Conservatoires Botaniques Nationaux :** Damien PROVENDIER

**Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) :**  
Claire MONOT, Quentin METTRAY,  
Pierre-Antoine THEVENIN

**Université Aix Marseille Provence :**  
Laurence AFFRE, Magali DESCHAMPS-COTTIN

**Ville d'Avignon :** Patrice HENON

**Ville de Gréoux-les-Bains :** Bruno SAILLE

**Ville de Marseille :** Brice DACHEUX-AUZIERE

**Ville de Saint-Laurent-du-Var :**  
Jean-Louis DESSUS, Isabelle PANCHIERI

## PROFESSIONNELS HORTICULTEURS, PÉPINIÉRISTES, ETC.

**Agir Ecologique :** Pascal AUDA

**Arbre Haie Forêt :** Camille BEAUCHAMPS

**Biodiv :** Julien BARET

**Le filon vert :** Sylvie DUPARD

**Pépinière Damien VIVIER :** Damien VIVIER

**Pépinière de l'Armalette :** Benoît BEAUVALLET, Isabelle BEAUVALLET

**Pépinières du Luberon- Groupe Naudet :** Luc PICAUT

**Pépinière ROUY :** Pierre JOURCIN

**Phytosem :** Julien PLANCHE

**Récolteur Z10 :** Anne LACHAZE

**Spatium-Vitae :** Philippe WALKER

**Nymphaea :** Julie GASC, Philippe PROHIN



Directeur de la publication : Anne CLAUDIUS-PETIT, présidente ARBE  
Directrice ARBE : Audrey MICHEL  
Responsable édition : Audrey GLORIAN  
Suivi édition : Alexandra ACCA  
Coordination : Stéphanie GARRIDO, Sabine LABAT  
Soutien à la rédaction : Agence Mars  
Graphisme : Imprimerie Vallière / Illustrations : Julien D'HULST  
Crédit photo : 1<sup>ère</sup> de couverture : LPED-AMU – Magali DESCHAMPS-COTTIN  
Imprimerie : Print Concept  
Imprimé sur papier recyclé 100 %, écolabellisé, sans chlore et PEFC

Date de parution : décembre 2022

Citation : Collectif, 2022. Plantons local Provence-Alpes-Côte d'Azur, guide pratique pour les opérations de végétalisation du littoral méditerranéen au massif alpin. Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur. 162 p.





22 rue Sainte-Barbe, CS 80573  
13205 MARSEILLE cedex 1  
[www.arbe-regionsud.org](http://www.arbe-regionsud.org)

Participation à la rédaction du guide



Projet co-construit avec les bénéficiaires associés du LIFE Habitats Calanques

